

Resultatredovisning Projekt Remiz 2022

I sydvästra Skåne observerades fyra hanar och tre honor. Endast två häckningar lyckades med nio ungar som resultat medan tre häckningsförsök misslyckades på grund av predation. Två av bona plundrades vid samma tid och på samma lokal när ungarna var små, och här tror vi att predatoren var en större hackspett. Ett ganska litet hål i boväggen på båda bona visade hur ungarna plockats ut. I det tredje prederade boet tror vi att skata var den skyldige då detta bo var rejält söndertrasat. Någon eller några ungar kan ha överlevt då det skedde runt det datum då ungarna skulle bli flygga.

I nordöstra Skåne observerades fyra hanar och två honor. Två lyckade häckningar konstaterades - en honruvad och en hanruvad. I det ena boet kom fem ungar på vingarna medan vi på grund av boets belägenhet inte säkert kunde fastställa antalet ungar i det andra. Troligen gjordes ytterligare något häckningsförsök i de svåröverskådliga områdena.

Intrycket av en besvärlig häckningssäsong förstärktes under hösten. Löddesnäs har under senare år varit en pålitlig lokal under den tidiga hösten men i år gjordes bara tillfälliga observationer och inga fåglar kunde fångas. I Foteviken kunde en adult hane och en ungfågel ringmärkas men även här var förekomsten sporadisk.

I Flommen på Falsterbohalvön gjordes bara enstaka observationer och bara ett ex ringmärktes av Falsterbo fågelstation. Inte någon sträckande pungmes noterades på av fågelstationen. Notabelt är också att inga av projektets fåglar observerades vilket var i stark kontrast till hösten 2021.

Några kontroller av våra märkta fåglar under höstflyttningen i Västeuropa har skrivande stund ännu inte rapporterats. Detta är en stor skillnad i förhållande till föregående år då sammanlagt fyra individer observerades på olika platser under oktober och november.

Trots det begränsade antalet fåglar i populationen gjordes några intressanta observationer. En av fjolårets honor återkom för en ny säsong och hennes beteende var mycket likartat våren 2022. Båda åren övergav hon första kullen men respektive hane tog hand om dem. Nästa kull tog honan själv hand om. Strategin var lyckad 2021 med två lyckade kullar, men i år föll båda kullarna offer för predation. Det här styrker ändå vår hypotes att det kan finnas individuella skillnader i häckningsstrategier. En annan intressant iakttagelse var att honans första hane 2022 verkade först inte vilja ta hand om kullen utan började istället bygga ett nytt bo när honan lämnade. Tre dagar senare var han dock tillbaka till det första boet och lade sig att ruva äggen, men tyvärr rövades boet strax efter kläckningen. Liknande observationer beskrev vi redan 2009 (Czyz, Persson, Öhrström 2009, Ornis Svecica 19: 215-221) och tillsammans med en liknande observation från 2016 kan vi lägga till två ytterligare fall i vårt material. Det visar hur komplex frågan kring besluten om vem som skall ruva kullen kan vara.

Inför årets säsong planerade vi att bevaka bon med åtelkameror för att om möjligt fastställa vilka arter som kan vara predatorer. Vi gjorde några experiment med lånade kameror som tyvärr visade att fotografering med rörelsesensor inte fungerar

bra för bon och grenverk som ständigt är i rörelse. Vi har därför inte köpt in någon kamera.

Pungmesen fortsätter att minska och förekomsten är nu den sämsta sedan 1970-talet. Information från Nederländerna, Danmark och Tyskland visar på likartade trender. Detta innebär också att möjligheten för påspädning söderifrån blir allt sämre och tyvärr är risken stor att vi snart förlorar pungmesen som svensk häckfågel.

Att bopredationen är ett problem för våra fåglar är tydligt men det finns ytterligare en faktor som kan spela roll, nämligen en över tiden minskande kullstorlek. Storleken av de kullar som ruvades av honor låg i genomsnitt på 5,2 under perioden 1980-1990 medan för åren 2011-2022 var motsvarande värde 4,5. Skillnaden är signifikant (t-test, $p < 0,01$). Vi kan ännu inte ge en förklaring till detta men det är möjligt att den pågående biotoputvecklingen leder till att någon nyckelresurs blir begränsad. Vilken denna i så fall är vet vi inte.