

Namnlistan, version 17



IOC har delat upp ett antal solfjäderstjärtar i nya arter. På bilden den nya arten vagabondsolfjäderstjärt, underarten *reichenowi* på ön Babar i Indonesien. Arten är uppkallad efter sin förmåga att sprida sig till och kolonisera nya öar. Foto: Erling Jirle.

Version 17 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 14.1 (januari 2024). Liksom i IOC:s förra uppdatering görs ett antal ändringar på släktesnivå som inte påverkar de svenska namnen och därför inte redovisas här. Bland övriga justeringar får även ett antal arter med eponymer i namnet enklare och/eller mer informativa namn.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Mellanhäger (*Ardea intermedia*) delas upp i tre arter:
 - **gulnäbbad häger** (*A. brachyrhyncha*), i Afrika söder om Sahara;
 - mellanhäger (*A. intermedia*), som förekommer från Indien till Japan och Stora Sundaöarna och;
 - **plymhäger** (*A. plumifera*), i östra Indonesien, på Nya Guinea och Australien.
- Svartstrupig trogon (*Trogon rufus*) delas upp i fyra arter:
 - **centralamerikansk trogon** (*T. tenellus*), från Honduras till nordvästra Colombia;
 - **colombiatrogon** (*T. cupreicauda*), i västra Colombia och västra Ecuador;
 - svartstrupig trogon (*T. rufus*), över stora delar av Amazonbäckenet, och;
 - **sooretamatrogon** (*T. chrysochloros*), i östra och södra Brasilien, Paraguay och nordöstra Argentina.

- Dvärgnäshornsfågel (*Horizocerus hartlaubi*) delas upp i två arter:
 - **svart dvärgnäshornsfågel** (*H. hartlaubi*), från Guinea och Sierra Leone österut till Kongbäckenet väster om Kongofloden, och;
 - **vitfläckig dvärgnäshornsfågel** (*H. granti*), i Kongo-Kinshasa och östcentrala Kongo-Brazzaville till västra Uganda.
- Långstjärtad näshornsfågel (*Horizocerus albocristatus*) delas upp i två arter:
 - **vithuvad näshornsfågel** (*H. albocristatus*), från Guinea till Benin, och;
 - **vitkronad näshornsfågel** (*H. cassini*), från Nigeria till norra Angola och västra Uganda.
- Orientkungsfiskare (*Ceyx erithaca*) delas upp i två arter:
 - orientkungsfiskare (*C. erithaca*), från Indien österut till sydöstra Kina, Indokina och Thailand, och;
 - **rostryggig kungsfiskare** (*C. rufidorsa*), från södra Malackahalvön och Sundaöarna till västra och sydvästra Filippinerna.
- Blåörad barbett (*Psilopogon duvaucelii*) delas upp i två arter:
 - **blåörad barbett** (*P. cyanotis*), från östra Nepal, nordöstra Indien och södra Myanmar genom Thailand och Indokina, och;
 - **svartörad barbett** (*P. duvaucelii*), från västra Malaysia, Sumatra och Borneo.
- Svarthuvad juveltrast (*Pitta sordida*) delas upp i fem arter:
 - **orientjuveltrast** (*P. sordida*), från Himalaya österut till sydöstra Kina, Indonesien, Malackahalvön, Större Sundaöarna och Filippinerna;
 - **nikobarjuveltrast** (*P. abbotti*), på Nikobarerna;
 - **minahasajuveltrast** (*P. forsteni*), på Minahasahalvön på norra Sulawesi;
 - **nyaguineajuveltrast** (*P. novaeguineae*), på Nya Guinea och;
 - **biakjuveltrast** (*P. rosenbergii*), på ön Biak norr om Västpapua.
- Salomonsolfjäderstjärt (*Rhipidura cockerelli*) delas upp i två arter:
 - **vitvingad solfjädersstjärt** (*R. cockerelli*), över större delen av Salomonöarna, och;
 - **vithakad solfjädersstjärt** (*R. coultasi*), på ön Malaita i Salomonöarna.
- Brun solfjädersstjärt (*Rhipidura drownei*) delas upp i två arter:
 - **bougainvillesolfjädersstjärt** (*R. drownei*), på ön Bougainville i Salomonöarna, och;
 - **guadalcanalsolfjädersstjärt** (*R. ocularis*), på ön Guadalcanal i Salomonöarna.
- Strimmig solfjädersstjärt (*Rhipidura verreauxi*) delas upp i tre arter:
 - **nyakaledoniensolfjädersstjärt** (*R. verreauxi*), på Nya Kaledonien, inklusive Loyautéöarna;
 - **vanuatusolfjädersstjärt** (*R. spilodera*), i Vanuatu, och;
 - **fijisolfjädersstjärt** (*R. layardi*), i Fiji.
- Arafurasolfjädersstjärt (*Rhipidura dryas*) delas upp i två arter:
 - arafurasolfjädersstjärt (*R. dryas*), i kustområdena på sydcentrala Nya Guinea och norra Australien, och;

- **vagabondsoljfäderstjärt** (*R. semicollaris*), från Små Sundaöarna och Moluckerna till Kai och Aruöarna.
- Rostgumpad soljfäderstjärt (*Rhipidura rufifrons*) delas upp i sex arter:
 - **halmaherasolfjäderstjärt** (*R. torrida*), i norra Moluckerna från Halmahera till Obi;
 - rostgumpad soljfäderstjärt (*R. rufifrons*), i östra Australien;
 - **louiadsolfjäderstjärt** (*R. lousiadensis*), från D'Entrecasteaux-öarna och Louisiaderna öster om Nya Guinea;
 - **temotusolfjäderstjärt** (*R. melanolaema*), på öarna Nendö, Vanikolo och Utupua i Temotuprovinsen i södra Salomonöarna;
 - **mikronesisk soljfäderstjärt** (*R. versicolor*), på Marianerna och Yap i Mikronesien, och;
 - **salomonsolfjäderstjärt** (*R. rufofronta*), på Salomonöarna.
- Brunstrupig backsvala (*Riparia paludicola*) delas upp i två arter:
 - brunstrupig backsvala (*R. paludicola*), över större delen av Afrika, från Marocko i norr till Sydafrika i söder, och;
 - **madagaskarbacksvala** (*R. cowani*), på Madagaskar.
- Brunvingad papegojnäbb (*Suthora brunnea*) delas upp i två arter:
 - brunvingad papegojnäbb (*S. brunnea*), från Myanmar till sydvästra Kina, och;
 - **sichuanpapegojnäbb** (*S. ricketti*), från sydvästra Sichuan till nordvästra Yunnan.
- Kortstjärtad timalia (*Pellorneum malaccense*) delas upp i tre arter:
 - **klagotimalia** (*P. malaccense*), från Malackahalvön, Sumatra och ett antal mindre öar;
 - **glissandotimalia** (*P. saturatum*), från Bangka, Belitung och västra Borneo (Sarawak och västra Kalimantan), och;
 - **östborneotimalia** (*P. poliogene*), från östra Borneo (Sabah, Brunei och östra Kalimantan).
- Vitbröstad timalia (*Pellorneum rostratum*) delas upp i två arter:
 - **malajflodtimalia** (*P. rostratum*), från Malackahalvön, Sumatra och ett antal mindre öar, och;
 - **borneoflodtimalia** (*P. macropterum*), från Borneo och Banggi.
- Praktblomsterpickare (*Dicaeum maugei*) delas upp i två arter:
 - praktblomsterpickare (*D. maugei*), från öar i Floressjön söder om Sulawesi och västra och östra Små Sundaöarna, och;
 - **rosabröstad blomsterpickare** (*D. keiense*), från öarna Tanimbar, Tayandu, Kai och Watubela i södra och sydöstra Moluckerna.
- Orientblomsterpickare (*Dicaeum ignipectus*) delas upp i fyra arter:
 - orientblomsterpickare (*D. ignipectus*), från Himalaya till östra Kina, norra och centrala Indokina, Myanmar, norra Thailand, Myanmar, Malackahalvön och Taiwan;
 - **kambodjablomsterpickare** (*D. cambodianum*), från östra Thailand och Kambodja;

- **sumatrablomsterpickare** (*D. beccarii*), från Sumatra, och;
- **eldstrupig blomsterpickare** (*D. luzoniense*), från Filippinerna (förutom Mindoro, Palawan och Suluöarna).
- Olivryggig solfågel (*Cinnyris jugularis*) delas upp i åtta arter:
 - **orientsolfågel** (*C. ornatus*), från södra Kina, Andamanerna, Myanmar, Thailand, Indokina och Malackahalvön till Sundaöarna;
 - **trädgårdssolfågel** (*C. jugularis*), från Filippinerna (förutom Palawan);
 - **aurorasolfågel** (*C. aurora*), från Palawan;
 - **sahulsolfågel** (*C. frenatus*), från Sulawesi till norra Moluckerna, Nya Guinea (förutom norra), Aruöarna, nordöstra Queensland, Bismarckarkipelagen och delar av Salomonöarna;
 - **tukangbesisolfågel** (*C. infrenatus*), från Tukangbesi och några andra småöar sydöst om Sulawesi;
 - **kalaosolfågel** (*C. teysmanni*), från Kalao och ytterligare några småöar i Floressjön söder om Sulawesi;
 - **molucksolfågel** (*C. clementiae*), i södra Moluckerna från Buru och Seram till Kaiöarna, och;
 - **papuasolfågel** (*C. idenburgi*), från norra Nya Guinea.

Fyra arter stryks från listan:

- Siaujuveltrast (*Erythropitta palliceus*) och sangihejuveltrast (*E. caeruleitorques*) slås samman med sulawesijuveltrast (*E. celebensis*), den sammanslagna arten behåller namnet **sulawesijuveltrast** (*E. celebensis*).
- Nordlig krontyrann (*Onychorhynchus mexicanus*) och västlig krontyrann (*O. occidentalis*) slås samman med amazonkrontyrann (*O. coronatus*), den sammanslagna arten får namnet **nordlig krontyrann** (*O. coronatus*). I samband med detta justeras namnet på östlig krontyrann till **sydlig krontyrann** (*O. swainsoni*).

Övriga justeringar

- Dvärgkanadagås får det enklare namnet **polargås** då arten inte är närmast släkt med kanadagås, namnet är det samma som på norska.
- Gaffelstjärtad palmseglare justeras till **sydamerikansk palmseglare** då samtliga palmseglare har liknande form på stjärten.
- Bergskogsduva justeras till **ekduva** då det tidigare namnet lätt kan missförstås som att den är en systerart till skogsduva, snarare än att det syftar på bergskogar (med inslag av ek).
- Fläckig skogsuggla och vattrad skogsuggla justeras till **pagoduggla** respektive till **mangougla** då "skogsuggla" inte är ett sammanhållande släktesnamn.
- Vithuvad näshornsfågel justeras till det mer rättvisande namnet **vittofsad näshornsfågel**.
- I samband med att några havsörnar (släktet *Haliaeetus*) flyttas till fiskörnarna (släktet *Ichthyophaga*) justeras namnet från havs- till fiskörn:
 - **vitbukig fiskörn** (v. 16, vitbukig havsörn)

- **salomonfiskörn** (v. 16, salomonhavsörn)
- **skrikfiskörn** (v. 16, skrikhavsörn)
- **madagaskarfiskörn** (v. 16, madagaskarhavsörn)
- I samband med att släktena inom familjen pipare justeras baserat på genetiska studier justeras tre arter i det begränsade strandpiparsläktet *Charadrius* från pipare till strandpipare:
 - **svarthuvad strandpipare** (v. 16, svarthuvad pipare)
 - **trebandad strandpipare** (v. 16, trebandad pipare)
 - **svartpannad strandpipare** (v. 16, svartpannad pipare)
- Cocostyrann justeras till **cocosdvärgtyrann** då genetiska studier visat att den är en dvärgtyrann.
- Japansk nordsångare och kamtjatkanordsångare förenklas till **japansk sångare** och **kamtjatkan sångare**.
- Stenpiplärka ändras till **kopjjeplärka** efter habitatet kopje som är en typ av berg i södra Afrika.
- Gulbrynad grässpärv förenklas till enbart **grässpärv** då det endast finns en grässpärv, samt för att undvika förväxlingsrisk med gulbrynad spärv.
- Messångare och tropikmessångare justeras till **messkogssångare** och **tropikskogssångare** för att visa att de tillhör familjen skogssångare.
- Prärieskogssångare justeras till **snårskogssångare** då arten inte alls förekommer i prärie habitat.
- Stavningen på några namn justeras till mer modern transkribering (rekommenderad stavning av Nationalencyklopedin):
 - Stavningen av ön Kadavu i Fijiöarna justeras till Kandavu, vilket påverkar **kandavufruktduva**, **kandavuhonungsfågel** och **kandavusolfjäderstjärt**.
 - Stavningen av ön Vanikoro i Salomonöarna justeras till Vanikolo, vilket påverkar **vanikolomonark** och **vanikologlasögonfågel**.
 - Stavningen av ön Ogea Levu i Fijiöarna justeras till Ongea Levu, vilket påverkar **ongeamonark**.
 - Stavningen av Kāchār i nordöstra Indien justeras till Cāchār, vilket påverkar **cacharbulbyl** och **cachartimalia**.
 - Stavningen på **chuquisacatapakul** korrigeras då den var felstavad i tidigare versioner av listan (tidigare chiquisacatapakul).
- Ytterligare några arter med eponymer i namnet, justeras till enklare och/eller mer informativa namn. För förklaring av geografiska namn m.m. se ordlistan med geografiska namn, biotopnamn, folkslag m.m. på Tk:s webbplats:
 - **selvastinamo** (v. 16, Bartletts tinamo)
 - **örttinamo** (v. 16, darwintinamo)
 - **vietnamfasan** (v. 16, edwardsfasan)
 - **grå uggleskär** (v. 16, bennettuggleskär)
 - **sydseglare** (v. 16, sickseglare)

- **skogsseglare** (v. 16, batesseglare)
- **högländssalangan** (v. 16, mayrsalangan)
- **rostmustaschkolibri** (v. 16, Bouguers kolibri)
- **moçambiquesporrgök** (v. 16, burchellsporrgök)
- **kamerunduva** (v. 16, sjöstedtduva)
- **solfjäderskronduva** (v. 16, victoriakronduva)
- **kaktussparvduva** (v. 16, morenosparvduva)
- **kortnäbbad dunrall** (v. 16, böhmdunrall)
- **vitprickig dvärgrall** (v. 16, darwinrall)
- **brunnackad rall** (v. 16, lewinrall)
- **herdepipare** (v. 16, kittlitzstrandpipare)
- **koreastormsvala** (v. 16, Swinhoes stormsvala)
- de tre arterna stormsvalor på ön Guadalupe justeras till **vinterguadalupestormsvala** (v. 16, ainleystormsvala), **sommarguadalupestormsvala** (v. 16, townsendstormsvala) och **större guadalupestormsvala** (v. 16, guadalupestormsvala)
- **jättestormsvala** (v. 16, tristramstormsvala)
- **lordhowepetrell** (v. 14, solanderpetrell)
- **réunionpetrell** (v. 16, baraupetrell), samtidigt justeras réunionpetrell till **maskarenpetrell**
- **tenggaradvärguv** (v. 16, wallacedvärguv)
- **ödleörn** (v. 16, wahlbergörn)
- **kongosparvuggla** (v. 16, sjöstedtsparvuggla)
- **jättefiskuv** (v. 16, Blakistons fiskuv)
- **brunryggig honungsvisare** (v. 16, wahlberghonungsvisare)
- **kongospett** (v. 16, elliotspett)
- **vulkanspett** (v. 16, stricklandspett)
- **palmfalk** (v. 16, dickinsonfalk)
- **azurara** (v. 16, spixara)
- **igapóamazon** (v. 16, kawallamazon)
- **lianlorikit** (v. 16, josefinalorikit)
- **grön lorikit** (v. 16, meeklorikit)
- **granempid** (v. 16, hammondempid)
- **hondurasskrika** (v. 16, hartlaubskrika)
- **rostkronad finklärka** (v. 16, fischerfinklärka)
- **somaliabulbyl** (v. 16, dodsonbulbyl), samtidigt justeras somaliabulbyl till **djiboutibulbyl**
- **nigersvala** (v. 16, preussvala)
- **långnäbbad glasögonfågel** (v. 16, sanfordglasögonfågel)
- **blågrön glansstare** (v. 16, rüppellglansstare)

- **flodtrast** (v. 16, hauxwelltrast)
- **mossgrön solfågel** (v. 16, frasersolfågel)
- **blåsmäckad solfågel** (v. 16, gouldsolfågel)
- **svartlila solfågel** (v. 16, bocagesolfågel)
- **brachystegiasolfågel** (v. 16, oustaletsolfågel)
- **saffranskronad vävare** (v. 16, bertramvävare)
- **högländsvävare** (v. 16, Spekes vävare)
- **diademvävare** (v. 16, preussvävare)
- **sumpmalimbe** (v. 16, cassinmalimbe)
- **gråhuvad bergastrild** (v. 16, Salvadoris bergastrild)
- **karmosinamarant** (v. 16, jamesonamarant)
- **grönvingad piplärka** (v. 16, sundevallpiplärka)
- **törnsiska** (v. 16, reichenowsiska)
- **kärresparv** (v. 16, lincolnsparv)
- **amursparv** (v. 16, tristramparv)
- **gulhakad skogssångare** (v. 16, audubonskogssångare)

*Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund, Martin Stervander, Tk,
17 januari 2024.*

Namnlistan, version 16



IOC har delat upp mindre gultofskakadua i två arter. På bilden en gulkindad kakadua från ön Komodo i Små Sundaöarna. Foto: Markus Lagerqvist.

Version 16 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 13.2 (juli 2023). Liksom i IOC:s förra uppdatering görs ett antal ändringar på släktesnivå som inte påverkar de svenska namnen och därför inte redovisas här. Bland övriga justeringar får även ett antal arter med eponymer i namnet enklare och/eller mer informativa namn.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Savannattskärre (*Caprimulgus affinis*) delas upp i två arter:

- savannattskärre (*C. affinis*), som förekommer från Pakistan österut till Kina, samt på Taiwan, Stora Sundaöarna, Sulawesi och Små Sundaöarna och;
- **kvitternattskärre** (*C. griseatus*), i Filippinerna.
- Duvhök (*Accipiter gentilis*) delas upp i två arter:
 - duvhök (*A. gentilis*), i Palearktis, och;
 - **amerikansk duvhök** (*A. atricapillus*), i Nordamerika, från Kanada söderut till norra Mexiko.
- Palmtoko (*Lophoceros fasciatus*) delas upp i två arter:
 - **kongotoko** (*L. fasciatus*), från östra Nigeria västerut till Uganda, och;
 - **västafrikansk toko** (*L. semifasciatus*), från Senegal västerut till Nigeria.
- Rödbrostad hackspett (*Dryobates cathpharius*) delas upp i två arter:
 - **rödnackad hackspett** (*D. cathpharius*), från västcentrala Nepal, sydöstra Tibet och nordöstra Indien till västra Myanmar, och;
 - **halsbandsspett** (*D. pernyi*), från norra och östra Myanmar österut till norra Laos, nordvästra Vietnam samt södra, centrala och nordcentrala Kina.
- Karmosinspett (*Campephilus haematogaster*) delas upp i två arter:
 - karmosinspett (*C. haematogaster*), från centrala Colombia och östra Ecuador till centrala Peru, och;
 - **praktspett** (*C. splendens*), från Panama, västra Colombia och nordvästra Ecuador.
- Tigerspett (*Meiglyptes tristis*) delas upp i två arter:
 - **zebraspett** (*M. tristis*), på Java och;
 - **tigerspett** (*M. grammithorax*), från Malackahalvön, Sumatra och Borneo.
- Mindre gultofskakadua (*Cacatua sulphurea*) delas upp i två arter:
 - **gulkindad kakadua** (*C. sulphurea*), från Sulawesi-regionen och Små Sundaöarna, och;
 - **sumbakakadua** (*C. conradii*), på ön Sumba i Små Sundaöarna.
- Silverbröstad brednäbb (*Serilophus lunatus*) delas upp i två arter:
 - silverbröstad brednäbb (*Serilophus lunatus*), från centrala Myanmar till sydöstra Kina, Vietnam, Malackahalvön och Sumatra, och;
 - **gråtyglad brednäbb** (*Serilophus rubropygius*), från nordöstra Indien, nordöstra Bangladesh och Bhutan till nordöstra Myanmar.
- Långstjärtad trädklättrare (*Deconychura longicauda*) delas upp i tre arter:
 - långstjärtad trädklättrare (*D. longicauda*), från Guyanas högland och norra Brasilien;
 - **panamaträdklättrare** (*D. typica*), från Costa Rica söderut till norra Colombia, och;
 - **amazonträdklättrare** (*D. pallida*), från östra Colombia och södra Venezuela till sydöstra Peru, norra Bolivia och sydvästra Brasilien.
- Amazonskärnäbb (*Campylorhamphus procurvoides*) delas upp i tre arter:
 - amazonskärnäbb (*C. procurvoides*), i norra och västra Amazonasbäckenet;

- **tapajósskärnäbb** (*C. probatus*), i sydvästra och sydcentrala Amazonas mellan floderna Madeira och Xingu, och;
- **xinguskärnäbb** (*C. multostriatus*), från östra Amazonas mellan floderna Xingu och Tocantins.
- Grå uppnäbb (*Xenops minutus*) delas upp i två arter:
 - **vitstrupig uppnäbb** (*X. minutus*), från östra Brasilien till östra Paraguay och nordöstra Argentina, och;
 - **brunbukig uppnäbb** (*X. genibarbis*), från södra Mexiko till västra Colombia, västra Venezuela och västra Ecuador; samt Amazonas och Guyanas högland söderut till norra Bolivia och i nordöstra Brasilien.
- Gulstrupig lövletare (*Automolus ochrolaemus*) delas upp i två arter:
 - gulstrupig lövletare (*A. ochrolaemus*), från östra Panama genom Amazonas, och;
 - **nordlig lövletare** (*A. cervinigularis*), från södra Mexiko till nordvästra Panama.
- Marcapatataggstjärt (*Cranioleuca marcapatae*) delas upp i två arter:
 - marcapatataggstjärt (*C. marcapatae*), från Marcapata (sydöstra Peru), och;
 - **vilcabambataggstjärt** (*C. weskei*), från Vilcabamba-bergen (sydcentrala Peru).
- Vittyglad taggstjärt (*Synallaxis albilora*) delas upp i två arter:
 - vittyglad taggstjärt (*S. albilora*), från östra Bolivia, sydvästra Brasilien och norra Paraguay, och;
 - **araguaiataggstjärt** (*S. simoni*), från västcentrala Brasilien.
- Ockramyrpitta (*Grallaria quitensis*) delas upp i tre arter:
 - ockramyrpitta (*G. quitensis*), från centrala Colombia och Ecuador;
 - **boyacámyrpitta** (*G. alticola*), från östra Colombia, och;
 - **atuénmyrpitta** (*G. atuensis*), från norra Peru.
- Olivflatnäbb (*Rhynchocyclus olivaceus*) delas upp i två arter:
 - **östlig olivflatnäbb** (*R. olivaceus*), från Panama genom Amazonas och östra Brasilien, och;
 - **västlig olivflatnäbb** (*R. aequinoctialis*), från östra Panama till nordcentrala Brasilien.
- Svartvit bekard (*Pachyramphus albogriseus*) delas upp i två arter:
 - svartvit bekard (*P. albogriseus*), i bergsskogar i Costa Rica och västra Panama därefter diskontinuerligt till norra och nordöstra Colombia och nordvästra Venezuela till norra Venezuela och längs östra sidan av Anderna från östra Colombia till södra Peru, och;
 - **smalnäbbad bekard** (*P. salvini*), i lågländerna i västra Colombia och västra Ecuador söderut till nordvästra Peru och Rio Maraños avrinningsområde.
- Svartröd gylling (*Oriolus cruentus*) delas upp i två arter:
 - **javagylling** (*O. cruentus*), på Java, och;
 - **svartröd gylling** (*O. consanguineus*), på Malackahalvön, Sumatra och Borneo.
- Strimgylling (*Oriolus xanthonotus*) delas upp i två arter:

- strimgylling (*O. xanthonotus*), på Malackahalvön, Sumatra, Java och sydvästra Borneo, och;
- **buktalargylling** (*O. consobrinus*), från norra, centrala och östra Borneo och Palawan.
- Filippindrongo (*Dicrurus balicassius*) delas upp i två arter:
 - filippindrongo (*D. balicassius*), på Luzon och västra Visayaöarna, och;
 - **kortstjärtad drongo** (*D. striatus*), på östra Visayaöarna och Mindanao.
- Moluckbulbyl (*Hypsipetes longirostris*) delas upp i sex arter:
 - **sulabulbyl** (*H. longirostris*), på Sulaöarna;
 - **sangihebulbyl** (*H. platenae*), på Sangihe (norr om Sulawesi);
 - **togianbulbyl** (*H. aureus*), på Togianöarna;
 - **banggaibulbyl** (*H. harterti*), på Banggaiöarna;
 - **halmaherabulbyl** (*H. chloris*), på Morotai, Halmahera och Bacanöarna, och;
 - **obibulbyl** (*H. lucasi*), på Obi.
- Gulstreckad bulbyl (*Pycnonotus finlaysoni*) delas upp i två arter:
 - gulstreckad bulbyl (*P. finlaysoni*), från södra Kina, Thailand, södra Indokina och Malackahalvön, och;
 - **ljusögd bulbyl** (*P. davisoni*), i Myanmar.
- Hunsteinmunia (*Lonchura hunsteini*) delas upp i två arter:
 - fjällhuvad munia (*L. hunsteini*), på New Ireland, och;
 - **lavongaimunia** (*L. nigerrima*), på ön Lavongai i Bismarckarkipelagen.
- Bofink (*Fringilla coelebs*) delas upp i fem arter:
 - bofink (*F. coelebs*), från västra Europa österut till Iran och Turkmenistan;
 - **afrikansk bofink** (*F. spodiogenys*), i norra Afrika;
 - **azorbofink** (*F. moreletti*), på Azorerna;
 - **madeirabofink** (*F. maderensis*), på Madeira, och;
 - **kanariebofink** (*F. canariensis*), på Kanarieöarna.
- Antillereufonia (*Chlorophonia musica*) delas upp i tre arter:
 - **hispaniolaefonia** (*Ch. musica*), på Hispaniola;
 - **puertoricoefona** (*Ch. sclateri*), på Puerto Rico, och;
 - **antillereufonia** (*Ch. flavifrons*), i Små Antillerna.
- Kubatangara (*Melopyrrha nigra*) delas upp i två arter:
 - kubatangara (*M. nigra*), på Kuba och Isla de la Juventud, och;
 - **caymantangara** (*M. taylori*), på ön Grand Cayman i Caymanöarna.
- Mestangara (*Xenodacnis parina*) delas upp i två arter:
 - **sydlig mestangara** (*X. parina*), i Anderna i södra Peru, och;
 - **nordlig mestangara** (*X. petersi*), i Anderna från sydcentrala Ecuador till centrala Peru.
- Silverbrynad bergtangara (*Dubusia taeniata*) delas upp i två arter:

- silverbrynad bergtangara (*D. taeniata*), från centrala Colombia och västra Venezuela till nordvästra Peru;
- **ockrastrupig bergtangara** (*D. carrikeri*), i norra Colombia;
- **streckkronad bergtangara** (*D. stictocephala*), från norra Peru till sydcentrala Peru.

En nyligen beskriven art tillkommer:

- **Iberáfrötangara** (*Sporophila iberaensis*) har beskrivits som en ny art. Arten förekommer i översvämmade gräsmarker i nordöstra Argentina.

21 arter stryks från listan:

- Guatemalaskrikuv (*M. guatemalae*) slås samman med vattrad skrikuv (*M. vermiculatus*), den sammanslagna arten behåller namnet **vattrad skrikuv** (*M. vermiculatus*).
- Vitbröstad dvärgbarbett (*Pogoniulus makawai*), endast känd från ett exemplar, stryks som art och betraktas numera som en felfärgad gulgumpad dvärgbarbett.
- Svartprickig dvärgspett (*Picumnus nigropunctatus*) slås samman med fjällig dvärgspett (*P. squamulatus obsoletus*), den sammanslagna arten behåller namnet **fjällig dvärgspett** (*P. squamulatus*).
- Fjällbröstad hackspett (*Celeus grammicus*) slås samman med vågspett (*C. undatus*), den sammanslagna arten behåller namnet **vågspett** (*C. undatus*).
- Mariasamazon (*Amazona tresmariae*) slås samman med gulhuvad amazon (*A. oratrix*), den sammanslagna arten behåller namnet **gulhuvad amazon** (*A. oratrix*).
- Nordlig mjölamazon (*Amazona guatemalae*) slås samman med sydlig mjölmazon (*A. farinosa*), den sammanslagna arten får namnet **mjölamazon** (*A. farinosa*).
- Västlig markpapegoja (*Pezoporus flaviventris*) slås samman med östlig markpapegoja (*P. wallicus*), den sammanslagna arten får namnet **markpapegoja** (*P. wallicus*).
- Paráträdklättrare (*Hylexetastes brigidai*) slås samman med enfärgad trädklättrare (*H. uniformis*), den sammanslagna arten behåller namnet **enfärgad trädklättrare** (*H. uniformis*).
- Tschuditrädklättrare (*Xiphorhynchus chunchotambo*) slås samman med droppträdklättrare (*X. ocellatus*), den sammanslagna arten behåller namnet **droppträdklättrare** (*X. ocellatus*).
- Punakanastero (*Asthenes sclateri*) slås samman med stimryggig kanastero (*A. wyatti*), den sammanslagna arten behåller namnet **stimryggig kanastero** (*A. wyatti*).
- Ponderosaempid (*Empidonax occidentalis*) slås samman med västempid (*E. difficilis*), den sammanslagna arten behåller namnet **västempid** (*E. difficilis*).
- Fantidrongo (*Dicrurus atactus*) slås samman med sammetsdrongo (*D. modestus*), den sammanslagna arten behåller namnet **sammetsdrongo** (*D. modestus*).
- Saheldrongo (*Dicrurus divaricatus*) slås samman med klykstjärtad drongo (*D. adsimilis*), den sammanslagna arten behåller namnet **klykstjärtad drongo** (*D. adsimilis*).

- Västafrikansk drongo (*Dicrurus occidentalis*) slås samman med tvärstjärtad drongo (*D. ludwigii*), den sammanslagna arten behåller namnet **tvärstjärtad drongo** (*D. ludwigii*).
- Bergärtsångare (*Curruca althaea*) och ökenärtsångare (*C. minula*) slås samman med ärtsångare (*C. curruca*), den sammanslagna arten behåller namnet **ärtsångare** (*C. curruca*).
- Itombweflugsnappare (*Muscicapa itombwensis*) slås samman med lenduflugsnappare (*M. lendu*), den sammanslagna arten behåller namnet **lenduflugsnappare** (*Fraseria lendu*).
- Gråkronad bladfågel (*Chloropsis lazulina*) slås samman med orangebukig bladfågel (*C. hardwickii*), den sammanslagna arten behåller namnet **orangebukig bladfågel** (*C. hardwickii*).
- Malawisparv (*Emberiza vincenti*) slås samman med kapsparv (*E. capensis*), den sammanslagna arten behåller namnet **kapsparv** (*E. capensis*).
- Nordlig bergkasik (*Cacicus leucoramphus*) slås samman med sydlig bergkasik (*C. chrysonotus*), den sammanslagna arten får namnet **bergkasik** (*C. chrysonotus*).
- Veracruztrupial (*Icterus fuertesi*) slås samman med trädgårdstrupial (*I. spurius*), den sammanslagna arten behåller namnet **trädgårdstrupial** (*I. spurius*).

Övriga justeringar

- Prakhäger återfår namnet **praktnatthäger** då arten står nära vittryggig natthäger.
- Wahlbergs örn förenklas till **wahlbergörn**.
- Aztekbarbett får det nya namnet **klonäbbad barbett**, som beskriver den unika näbben. Namnet aztekbarbett är gravt missvisande då arten inte alls förekommer i de områden som tillhörde aztekernas rike.
- Större gultofskakadua förenklas till **gultofskakadua**.
- Gråbröstad honungsfågel justeras till det mer rättvisande namnet **gråpannad honungsfågel**.
- Rosthuvudsvala justeras till **rosthuvad svala**.
- Efter önskemål om kortare namn på dvärglärkorna i släktet *Alaudala* från bland annat Raritetskommittén stryks ordet ”dvärg” från namnen. Detta ger följande namn:
 - **athilärka** (v. 15 athidvärglärka)
 - **sidenväglärka** (v. 15 sidenvägsdvärglärka)
 - **tuvlärka** (v. 15 somaliadvärglärka)
 - **medelhavslärka** (v. 15 medelhavsdvärglärka)
 - **turkestanlärka** (v. 15 turkestandvärglärka)
 - **sandlärka** (v. 15 sanddvärglärka)
- Baserat på genetiska studier har vilka arter som förs till det genetiskt distinkta släktet *Vauriella*, förändrats. Släktet får nu det svenska namnet skuggsnappare. Dock visar genetiska studier att mindanaodjungelflugsnappare inte är en *Vauriella* varför den undantas. De nya namnen blir:
 - **borneoskuggsnappare** (v. 15, vitbrynad djungelflugsnappare)
 - **visayaskuggsnappare** (v. 15, visayadjungelflugsnappare)

- **luzonskuggsnappare** (v. 15, luzondjungelflugsnappare)
- **banditflugsnappare** (v. 15, mindanaodjungelflugsnappare)
- **bagoboskuggsnappare** (v. 15, bagoboskvätta)
- Karmosinbröstad solfågel justeras till **scharlakansbröstad solfågel**, vilket är i linje med namnet på flera andra språk.
- Olivkardinal justeras till det mer unika **gultyglad kardinal** i samband med att motsvarande ändring gjorts även av IOC och SACC.
- Ett antal arter med eponymer i namnet justeras till enklare och/eller mer informativa namn. Eponymnamn är sådana som bygger på ett personnamn, exempelvis kommer denhamtrapp från Sir Henry Mangles Denham. För förklaring av geografiska namn m.m. se ordlistan med geografiska namn, biotopnamn, folkslag m.m. på Tk:s webbplats:
 - **dariéntinamo** (v. 15, chocótinamo)
 - **loretohock** (v. 15, salvintocko)
 - **prakttragopan** (v. 15, temmincktragopan)
 - **fujiantragopan** (v. 15, cabottragopan)
 - **brokfasan** (v. 15, elliotfasan)
 - **taiwanfasan** (v. 15, swinhoefasan)
 - **sumatrafasan** (v. 15, salvadorifasan)
 - **oranjefrankolin** (v. 15, archerfrankolin)
 - **högländsnattskärre** (v. 15, archboldnattskärre)
 - **sundanattskärre** (v. 15, bonapartenattskärre)
 - **klippnattskärre** (v. 15, salvadorinattskärre)
 - **stjärngrodmun** (v. 15, gouldgrodmun)
 - **blythgrodmun** (v. 14, malajgrodmun)
 - **inkaeremit** (v. 15, köpckeeremit)
 - **turkospannad solängel** (v. 15, loungemaresolängel)
 - **purpurkronad kolibri** (v. 15, rivolikolibri)
 - **kalifornienkolibri** (v. 15, allenkolibri)
 - **indigostjärtad smaragd** (v. 15, blåstjärtssmaragd)
 - **safirpannad smaragd** (v. 15, humboldtsmaragd)
 - **gulmaskad turako** (v. 15, rossturako)
 - **kustturako** (v. 15, fischerturako)
 - **brunhuvad trapp** (v. 15, ludwigtrapp)
 - **rostnackad trapp** (v. 15, denhamtrapp)
 - **törnkoua** (v. 15, verreauxkoua)
 - **grönglansgök** (v. 15, klaasglansgök)
 - **visselhökgök** (v. 15, hodgsonhökgök)
 - **chocóduva** (v. 15, goodsonduva), samtidigt justeras chocóduva till **blekduva**
 - **vattenkrönduva** (v. 15, sclaterkrönduva)

- **bismarckkejsarduva** (v. 15, finschkejsarduva)
- **svartskuldrad kejsarduva** (v. 15, pinonkejsarduva)
- **bandkejsarduva** (v. 15, zoekejsarduva)
- **menhonorall** (v. 15, hawkinsrall)
- **roststrupig ökenlöpare** (v. 15, jerdonökenlöpare)
- **cayennetärna** (v. 15, Cabots tärna)
- **persisk småtärna** (v. 15, Saunders småtärna)
- **kalifornienalka** (v. 15, Scripps californialka), samtidigt justeras californialka till **mexikansk alka**
- **humboldtstormsva** (v. 15, elliotstormsva)
- **iotostormsva** (v. 15, matsudairastormsva)
- **maoripetrell** (v. 15, cookpetrell)
- **långnäbbad petrell** (v. 15, stejnegerpetrell)
- **newirelandpetrell** (v. 15, beckpetrell)
- **pymgélira** (v. 15, bryanlira)
- **kaikouralira** (v. 15, huttonlira)
- **kariblira** (v. 15, audubonlira)
- **mindre sankthelenapetrell** (v. 15, olsonpetrell), samtidigt justeras sankthelenapetrell till **större sankthelenapetrell**
- **blåkindad stork** (v. 15, abdimstork)
- **kastanjerördrom** (v. 15, Schrenks dvärgrördrom)
- **orientbaza** (v. 15, jerdonbaza)
- **kuskusörn** (v. 15, gurneyörn)
- **skogsörn** (v. 15, cassinörn)
- **tigerhök** (v. 15, doriahök)
- **rosenringtrogon** (v. 15, diardtrogon)
- **kunenetoko** (v. 15, monteirotoko)
- **rödfläckig barbett** (v. 15, vieillotberbett)
- **smalnäbbad honungsvisare** (v. 15, cassinhonungsvisare)
- **kortnäbbad honungsvisare** (v. 15, willcockshonungsvisare)
- **selvasdvärgspett** (v. 15, Lafresnays dvärgspett)
- **nicaraguaspett** (v. 15, hoffmannspett)
- **ovambopapegoja** (v. 15, rüppellpapegoja)
- **serraregalparakit** (v. 15, pfrimerparakit)
- **gulkindad rosella** (v. 15, stanleyrosella)
- **pastellparakit** (v. 15, bourkeparakit)
- **grönstreckad lorikit** (v. 15, goldielorikit)
- **rödskäggig fikonpapegoja** (v. 15, edwardsfikonpapegoja)
- **gulskäggig fikonpapegoja** (v. 15, salvadorifikonpapegoja)

- **serengetidvärgpapegoja** (v. 15, Fischers dvärgpapegoja)
- **albertinebrednäbb** (v. 15, grauerbrednäbb)
- **svartstrupig brednäbb** (v. 15, whiteheadbrednäbb)
- **tapajósträdklättrare** (v. 15, hoffmannsträdklättrare)
- **skallertaggstjärt** (v. 15, McConnells taggstjärt)
- **andinsk taggstjärt** (v. 15, azarataggstjärt)
- **vitsandsmyrsmyg** (v. 15, cherriemyrsmyg)
- **vårzeamyrsmyg** (v. 15, klagesmyrsmyg)
- **flodmyrsmyg** (v. 15, salvadorimyrsmyg)
- **paranámyrfågel** (v. 15, bertonimyrfågel)
- **parádrillmyrfågel** (v. 15, spixdrillmyrfågel)
- **colombiamyrfågel** (v. 15, parkermyrfågel)
- **amahuacamyrfågel** (v. 15, göldimyrfågel)
- **antioquiatapakul** (v. 15, stilestapakul)
- **ecuadorelenia** (v. 15, coopmanselenia)
- **gråhuvad dvärgtyrann** (v. 15, straneckdvärgtyrann)
- **santamartadvärgtyrann** (v. 15, coopmansdvärgtyrann)
- **mindre todityrann** (v. 15, Snethlages todityrann)
- **rosthuvad todityrann** (v. 15, lulutodityrann)
- **häxtyrann** (v. 15, darwintyrann)
- **pampassottyrann** (v. 15, hudsonsottyrann)
- **cajamarcabergtyrann** (v. 15, jelskibergtyrann)
- **polylepisbergtyrann** (v. 15, d'Orbignys bergtyrann)
- **larmkungstyrann** (v. 15, cassinkungstyrann)
- **guyanavisseltyrann** (v. 15, toddvisseltyrann)
- **ljusstrupig topptyrann** (v. 15, nuttingtopptyrann)
- **espíritosantomanakin** (v. 15, wiedmanakin)
- **bronsschifforn** (v. 15, zimmerschifforn)
- **mindre lyrfågel** (v. 15, albertlyrfågel)
- **fläckkronad blåmyg** (v. 15, wallaceblåmyg)
- **svartkronad blåmyg** (v. 15, campbellblåmyg)
- **paradishonungsfågel** (v. 15, macgregorhonungsfågel)
- **newbritainhonungsfågel** (v. 15, gilliardhonungsfågel)
- **cairnshonungsfågel** (v. 15, macleayhonungsfågel)
- **blåögd honungsfågel** (v. 15, belfordhonungsfågel)
- **mikindanibatis** (v. 15, reichenowbatis)
- **brunbröstad batis** (v. 15, woodwardbatis)
- **blåögd busktörnskata** (v. 15, willardbusktörnskata)

- **tanzaniabusktörnskata** (v. 15, füllebornbusktörnskata)
- **guineabusktörnskata** (v. 15, turatibusktörnskata)
- **svartvanga** (v. 15, berniervanga)
- **spikskogsnewtonia** (v. 15, archboldnewtonia)
- **satängnålfågel** (v. 15, petitnålfågel)
- **svartvingad törnskata** (v. 15, mackinnontörnskata)
- **kungsfågelvireo** (v. 15, huttonvireo)
- **västvireo** (v. 15, cassinvireo)
- **buskkråka** (v. 15, Stresemanns buskkråka)
- **vitkronad strålparadisfågel** (v. 15, Carolas strålparadisfågel)
- **mindre sköldparadisfågel** (v. 15, Victorias sköldparadisfågel)
- **regnbågsparadisfågel** (v. 15, wilsonparadisfågel)
- **izumes** (v. 15, owstonmes)
- **kanelmes** (v. 15, davidmes)
- **namibmes** (v. 15, carpmes)
- **drakensberglärka** (v. 15, ruddlärka)
- **libenlärka** (v. 15, archerlärka)
- **lavalärka** (v. 15, williamslärka)
- **gräshoppslärka** (v. 15, jerdonlärka)
- **uarsheklärka** (v. 15, ashlärka)
- **tårlärka** (v. 15, sclaterlärka)
- **herdelärka** (v. 15, bothalärka)
- **rostkronad lärka** (v. 15, blanfordlärka)
- **lendugrönbulbyl** (v. 15, prigoginegrönbulbyl)
- **tanzaniagrönbulbyl** (v. 15, shelleygrönbulbyl)
- **kustgrönbulbyl** (v. 15, fischergrönbulbyl)
- **västafricansk grönbulbyl** (v. 15, baumanngrönbulbyl)
- **sepiabulbyl** (v. 15, charlottebulbyl)
- **albertinestubbstjärt** (v. 15, neumannstubbstjärt)
- **moçambiquespretstjärt** (v. 15, livingstonespretstjärt)
- **katangasångare** (v. 15, laurasångare)
- **himalayabambusångare** (v. 15, Whistlers bambusångare)
- **bergbambusångare** (v. 15, Biankis bambusångare)
- **läsångare** (v. 15, garrettsångare)
- **nässelsångare** (v. 15, graysmygsångare)
- **vitbrynad tetraka** (v. 15, Apperts tetraka)
- **grå madagaskarsångare** (v. 15, Rands madagaskarsångare)
- **ulugurusångare** (v. 15, winifredsångare)

- **miomboeremomela** (v. 15, salvadorieremomela)
- **etiopienglasögonfågel** (v. 15, heuglinglasögonfågel)
- **grandecomoreglasögonfågel** (v. 15, kirkglasögonfågel)
- **gråsidig glasögonfågel** (v. 15, everettglasögonfågel)
- **kinesisk alkippa** (v. 15, huetalkippa)
- **kivuskriktrast** (v. 15, chapinskriktrast)
- **drakensbergsockerfågel** (v. 15, gurneysockerfågel)
- **balsagärdsmyg** (v. 15, boucardgärdsmyg)
- **vitbröstad karstgärdsmyg** (v. 15, navagärdsmyg), samtidigt justeras karstgärdsmyg till **rostbröstad karstgärdsmyg**
- **bogotagärdsmyg** (v. 15, apolinargärdsmyg)
- **björkträdkrypare** (v. 15, hodgsonträdkrypare)
- **arizonahärmtrast** (v. 15, bendirehärmtrast)
- **massajglansstare** (v. 15, hildebrandtglansstare)
- **myrraglsstare** (v. 15, shelleyglansstare)
- **tjocknäbbad glansstare** (v. 15, neumannglansstare)
- **kolstare** (v. 15, kenrickstare)
- **västafrikansk rosttrast** (v. 15, finschrosttrast)
- **kongorosttrast** (v. 15, fraserrosttrast)
- **balsamskogstrast** (v. 15, bicknellskogstrast)
- **fjällbröstad flugsnappare** (v. 15, Frasers skogsflugsnappare), samtidigt förenklas vitbrynad skogsflugsnappare till **vattenflugsnappare**
- **indisk flugsnappare** (v. 15, tickellflugsnappare)
- **tanzaniaakalat** (v. 15, sharpeakalat)
- **kinesisk rödstjärt** (v. 15, hodgsonrödstjärt)
- **flodbuskskvätta** (v. 15, jerdonbuskskvätta)
- **vitryggig stenskvätta** (v. 15, finschstenskvätta)
- **fjällryggig solfågel** (v. 15, reichenbachsolfågel)
- **katangasolfågel** (v. 15, bannermansolfågel)
- **rubinbröstad solfågel** (v. 15, huntersolfågel)
- **karminbröstad solfågel** (v. 15, hasseltsolfågel)
- **nyikasolfågel** (v. 15, whytesolfågel)
- **ljungsolågel** (v. 15, rockefellersolfågel)
- **ngurusolfågel** (v. 15, moreausolfågel)
- **ruvusolfågel** (v. 15, hofmannsolfågel)
- **gråbröstad solfågel** (v. 15, ursulasolfågel)
- **enfärgad solfågel** (v. 15, batessolfågel)
- **komorsolfågel** (v. 15, humblotsolfågel)
- **compostelasolfågel** (v. 15, linasolfågel)

- **sahyadrisolfågel** (v. 15, vigorssolfågel)
- **scharlakansolfågel** (v. 15, temmincksolfågel)
- **gulgumpad spindeljägare** (v. 15, Whiteheads spindeljägare)
- **etiopiensparv** (v. 15, swainsonsparv)
- **kamerunvävare** (v. 15, batesvävare)
- **brunsidig vävare** (v. 15, weynsvävare)
- **kolvävare** (v. 15, maxwellvävare)
- **bågstjärtad vidafink** (v. 15, jacksonvidafink)
- **mindre olivastrild** (v. 15, Shelleys olivastrild)
- **rödnäbbad bergastrild** (v. 15, Shelleys bergastrild)
- **fläckig myrpickare** (v. 15, woodhousemyrpickare)
- **kivuastrild** (v. 15, kandtastrild)
- **karakoramrosenfink** (v. 15, blythrosenfink)
- **kunlunrosenfink** (v. 15, sillemrosenfink)
- **härmfink** (v. 15, cassinfink)
- **kragssiska** (v. 15, salvadorisiska)
- **gråstrupig sparv** (v. 15, goslingsparv)
- **svartkindad sparv** (v. 15, cabanissparv)
- **stråsparv** (v. 15, botterisparv)
- **himmelsparv** (v. 15, cassinsparv)
- **bleksparv** (v. 15, brewersparv)
- **svarthuvad trupial** (v. 15, audubontrupial)
- **orangebrynad trupial** (v. 15, bullocktrupial)
- **sumpskogssångare** (v. 15, bachmanskogssångare)
- **enskogssångare** (v. 15, Virginias skogssångare)
- **grå skogssångare** (v. 15, semperskogssångare)
- **granskogssångare** (v. 15, townsendskogssångare)
- **olivkardinal** (v. 15, carmiolkardinal)

*Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund, Tk,
6 september 2023.*

Namnlistan, version 15



I den nya uppdateringen väljer IOC:s att splitta blåvanga i två arter. På bilden den nya arten komorvanga (*Cyanolanius comorensis*), från Mohéli i Komorerna. Foto: Markus Lagerqvist.

Version 15 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 13.1 (februari 2023). Liksom i IOC:s förra uppdatering görs ett antal ändringar på släktesnivå som inte påverkar de svenska namnen och därför inte redovisas här.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar:

- Blåstrupig guan (*Pipile cumanensis*) delas upp i två arter:
 - blåstrupig guan (*P. cumanensis*), från östra Colombia västerut till Franska Guyana, samt söderut till norra Bolivia, och;
 - **vitstrupig guan** (*P. grayi*), från sydöstra Peru, österut till nordöstra Paraguay.
- Tofspärlhöna (*Guttera pucherani*) delas upp i tre arter:
 - **västlig tofspärlhöna** (*G. verreauxi*), från Guinea-Bissau till nordvästra Kamerun, västra Kenya, Zambia och Angola;
 - **östlig tofspärlhöna** (*G. pucherani*), från sydvästra Somalia till centrala Tanzania, och;
 - **sydlig tofspärlhöna** (*G. edouardi*), från sydöstra Tanzania till Sydafrika.
- Släthuvad eldrygg (*Lophura erythrophthalma*) delas upp i två arter:
 - **svart eldrygg** (*L. erythrophthalma*), från Malackahalvön och Sumatra, och;
 - **grå eldrygg** (*L. pyronota*), från norra Borneo.
- Tofseldrygg (*Lophura ignita*) delas upp i två arter:
 - **rostbukig eldrygg** (*L. ignita*), från Bangka och Borneo, och;
 - **strimmig eldrygg** (*L. rufa*), från Malackahalvön och Sumatra.
- Malajhöna (*Tropicoperdix charltonii*) delas upp i två arter:
 - malajhöna (*T. charltonii*), från ~~från~~ Malackahalvön och Sumatra, och;

- **sababhöna** (*T. graydoni*), från Sabah, norra Borneo.
- Miombofrankolin (*Scleroptila shelleyi*) delas upp i två arter:
 - miombofrankolin (*S. shelleyi*), från östra och sydöstra Afrika och;
 - **zambiafrankolin** (*S. whytei*), från sydöstligaste Kongo-Kinshasa, norra Zambia och nordöstligaste Malawi.
- Vitkragad inka (*Coeligena torquata*) delas upp i tre arter:
 - vitkragad inka (*C. torquata*), från nordvästra Venezuela och Colombia till södra Peru;
 - **gröninka** (*C. conradii*), från nordöstra Colombia och nordvästra Venezuela, och;
 - **rostkragad inka** (*C. inca*), från sydöstra Peru till Bolivia.
- Gyllenbukig inka (*Coeligena bonapartei*) delas upp i tre arter:
 - gyllenbukig inka (*C. bonapartei*), från östra Colombia;
 - **perijáinka** (*C. consita*), från Perijábergen på gränsen mellan Colombia och Venezuela, och;
 - **méridainka** (*C. eos*), från västra Venezuela, huvudsakligen i provinsen Mérida.
- Grönbukig smaragd (*Saucerottia viridigaster*) delas upp i två arter:
 - grönbukig smaragd (*S. viridigaster*), från norra Colombia och västra Venezuela, och;
 - **kopparstjärtad smaragd** (*S. cupreicauda*), från gränstrakterna mellan Venezuela, Guyana och Brasilien.
- Grön kejsarduva (*Ducula aenea*) delas upp i två arter:
 - grön kejsarduva (*D. aenea*), som är vidspridd i sydöstra Asien, och;
 - **engganokejsarduva** (*D. oenothorax*), från ön Enggano väster om Sumatra.
- Mongolpipare (*Charadrius mongolus*) delas (i kommande version 13.2) upp i två arter. Denna uppdelning har sedan tidigare gjorts av Tk:
 - **tibetpipare** (*Ch. atrifrons*), som häckar i bergsområden från Tianshan och Pamir i väster över Tibetanska högplatån till östligaste Tibet, och;
 - **kamtjatkapipare** (*Ch. mongolus*), som häckar i östra Sibirien kring Ochotska havet, bland annat på Tjuktjerhalvön och i Kamtjatka.
- Ullhalsstork (*Ciconia episcopus*) delas upp i två arter:
 - **asiatisk ullhalsstork** (*C. episcopus*), i sydöstra Asien, och;
 - **afrikansk ullhalsstork** (*C. microscelis*), i tropiska Afrika.
- Itombwemaskugglan flyttas från maskugglorna (släktet *Phodilus*) till tornugglorna (släktet *Tyto*), varför namnet justeras till **itombwetornuggla** (*Tyto prigoginei*).
- Blåbandad kungsfiskare (*Alcedo euryzona*) delas upp i två arter:
 - blåbandad kungsfiskare (*A. euryzona*), från Java, och;
 - **malajkungsfiskare** (*A. peninsulae*), som förekommer från södra Myanmar till Malackahalvön, samt på Sumatra och Borneo.
- Sulawesikungsfiskare (*Ceyx fallax*) delas upp i två arter:
 - sulawesikungsfiskare (*C. fallax*), från Sulawesi, och;

- **sangihkekungs fiskare** (*C. sangirensis*), från ön Sangihe, norr om Sulawesi. Arten är möjligen utdöd.
- Ädelpapegoja (*Eclectus roratus*) delas upp i fyra arter:
 - **moluckädelpapegoja** (*E. roratus*), från Moluckerna;
 - **sumbaädelpapegoja** (*E. cornelia*), från Sumba i Små Sundaöarna;
 - **tanimbarädelpapegoja** (*E. riedeli*), från Tanimbaröarna och;
 - **papuaädelpapegoja** (*E. polychloros*), från Nya Guinea med omgivande öar, Salomonöarna och nordöstra Australien.
- Orangebröstad fikonpapegoja (*Cyclopsitta guliemitertii*) delas upp i tre arter:
 - **blåpannad fikonpapegoja** (*C. guliemitertii*), från Raja Ampat-öarna och Vogelkophalvön, nordvästra Nya Guinea;
 - **svartpannad fikonpapegoja** (*C. nigrifrons*), från norra Nya Guinea, och;
 - **svartkindad fikonpapegoja** (*C. melanogenia*), från Aruöarna och södra Nya Guinea.
- Filippinhängpapegoja (*Loriculus philippensis*) delas upp i två arter:
 - filippinhängpapegoja (*L. philippensis*), från Filippinerna (förutom Palawan och Suluöarna), och;
 - **suluhängpapegoja** (*L. bonapartei*), från Suluöarna.
- Kastanjebröstad knottfågel (*Conopophaga aurita*) delas upp i två arter:
 - kastanjebröstad knottfågel (*C. aurita*), i västra, norra och nordöstra Amazonas, och;
 - **paráknottfågel** (*C. snethlageae*), från östra och östcentrala Amazonas i Brasilien, huvudsakligen i delstaten Pará.
- Grå elenia (*Myiopagis caniceps*) delas upp i tre arter:
 - **gråhuvad elenia** (*M. caniceps*), från sydöstra Brasilien till Bolivia, Paraguay och norra Argentina;
 - **chocóelenia** (*M. parambae*), från östra Panama till nordvästra Ecuador, och;
 - **amazonelenia** (*M. cinerea*), i Amazonas från östra Colombia och södra Venezuela till östra Ecuador, nordöstra Peru och nordvästra Brasilien.
- Musfärgad dvärgtyrann (*Phaeomyias murina*) flyttas till släktet *Nesotriccus* och delas upp i två arter:
 - musfärgad dvärgtyrann (*Nesotriccus murinus*), från Guyanas och Amazonas till östra Brasilien, Paraguay och nordvästra Argentina, och;
 - **buskdvärgtyrann** (*N. incomtus*), från Costa Rica och Panama genom Colombia till nordöstra Ecuador, Venezuela, Trinidad och Guyana.
- Tumbesdvärgtyrann (*Phaeomyias tumbezana*) flyttas till släktet *Nesotriccus* och delas upp i två arter:
 - tumbesdvärgtyrann (*Nesotriccus tumbezanus*), i sydvästra Ecuador och nordvästra Peru (provinsen Tumbes), och;
 - **marañóndvärgtyrann** (*N. maranonicus*), nordcentrala Peru, kring floden Marañóns dalgång.
- Mindre ärletyrann (*Stigmatura napensis*) delas upp i två arter:

- amazonärletyrann (*S. napensis*), längs Amazonfloden och några av dess biflöden, och;
- **bahiaärletyrann** (*S. bahiae*), i östra Brasilien från Ceará till södra Bahia.
- Olivstrimmig tyrann (*Mionectes olivaceus*) delas upp i två arter:
 - **costaricatyrann** (*M. olivaceus*), i Costa Rica och västra Panama, och;
 - **olivstrimmig tyrann** (*M. galbinus*), från östra Panama österut till östra Venezuela och söderut till norra Bolivia.
- Strecktyrann (*Myiophobus fasciatus*) delas upp i tre arter:
 - **bruntyrann** (*M. fasciatus*), i stora delar av Sydamerika från Costa Rica till norra Argentina öster om Anderna;
 - **ecuadortyrann** (*M. crypterythrus*), från sydvästligaste Colombia genom Ecuador till nordvästra Peru, och;
 - **kusttyrann** (*M. rufescens*), längs Perus Stillahavskust till nordligaste Chile.
- Tropikpivi (*Contopus cinereus*) delas upp i två arter:
 - tropikpivi (*C. bogotensis*), från sydöstra Mexiko till norra Sydamerika, och;
 - **brasilienpivi** (*C. cinereus*), från i södra Sydamerika, från sydöstra Brasilien till Paraguay och norra Argentina.
- Brunryggig bergtyrann (*Ochthoeca fumicolor*) delas upp i två arter:
 - brunryggig bergtyrann (*O. fumicolor*), från västra Colombia och nordvästra Venezuela till centrala Bolivia, och;
 - **rostbrynad bergtyrann** (*O. superciliosa*), i västra Venezuela.
- Grön manakin (*Cryptopipo holochlora*) delas upp i två arter:
 - grön manakin (*C. holochlora*), från östra Colombia till sydöstra Peru, och;
 - **chocómanakin** (*C. litae*), från östra Panama till västra Ecuador.
- Kapbatis (*Batis capensis*) delas upp i två arter:
 - kapbatis (*B. capensis*), i Zimbabwe, södra och västra Moçambique och Sydafrika, och;
 - **malawibatis** (*B. dimorpha*), i Malawi, östra Zambia och norra Moçambique.
- Blåvanga (*Cyanolanius madagascarinus*) delas upp i två arter:
 - blåvanga (*C. madagascarinus*), från Madagaskar, och;
 - **komorvanga** (*C. comorensis*), från Grande Comore och Anjouan i Komorerna.
- Falknäbb (*Falcunculus frontatus*) delas upp i tre arter:
 - **östlig falknäbb** (*F. frontatus*), från i nordöstra Queensland från Atherton till sydöstra South Australia och Victoria;
 - **nordlig falknäbb** (*F. whitei*), från nordligaste Western Australia och Top End, norra Northern Territories, och;
 - **västlig falknäbb** (*F. leucogaster*), i sydvästra Western Australia.
- Rödnackad lärka (*Mirafra africana*) delas upp i två arter:
 - rödnackad lärka (*M. africana*), vida spridd i tropiska Afrika, och;
 - **silolärka** (*M. sharpii*), i västra Somaliland, huvudsakligen på Silo- och Tuuyoslätterna, samt kring Bankisah.

- Svartstrupig prinia (*Prinia atrogularis*) delas upp i två arter:
 - svartstrupig prinia (*P. atrogularis*), i östra Himalaya och sydvästra Kina, och;
 - **rostkronad prinia** (*P. khasiana*), från nordöstra Indien och västra Myanmar.
- Korallnäbbad sabeltimalia (*Pomatorhinus ferruginosus*) delas upp i två arter:
 - svartkronad sabeltimalia (*P. ferruginosus*), i östra Himalaya, och;
 - **brunkronad sabeltimalia** (*P. phayrei*), i nordöstra Indien, Yunnan och centrala Indokina.
- Beostare (*Gracula religiosa*) delas upp i två arter:
 - beostare (*G. religiosa*), som är vida spridd i Sydosasien, och;
 - **tenggarabeostare** (*G. venerata*), från Små Sundaöarna (Nusa Tenggara).
- Vithuvad majna (*Acridotheres burmannicus*) delas upp i två arter:
 - **burmamajna** (*A. burmannicus*), i Myanmar och sydvästra Kina, och;
 - **vinmajna** (*A. leucocephalus*), som förekommer från Thailand till Vietnam.
- Jordtrast (*Turdus litsitsirupa*) delas upp i två arter:
 - jordtrast (*T. litsitsirupa*), i stora delar av södra Afrika, och;
 - **hedtrast** (*T. simensis*), i höglandet i Etiopien och Eritrea.
- Blåbröstad flugsnappare (*Cyornis herioti*) delas upp i två arter:
 - blåbröstad flugsnappare (*C. herioti*), från norra och centrala Luzon, och;
 - **bikolflugsnappare** (*C. camarinensis*), från Bikolregionen (södra Luzon och Catanduanes).
- Sulawesiflugsnappare (*Cyornis omissus*) delas upp i två arter:
 - sulawesiflugsnappare (*Cyornis omissus*), från Sulawesi, och;
 - **kalaoflugsnappare** (*Cyornis kalaoensis*), från Kalao söder om Sulawesi.
- Blå kortvinge (*Brachypteryx montana*) delas upp i fem arter:
 - **javakortvinge** (*B. montana*), från Java;
 - **filippinkortvinge** (*B. poliogyna*), från Filippinerna;
 - **borneokortvinge** (*B. erythrogyna*), från norra Borneo;
 - **sumatrakortvinge** (*B. saturata*), från Sumatra, och;
 - **floreskortvinge** (*B. floris*), från Flores i Små Sundaöarna;
- Japansk näktergal (*Larvivora akahige*) delas upp i två arter:
 - japansk näktergal (*L. akahige*), som förekommer från södra Sachalin söderut till Kyushu, och;
 - **izunäktergal** (*L. tanensis*), från Izuöarna (södra Japan).
- Skogsstentrast (*Monticola sharpei*) delas upp i två arter:
 - skogsstentrast (*M. sharpei*), i större delen av Madagaskar, och;
 - **amberstentrast** (*M. erythronotus*), i Amberbergen på norra Madagaskar.
- Svartpannad stenskvätta (*Oenanthe bottae*) delas upp i två arter:
 - **jemenstenskvätta** (*O. bottae*), från sydvästra Arabiska halvön, och;
 - **högländsstenskvätta** (*O. frenata*), i högländerna i Etiopien och Eritrea.

- Svartnackad vävare (*Ploceus nigricollis*) delas upp i två arter:
 - svartnackad vävare (*P. nigricollis*), i centrala och östra Afrika, och;
 - **olivnackad vävare** (*P. brachypterus*), i västra Afrika från Senegal till Kamerun.
- Vieillotvävare (*Ploceus nigerrimus*) delas upp i två arter:
 - svartvävare (*P. nigerrimus*), som förekommer från sydöstra Nigeria till västra Kenya, söderut till Kongo-Kinshasa och Angola, och;
 - **kastanjeryggig vävare** (*P. castaneofuscus*), från Sierra Leone till Nigeria.
- Scharlakansvävare (*Anaplectes rubriceps*) delas upp i två arter:
 - scharlakansvävare (*A. rubriceps*), i stora delar av tropiska Afrika, och;
 - **rödvävare** (*A. jubaensis*), i södra Somalia och nodöstra Kenya.
- Rödhalsad vidafink (*Euplectes ardens*) delas upp i två arter:
 - rödhalsad vidafink (*E. ardens*), som förekommer från Sierra Leone österut till södra Kenya och söderut till Sydafrika, och;
 - **rödhuvad vidafink** (*E. laticauda*), från Sudan, Eritrea och Etiopien till centrala Kenya och norra Tanzania.
- Amazontangara (*Tangara mexicana*) delas upp i två arter:
 - amazontangara (*T. mexicana*), på Trinidad, i östra Venezuela, Guyanaregionen och Amazonasområdet, och;
 - **vitbukig tangara** (*T. brasiliensis*), med en isolerad population i sydöstra Brasilien.

Tre nyligen beskrivna arter tillkommer:

- **Príncipevärguv** (*Otus bikegila*) från ön Príncipe i Guineabukten har beskrivits som en ny art.
- **Stillahavsädelpapegoja** (*Eclectus infectus*), numera utdöd, fanns tidigare på Tonga, Vanuatu, och kanske Fiji. Arten är endast känd från fossil.
- **Wangiwangiglasögonfågel** (*Zosterops paruhbesar*), från ön Wangiwangi söder om Sulawesi, har beskrivits som en ny art.

14 arter stryks från listan:

- Svartpannad sporrhöna (*Pternistis atrifrons*) slås samman med rostkindad sporrhöna (*P. castaneicollis*), den sammanslagna arten får namnet **etiopiensporrhöna** (*P. castaneicollis*).
- Mörkskuldrad nattskärre (*Caprimulgus nigriscapularis*) slås samman med visselnattskärre (*C. pectoralis*), den sammanslagna arten behåller namnet **visselnattskärre** (*C. pectoralis*).
- Den utdöda gouldsmaragden (*Riccordia elegans*), endast känd från ett exemplar av oklart geografiskt ursprung, stryks från listan, då dess taxonmiska status är oklar.

- Malaitakungsfiskare (*Ceyx malaitae*) slås samman med guadalcanalkungsfiskare (*C. nigromaxilla*), den sammanslagna arten behåller namnet **guadalcanalkungsfiskare** (*C. nigromaxilla*).
- Tjocknäbbad honungsvisare (*Indicator conirostris*) slås samman med mindre honungsvisare (*I. minor*), den sammanslagna arten behåller namnet **mindre honungsvisare** (*I. minor*).
- Gråhalsad dvärgtyrann (*Serpophaga munda*) slås samman med vittofsad dvärgtyrann (*S. subcristata*), den sammanslagna arten behåller namnet **vittofsad dvärgtyrann** (*S. subcristata*).
- Rhododendronbrokvireo (*Pteruthius ripleyi*) och dalatbrokvireo (*P. annamensis*) slås samman med blythbrokvireo (*P. aeralatus*), den sammanslagna arten får namnet **vitbrynad brokvireo** (*P. aeralatus*).
- Sångbusklärka (*Mirafra cantillans*) slås samman med australisk lärka (*M. javanica*), den sammanslagna arten får namnet **drillärka** (*M. javanica*).
- Sundacettia (*Horornis vulcanius*) slås samman med buskcettia (*H. flavolivaceus*), den sammanslagna arten behåller namnet **buskcettia** (*H. flavolivaceus*).
- Tanahjampeaflugsnappare (*Cyornis djampeanus*) slås samman med sulawesiflugsnappare (*C. omissus*), den sammanslagna arten behåller namnet **sulawesiflugsnappare** (*C. omissus*).
- Rostryggig munia (*Spermestes nigriceps*) slås samman med svartvit munia (*S. bicolor*), den sammanslagna arten behåller namnet **svartvit munia** (*S. bicolor*).
- Ockrabröstad astrild (*Estrilda ochrogaster*) slås samman med sumpastrild (*E. paludicola*), den sammanslagna arten behåller namnet **sumpastrild** (*E. paludicola*).
- Landanaamarant (*Lagonosticta landanae*) slås samman med mörkröd amarant (*L. rubricata*), den sammanslagna arten behåller namnet **mörkröd amarant** (*L. rubricata*).

Övriga justeringar:

- Beskrivningen för bar hud justeras från ”naken-” till ”bar-” i en rad artnamn; barögd duva, barögd rall, barögd kakadua, barhalsad parasollfågel, barstrupig klockkotinga, barhalsad kotinga, bartyglad glasögonfågel, barkindad skriktrast, barögd trast, barkindad spindeljägare (v. 14, naken-)
- Några arter med färger och väderstreck i namnet justeras för att vara konsekvent skrivna; rödhakad smaragd, svartinka, bruninka, västlig grässmyg, rostmonark, brun kroknäbb, brun rävspurv, brun sprötstjärt, nordlig dunrygg, grå kägelnäbb, västlig kilnäbb, östlig gråmes (v. 14, rödhakesmaragd, svart inka, brun inka, västgrässmyg, rostbrun monark, brunkroknäbb, brunrävspurv, brunsprötstjärt, norddunrygg, gråkägelnäbb, västkilnäbb och östgråmes).
- Några arter med eponymer i namnet justeras till enklare och/eller mer informativa namn:
 - **ghatsnattskärre** (v. 14, jerdonnattskärre)
 - **moçambiqueturako** (v. 14, livingstoneturako)
 - **kenyaturako** (v. 14, haurtlabturako)
 - **tjocknäbbad strandpipare** (v. 14, wilsonstrandpipare)
 - **stillahavsgökduva** (v. 14, mackinlaygökduva)
 - **större kronduva** (v. 14, scheepmakerkronduva)

- **peruskrikuv** (v. 14, köpckeskrikuv)
- **blåryggig trogon** (v. 14, bairdtrogon)
- **kinabalutrogon** (v. 14, whiteheadtrogon)
- **tenasserimnåshornsfågel** (v. 14, tickellnåshornsfågel)
- **brun nåshornsfågel** (v. 14, austennåshornsfågel)
- **panaynåshornsfågel** (v. 14, waldennåshornsfågel)
- **blåkronad kungsfiskare** (v. 14, hombrunkungsfiskare)
- **gulpannad tukanett** (v. 14, waglertukanett)
- **vitvingad barbett** (v. 14, whytebarbett)
- **miombospett** (v. 14, bennettspett)
- **karmosinpannad parakit** (v. 14, finschparakit)
- **tepuiborsttyrann** (v. 14, chapmanborsttyrann)
- **vitsandstodityrann** (v. 14, Pelzelns todityrann)
- **ockratodityrann** (v. 14, kämpfertodityrann)
- **banksiaskogssångare** (v. 14, kirtlandskogssångare)
- En ny genetisk studie visar att papuatigerhäger inte är en tigerhäger varför namnet justeras till endast **papuahäger**.
- Ett foge-s infogas i **lössbergshöna** (v. 14, lössberghöna).
- **Abaysporrhöna** (justerat i v. 14, tidigare etiopisk sporrhöna), efter Abay som är det amhariska namnet på floden Blå Nilen.
- Namnet på fyra nattskärror förenklas språkligt; **lyrnattskärre, gaffelnattskärre, saxnattskärre, svalstjärtad nattskärre** (v. 14, lyrstjärtad nattskärre, gaffelstjärtnattskärre, saxstjärtnattskärre, svalstjärtnattskärre)
- Gråbrun nattskärre justeras till det mer informativa **tamaulipasnattskärre**.
- Elva arter taggstjärtseglare i släktena *Mearnsia*, *Zoonavena*, *Telacanthura*, *Rhaphidura* och *Neafrapus* förenklas till seglare, samtidigt som namnet ”taggstjärtseglare” reserveras för arter i släktet *Hirundapus*. De nya namnen blir:
 - **vitvingeseglar** (v. 14, filippintaggstjärtseglare)
 - **papuaseglare** (v. 14, papuataggstjärtseglare)
 - **merinaseglare** (v. 14, madagaskartaggstjärtseglare)
 - **säotoméseglar** (v. 14, säotométaggstjärtseglare)
 - **hinduseglare** (v. 14, vitgumpad taggstjärtseglare)
 - **baobabseglar** (v. 14, vattrad taggstjärtseglare)
 - **djungelseglare** (v. 14, svart taggstjärtseglare)
 - **silvergumpseglar** (v. 14, silvergumpad taggstjärtseglare)
 - **vitbuchsseglar** (v. 14, Sabines taggstjärtseglare)
 - **stumpseglar** (v. 14, Cassins taggstjärtseglare)
 - **fladdermusseglar** (v. 14, Böhms taggstjärtseglare)

- Genetiska studier har visat att släktet *Rallina* är del av en klad sumphöns, varför namnet justeras från ”rall” till ”sumphöna”. Fyra arter påverkas; **gråbent sumphöna**, **andamansumphöna**, **rödbent sumphöna** och **trefärgad sumphöna** (v. 14, rall).
- Rosabröstad sparvhök står inte nära ”sparvhökarna” varför namnet justeras till **rosabröstad hök**.
- Västperuansk skrikuv ändras till **tumbesskrikuv**, efter Tumbes-regionen i nordvästra Peru.
- Stäppapegoja justeras till den mer korrekta beskrivningen **savannpapegoja**.
- Hackspettarna i släktet *Celeus* har kallats kastanjespettar, men inte alla är kastanjefärgade, speciellt efter att släktet utvidgats efter genetiska studier. Förledet ”kastanje-” stryks därför från namnen, utom ett:
 - **kanelspett** (v. 14, rödstrupig kastanjespett)
 - **vågspett** (v. 14, vågbandad kastanjespett)
 - **fjällbröstad hackspett** (v. 14, fjällig kastanjespett)
 - **kastanjespett** (v. 14, centralamerikansk kastanjespett)
 - **amazonspett** (v. 14, blekkronad kastanjespett)
 - **blektofsad hackspett** (v. 14, blekhuvad kastanjespett)
 - **blondspett** (v. 14, blond kastanjespett)
 - **ockraryggig hackspett** (v. 14, ockraryggig kastanjespett)
 - **gräddspett** (v. 14, gräddfärgad kastanjespett)
 - **fackelspett** (v. 14, rödtofsad kastanjespett)
 - **cerradospett** (v. 14, Kämpfers kastanjespett)
 - **svartbröstad hackspett** (v. 14, svarthalsad kastanjespett)
 - **kanelkindad hackspett** (v. 14, hjälmkastanjespett)
- Det missvisande namnet svartkronad myrtrönskata ändras till **grå myrtrönskata**.
- Gråhuvad elenia justeras till den mer precisa beskrivningen **gråkronad elenia**.
- Två lövtyranner har genetiskt visat sig tillhöra borsttyrannerna, varför namnen justeras till **säopauloborsttyrann** och **serradomarborsttyrann** (v. 14, säopaulolövtyrann, serradomarlövtyrann).
- Det missvisande namnet brungrå myrfågel ändras till **tyrannmyrfågel**.
- I samband med att motsvarande justering görs av IOC justeras namnen på två flatnäbbar till de mer passande **gulbrämad flatnäbb** resp. **gulvingad flatnäbb** (v. 14, zimmerflatnäbb, gulbrämad flatnäbb).
- Rödnackad marktyrann justeras till den mer korrekta beskrivningen **rödkronad marktyrann**.
- Vitrupestsvala justeras till **vitstrupig svala** för att vara konsekvent med andra artnamn.
- Vitgumpsvala ges det mer unika namnet **diademsvala** efter den vita teckningen över ögat – många andra svalor har vit gump.
- Bandad gråfågel får det mer informativa **gulögd gråfågel**, efter en mer unik karaktär.
- Två arter bland flugsnappare med namn med eponymer får mer informativa namn:
 - Chapinflugsnappare justeras till **lenduflugsnappare**, efter utbredningen på Lenduplatån i östra Kongo-Kinshasa.

- Tessmannflugsnappare justeras till **gläntflugsnappare**, efter habitatet.
- Blåstrupig flugsnappare justeras till **ravinflugsnappare**, då en rad andra flugsnappare har blå strupe, och hos denna är det endast en av tre underarter som faktiskt har blå strupe.
- Pärlkortvinge justeras till **pärlskvätta**, då den genetiskt inte tillhör kortvingarna.
- Sindbuskskvätta ändras till **ökenbuskskvätta**, efter artens habitat, då den inte förekommer i provinsen Sind.
- Gul daknis justeras till **gulbukig daknis**, vilket stämmer bättre med utseendet och med artens engelska namn.
- Newbritainmunia justeras till **bismarckmunia** då den förekommer även på flera öar i Bismarckarkipelagen, inklusive Buka och New Ireland.

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund, Tk,
22 februari 2023.

Namnlistan, version 14



En av nyheterna i IOC:s lista är att arabsolfågel splittas från abessinsolfågel. På bilden en arabsolfågel från Saudiarabien. Foto: Markus Lagerqvist.

Version 14 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 12.1 (januari 2022) och 12.2 (augusti 2022). Liksom i IOC:s förra uppdatering görs ett antal ändringar på släktesnivå som inte påverkar de svenska namnen och därför inte redovisas här.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Höglandsfrankolin (*Scleroptila psilolaema*) delas upp i två arter:
 - höglandsfrankolin (*S. psilolaema*), i Etiopien och;
 - **elgonfrankolin** (*S. elgonensis*), från östra Uganda till centrala Kenya. Namnet kommer av berget Mount Elgon på gränsen mellan Uganda och Kenya.
- Hispaniolamango (*Anthracothonax dominicus*) delas upp i två arter:
 - hispaniolamango (*A. dominicus*), från Hispaniola och;
 - **puertoricomango** (*A. aurulentus*), från Puerto Rico och Jungfruöarna.
- Brednäbbad smaragd (*Cynanthus latirostris*) delas upp i två arter:

- brednäbbad smaragd (*C. latirostris*), från sydvästra USA söderut till centrala Mexiko, och;
- **mariaassmaragd** (*C. lawrencei*), endemisk för ögruppen Islas Mariás utanför Mexikos Stillahavskust.
- Salvinvalfågel (*Pachyptila salvini*) delas upp i två arter:
 - **crozetvalfågel** (*P. salvini*), som häckar på Crozet- och Prince Edward-öarna i sydvästra Indiska oceanen, och;
 - **amsterdamvalfågel** (*P. macgillivrayi*), som häckar på Roche Quille, utanför Île Saint-Paul och tidigare Amsterdamön i sydcentrala Indiska oceanen, samt på Gough i södra Atlanten (den senare populationen troligen en obeskriven art).
- Moluckdvärguv (*Otus magicus*) delas upp i två arter:
 - moluckdvärguv (*O. magicus*), i Moluckerna och Små Sundaöarna, och;
 - **wetardvärguv** (*O. tempestatis*), på ön Wetar i Små Sundaöarna.
- Nyazeelandspökuggla (*Ninox novaeseelandiae*) delas upp i två arter:
 - nyazeelandspökuggla (*N. novaeseelandiae*), på Nya Zeeland, och några mindre öar, och;
 - **tasmanspökuggla** (*N. leucopsis*), på Tasmanien.
- Lilakindad kungsfiskare (*Cittura cyanotis*) delas upp i två arter:
 - lilakindad kungsfiskare (*C. cyanotis*), på Sulawesi och Lembah och;
 - **lilabröstad kungsfiskare** (*C. sanghirensis*), på Sangihe och Siau norr om Sulawesi.
- Smyrnakungsfiskare (*Halcyon smyrnensis*) delas upp i två arter:
 - smyrnakungsfiskare (*H. smyrnensis*), från södra Turkiet österut till Kina och Taiwan, och;
 - **brunbröstad kungsfiskare** (*H. gularis*), i Filippinerna.
- Blåstrupig biätare (*Merops viridis*) delas upp i två arter
 - blåstrupig biätare (*M. viridis*), som förekommer från södra Kina söderut till Java och Borneo, och;
 - **filippinbiätare** (*M. americanus*), i Filippinerna.
- Större sultanspett (*Chrysocolaptes guttacristatus*) delas upp i två arter:
 - större sultanspett (*C. guttacristatus*), som förekommer från sydöstra Indien österut till Större Sundaöarna, och;
 - **malabarsultanspett** (*C. socialis*), i syvästra Indien.
- Blåryggig papegoja (*Tanygnathus sumatranus*) delas upp i två arter:
 - **sulawesipapegoja** (*T. sumatranus*), i Sulawesi, och;
 - **blåryggig papegoja** (*T. everetti*), i Filippinerna.
- Rostkronad dvärgtyrann (*Euscarthmus meloryphus*) delas upp i två arter:
 - rostkronad dvärgtyrann (*E. meloryphus*), som förekommer över stora delar av Sydamerika från nordöstra Colombia söderut till norra Argentina, och;
 - **rostpannad dvärgtyrann** (*E. fulviceps*), i sydvästra Ecuador och västra Peru.
- Blåkronad manakin (*Lepidothrix coronata*) delas upp i två arter:

- blåkronad manakin (*L. coronata*), i västra Amazonas, och;
- **sammetsmanakin** (*L. velutina*), från Costa Rica söderut till nordvästra Ecuador.
- MacGregors lövsalsfågel (*Amblyornis macgregoriae*) delas upp i två arter:
 - **fackellövsalsfågel** (*A. macgregoriae*), i bergsområden från västcentrala till sydöstra Nya Guinean, och;
 - **huonlövsalsfågel** (*A. germanus*), i bergen på Huonhalvön på nordöstra Nya Guinea.
- Sulawesimyzomela (*Myzomela chloroptera*) delas upp i två arter:
 - sulawesimyzomela (*M. chloroptera*), från Sulawesi och;
 - **bacanmyzomela** (*M. batjanensis*), ön Bacan i norra Moluckerna.
- Svartmaskad monark (*Symposiachrus trivirgatus*) delas upp i två arter:
 - svartmaskad monark (*S. trivirgatus*), från Små Sundaöarna till östra Australien, och;
 - **lousiadmonark** (*S. melanopterus*), från d'Entrecasteaux-öarna och Louisiaderna öster om Nya Guinea.
- Svart manukod (*Manucodia ater*) delas upp i två arter:
 - svart manukod (*M. ater*), från Nya Guinea, inkl. Raja Ampat-öarna och Aru, och;
 - **tagulamanukod** (*M. alter*), endemisk för ön Vanantainai (eller Sudest), i ögruppen Louisiaderna, sydöst om Nya Guinean. Ön heter på det lokala språket tok pisin Tagula Ailan.
- Timorsångare (*Phylloscopus presbytes*) delas upp i två arter:
 - timorsångare (*P. presbytes*), på Timor och Atauro, och;
 - **floressångare** (*P. floresianus*), på ön Flores i Små Sundaöarna.
- Melanesisk gräsfågel (*Cincloramphus whitneyi*) delas upp i två arter
 - **santogräsfågel** (*C. whitneyi*), endemisk för ön Santo i Vanuatu, och;
 - **guadalcanalgräsfågel** (*C. turipavae*), på Guadalcanal i Salomonöarna.
- Madagaskarglasögonfågel (*Zosterops maderaspatanus*) delas upp i tre arter:
 - madagaskarglasögonfågel (*Z. maderaspatanus*), på Madagaskar, Europaön och Seychellerna;
 - **anjouanglasögonfågel** (*Z. anjuanensis*), på Anjouan i Komorerna, och;
 - **mohéliglasögonfågel** (*Z. comorensis*), Mohéli i Komorerna.
- Gråkindad mestimalia (*Mixornis flavicollis*) delas upp i två arter:
 - gråkindad mestimalia (*M. flavicollis*), på Java och;
 - **kangeanmestimalia** (*M. prillwitzii*), på ön Kangean norr om Bali.
- Abessinsk solfågel (*Cinnyris habessinicus*) delas upp i två arter
 - **abessinsolfågel** (*C. habessinicus*), i Afrika, från nordöstra Sudan österut till Eritrea och norra Kenya, och;
 - **arabsolfågel** (*C. hellmayri*), på sydvästra Arabsika halvön.
- Zebrafink (*Taeniopygia guttata*) delas upp i två arter:

- **sundazebrafink** (*T. guttata*), på Små Sundaöarna, och;
- **australisk zebrafink** (*T. castanotis*), i Australien.
- Gråhuvad sparv (*Emberiza spodocephala*) delas upp i två arter:
 - gråhuvad sparv (*E. spodocephala*), från sydcentrala Ryssland och norra Mongoliet österut till Sachalin och centrala Kina, och;
 - **ainusparv** (*E. personata*), på södra Sachalin, Kurilerna, Hokkaido och norra och centrala Honshu. Området motsvarar ungefärligen de områden som bebos av ursprungsbefolkningen ainu.
- Långstjärtad rosenfink (*Carpodacus sibiricus*) delas upp i två arter:
 - långstjärtad rosenfink (*C. sibiricus*), som förekommer från centrala europeiska Ryssland österut till Sachalin och Kurilerna och Heilongjiang i nordöstra Kina, och;
 - **elegant rosenfink** (*C. lepidus*), från sydöstra Tibet österut till sydvästra Shanxi och nordvästra Yunnan.
- Östlig ängstrupial (*Sturnella magna*) delas upp i två arter:
 - östlig ängstrupial (*S. magna*), som förekommer i ett stort område från sydöstra Kanada söderut till nordöstra Brasilien, och;
 - **chihuahuaängstrupial** (*S. lilianae*), i sydvästra USA och nordvästra och västcentrala Mexiko, inklusive delstaten Chihuahua i Mexiko.

Fem nyligen beskrivna arter tillkommer:

- **Nyakaledonienstormsva** (*Fregetta lineata*) från Nya Kaledonien har beskrivits som en ny art.
- Två nya arter har beskrivits från Meratusbergen på Borneo, de får namnen **meratusglasögonfågel** (*Zosterops meratusensis*) och **meratusflugsnappare** (*Cyornis kadayangensis*).
- *Ploceus holoxanthus* från östra Tanzania betraktas som en unik art efter att tidigare felaktigt klassats som en synonym till *P. subaureus*. Arten får namnet **ruvuväware** (*P. holoxanthus*), efter Ruvufloden.
- En ny tangara från Bolivia och Peru får namnet **gyllingtangara** (*Heliothraupis oneilli*). Även släktet beskrivs som nytt, med en enda art.

Elva arter stryks från listan:

- Australisk fiskgjuse (*Pandion cristatus*) slås samman med fiskgjuse (*P. haliaetus*) den sammanslagna arten behåller namnet **fiskgjuse** (*P. haliaetus*)
- Somaliavråk (*Buteo archeri*) slås samman med augurvråk (*B. augur*) den sammanslagna arten behåller namnet **augurvråk** (*B. augur*).
- Tuxtlasabelvinge (*Pampa excellens*) slås samman med sierramadresabelvinge (*P. curvipennis*), den sammanslagna arten får namnet **mexikansk sabelvinge** (*P. curvipennis*).
- Usambarauv (*Bubo vosseleri*) slås samman med guineauv (*B. poensis*), den sammanslagna arten får namnet **småuv** (*B. poensis*).

- Sichuanugla (*Strix davcidi*) slås samman med slaguggla (*S. uralensis*), den sammanslagna arten behåller namnet **slaguggla** (*S. uralensis*).
- Indonesisk honungsfågel (*Lichmera limbata*) slås samman med brun honungsfågel (*L. indistincta*), den sammanslagna arten behåller namnet **brun honungsfågel** (*L. indistincta*).
- Kinesisk kupvinge (*Pnoepyga mutica*) slås samman med fjällig kupvinge (*P. albiventer*), den sammanslagna arten behåller namnet **fjällig kupvinge** (*P. albiventer*).
- Afrikansk rörsångare (*Acrocephalus baeticatus*) slås samman med rörsångare (*A. scirpaceus*), den sammanslagna arten behåller namnet **rörsångare** (*A. scirpaceus*).
- Aldabrasolfågel (*Cinnyris abbotti*) slås samman med souimangasolfågel (*C. sovimanga*), den sammanslagna arten behåller namnet **souimangasolfågel** (*C. sovimanga*).
- Jemenjärnsparv (*Prunella fagani*) slås samman med svartkronad järnsparv (*P. indistincta*), den sammanslagna arten behåller namnet **svartkronad järnsparv** (*P. ocularis*).
- Caquetáfrötangara (*Sporophila murallae*) slås samman med bandvingad frötangara (*S. americana*), den sammanslagna arten behåller namnet **bandvingad frötangara** (*S. americana*).

Övriga justeringar

- Afrikansk svartand justeras till **flodand**, och stillahavssvartand till **stripand**, då ingen av arterna står nära svartand. Den senaste finns dessutom västerut till Sumatra, varför namnet stillahavs- är felvisande.
- Östlig fläcknäbbband justeras till **kinesisk and**, då arten saknar fläck på näbben och inte är systerart till indisk fläcknäbbband, den senare justeras samtidigt till endast **fläcknäbbsand** (med binde-s i namnet).
- Vitstrupig vaktel justeras till **virginiavaktel** eftersom flera av dess underarter inte har vit strupe.
- Malajsånghöna justeras till **malackasånghöna**, då arten endast förekommer på Malackahalvön.
- Namnet på familjen Cathartidae justeras från Nya världens gamar till **kondorer**, då de inte är nära släkt med gamarna i Gamla världen, och det dessutom finns fossilfynd av de senare i Amerika.
- Namnet på familjen Accipitridae förenklas från hökartade rovfåglare till **hökar**.
- Svalglada justeras till **saxstjärtsglada** för att undvika sammanblandning med svalstjärtsglada.
- Genetiska studier av hökarna i släktet *Accipiter* har visat att den traditionella systematiska ordningen behöver justeras, vilken föranleder några namnjusteringar inom släktet:
 - **rödröstad hök** (v. 13, rödröstad duvhök)
 - **bantuhök** (v. 13, afrikansk duvhök)
 - **brokhök** (v. 13, broksparvhök)
 - **moluckhök** (v. 13, molucksparvhök)
 - **kraghök** (v. 13, australisk sparvhök)
 - **halmaherahök** (v. 13, moluckduvhök)

- **gråhök** (v. 13, grå duvhök)
- **proteushök** (v. 13, variabel duvhök)
- **brunhök** (v. 13, brun duvhök)
- **kinesisk hök** (v. 13, kinesisk sparvhök)
- **rostbröstad sparvhök** (v. 13, rostbröstad hök)
- **vitbröstad sparvhök** (v. 13, vitbröstad hök)
- **inkasparvhök** (v. 13, inkahök)
- **rostbyxad sparvhök** (v. 13, rostbyxhök)
- Grodhök justeras till **tranvråk**, vilket är mer korrekt släktmässigt och syftar på artens långa ben, grodor utgör dessutom bara en mindre del av artens föda.
- Malackasporrgök och malackauv justeras till **malajsporrgök** resp. **malajuv**, då de förutom på Malackahalvön även förekommer på Sumatra och Borneo; uven även på Java.
- Asiatisk glansgök och afrikansk smaragdgök justeras till **beryllglansgök** resp. **smaragdglansgök**, för att få ett sammanhållande släktesnamn för glansgökarna i släktet *Chrysococcyx*, det finns dessutom flera glansgökar i Asien.
- Större och mindre svartsporrgök justeras till **vitnäbbad** resp. **svartnäbbad sporrgök** då de inte är systerarter.
- Röd turkduva justeras till **amarantduva** då arten inte är en systerart till turkduvan.
- Timorgökduva justeras till **svart gökduva**, vilket är i linje med det engelska namnet (Black Cuckoo-Dove) och minimerar sammanblandning med större gökduva (Timor Cuckoo-Dove).
- Strimmig flyghöna förenklas till **strimflyghöna**.
- Brokvipa justeras till **brokpipare** då de vistat sig inte vara en vipa, utan istället systerart till diadempipare och rostbröstpipare.
- I samband med att det engelska namnet på *Cynanthus doubledayi* ändras från Doubleday's Hummingbird till Turquoise-crowned Hummingbird, justeras även det svenska namnet till **turkoskronad smaragd** (v. 13 doubledaysmaragd).
- Justering av stavning till **minahasatornuggla** och **minahasaflugsnappare** (v. 13 minahassatornuggla, minahassaflugsnappare).
- I samband med att det engelska namnet på *Ninox sumbaensis* ändras från Little Sumba Hawk-Owl till Least Boobook, justeras även de svenska namnen på de två späkugglorna på ön Sumba till **dvärgspökuggla** (f.d. mindre sumbaspökuggla) och **sumbaspökuggla** (f.d. större sumbaspökuggla).
- Örontrogon justeras till **öronquetzal**, för att spegla artens släktskap inom familjen.
- Det något missvisande namnet beigebukig hackspett justeras till **skogsbrynsspett**.
- Underarten *permista* av grönryggig hackspett (*Campethera cailliautii*) flyttas till guineaspetten (*C. maculosa*). Det innebär att *Campethera maculosa* inte längre är endemisk för Upper Guinea. Artnamnen justeras därför till **prickspett** (*C. cailliautii*) och **grönryggig hackspett** (*C. maculosa*).
- Perumjukstjärt justeras till **rostmantlad taggstjärt** då arten är inbäddad bland taggstjärtarna i släktet *Cranioleuca*.
- Korrigering av stavning till chachapoyasmyrpitta (v. 13 chachapoyamyrpitta)

- I samband med att det engelska namnet på *Philemon fuscicapillus* ändras från Dusky Friarbird till Morotai Friarbird, justeras även det svenska namnet från halmaheramunkskata till **morotaimunkskata**.
- I samband med att det engelska namnet på *Turdus kessleri* ändras från Kessler's Thrush till White-backed, justeras även det svenska namnet från kesslertrast till **vitryggig trast**.
- IOC justerar namnen på de fyra ökenskrrikorna i släktet *Podoces* från eponymer till namn som beskriver den geografiska utbredningen. Det samma görs på svenska och de nya namnen blir **mongolökenskrrika** (f.d. Hendersons ökenskrrika), **taklamakanökenskrrika** (f.d. Biddulphs ökenskrrika), **turkestanökenskrrika** (f.d. Panders ökenskrrika), och **persisk ökenskrrika** (f.d. Pleskes ökenskrrika).
- Svalstjärtstodityrann justeras till **svalstjärtad todityrann**.
- Boerlärka ändras till det mer informativa namnet **härmlärka**.
- Brunskriktrast ändras till det mer informativa namnet **savannskriktrast**, då det finns många bruna skriktrastar.
- De fyra arterna i släktet *Gymnoris* justeras från savann-, vitbrynad, sahel- och gulstrupig stensparv till **savannsparv**, **backsparv**, **sahelsparv** och **solsparv** då de genetiskt inte står nära stensparv (*Petronia*). De är heller inte särskilt bundna till steniga eller klippiga miljöer.
- Nakenhuvad ändras till skallig, vilket är ett mer vedertaget svenskt språkbruk, fyra arter får de nya namnen; **skallig barbett**, **skallig papegoja**, **skallig bulbyl** och **skallig timalia**.

Justeringar av geografiska namn och eponymer

- Några arter med nationsnamn i genitiv ersätts med kortare sammanskrivna namn:
 - arabrödhöna, arabdvärguv (v. 13 arabisk)
 - **kalifornientofsvaktel**, **kalifornienkondor**, **kalifornienstormsva**, **kalifornienhärmt**, **kaliforniensnårsparv**, **kalifornientrupial** (v. 12, kalifornisk).
 - **perudrillmyrfågel**, **peruängstrupial** (v. 13, peruansk).
- Arter med namnet etiopien-/etiopisk eller abessinien-/abessinsk i namnet har gått igenom och i nedanstående fall justerats för ett mer konsekvent och rättvisande språkbruk:
 - **abessinduva** (v. 13 abessinsk duva)
 - **etiopienturako** (v. 13 etiopisk turako)
 - **etiopienrall** (v. 13 etiopisk rall)
 - **etiopienvipa** (v. 13 etiopisk vipa)
 - **afrikansk hornuggla** (v. 13 etiopisk hornuggla)
 - **orangenäbbad sabelnäbb** (v. 13 abessinsk sabelnäbb)
 - **etiopienbiätare** (v. 13 etiopisk biätare)
 - **abessinspett** (v. 13 abessinsk hackspett)
 - **etiopiengylling** (v. 13 etiopisk gylling)
 - **etiopienbusktörnskata** (v. 13 etiopisk busktörnskata)
 - **somaliakråka** (v. 13 etiopisk korp)

- **etiopiencistikola** (v. 13 etiopisk cistikola)
- **etiopiensvala** (v. 13 etiopisk svala)
- **abessinglasögonfågel** (v. 13 abessinsk glasögonfågel)
- **abessintrast** (v. 13 abessinsk trast)
- **abessinflugsnappare** (v. 13 etiopisk flugsnappare)
- **etiopientermitskvätta** (v. 13 etiopisk termitkvätta)
- **etiopienstenskvätta** (v. 13 etiopisk stenskvätta)
- **etiopienastrild** (v. 13 etiopisk astrild)
- **etiopiensiska** (v. 13 etiopisk siska)
- Genetiska studier har visat att sporrpiplärkor inte är en monofyletisk grupp, arterna har heller inte någon egentlig sporre. Namnen på dessa justeras därför:
 - **etiopienpiplärka** (v. 13 etiopisk sporrpiplärka)
 - **saffranspiplärka** (v. 13 Fülleborns sporrpiplärka)
 - **orangestrupig pipplärka** (v. 13 orangestrupig sporrpiplärka)
 - **gulstrupig pipplärka** (v. 13 gulstrupig sporrpiplärka)
 - **panganipiplärka** (v. 13 panganisporrpiplärka)
 - **scharlakanspiplärka** (v. 13 rödstrupig sporrpiplärka)
 - **angolapiplärka** (v. 13 angolaporrpiplärka)
- Släktet *Criniger* justeras från grönbulbyl till skäggbulbyl, de nya namnen på arterna i släktet blir **västlig skäggbulbyl**, **östlig skäggbulbyl**, **roststjärtad skäggbulbyl**, **vitstrupig skäggbulbyl** och **gulstrupig skäggbulbyl**.
- Några namn med eponymer justeras till mer informativa – ofta enklare – namn:
 - **perutinamo** (v. 13 taczanowskitinamo)
 - **madagaskarand** (v. 13 mellerand)
 - **maskarenkricka** (v. 13 sauzierkricka)
 - **papuaand** (v. 13 salvadoriand)
 - **amazonguan** (v. 13 spixguan)
 - **vitpannad sånghöna** (v. 13 rickettsånghöna)
 - **iturivaktel** (v. 13 nahanvaktel)
 - **bataksånghöna** (v. 13 rollsånghöna)
 - **burmafasan** (v. 13 humefasan)
 - **brudfasan** (v. 13 bulwerfasan)
 - **vietnampåfågelfasan** (v. 13 Germain's påfågelfasan)
 - **vietnamsånghöna** (v. 13 davidsånghöna)
 - **saufrankolin** (v. 13 schlegelfrankolin)
 - **kwanzafrankolin** (v. finschfrankolin)
 - **miombofrankolin** (v. shelleyfrankolin)
 - **malajhöna** (v. 13 charltonhöna)
 - **kustnattskärre** (v. 13 tschudinattskärre)

- **chaparralkolibri** (v. 13 annakolibri)
- **ökenkolibri** (v. 13 costakolibri)
- **bamendaturako** (v. 13 bannermanturako)
- **spetstofsad turako** (s. 13 schlowturako)
- **somaliatrapp** (v. 13 heuglintrapp)
- **akaciatrapp** (v. 13 hartlaubtrapp)
- **sakalavakoua** (v. 13 coquerelkoua)
- **mulgaglansgök** (v. 13 horsfieldglansgök)
- **gråbröstad duva** (v. 13 cassinduva)
- **öbronsduva** (v. 13 malherbeduva)
- **ecuadorsparvduva** (v. 13 buckleysparvduva)
- **maskfruktduva** (v. 13 fischerfruktduva)
- **bandafruktduva** (v. 13 wallacefruktduva)
- **californiarall** (v. 13 ridgwayrall)
- **ussurirall** (v. 13 swinhoerall)
- **socorrolira** (v. 13 townsendlira)
- **kongonattskärre** (v. 13 batesnattskärre)
- **nordlig grodmun** (v. 13 hodgsongrodmun)
- **karstseglare** (v. 13 cookseglare)
- **roststjärtad skogsjuvel** (v. 13 jourdanskogsjuvel)
- **violhättad kolibri** (v. 13 goldmankolibri)
- **blågumpad smaragd** (v. 13 hoffmannsmaragd)
- **californiakolibri** (v. 13 xantuskolibri)
- **argentinatrut** (v. 13 olrogtrut)
- **azorstormssvala** (v. 13 monteirostormssvala)
- **nordöpetrell** (v. 13 gouldpetrell)
- **pitcairnpetrell** (v. 13 murphypetrell)
- **makaronesisk lira** (v. 13 barololira)
- **sundastork** (v. 13 Storms stork)
- **vitskuldrad ibis** (v. 13 davisonibis)
- **glasögonskarv** (v. 13 pallasskarv)
- **chilebeckasin** (v. 13 stricklandbeckasin)
- **andinsk örn** (v. 13 isidoreörn)
- **skalbaggshök** (v. 13 franceshök)
- **papuaduvhök** (v. 13 meyerduvhök)
- **trasthök** (v. 13 cooperhök)
- **goliatdvärguv** (v. 13 gurneydvärguv)
- **yungasskrikuv** (v. 13 höyskrikuv)

- **orangenäbbad trogon** (v. 13 massénatrogon)
- **rosentrogon** (v. 13 wardtrogon)
- **västlig strimtrögfågel** (v. 13 obamatrögfågel)
- **miombobiätare** (v. 13 böhmbiätare)
- **imeritukanett** (v. 13 natterertukanett)
- **praktjukanett** (v. 13 reinwardttukanett)
- **blånackad tukanett** (v. 13 derbytukanett)
- **kongohonungsvisare** (v. 13 zenkerhonungsvisare)
- **epifytspett** (v. 13 tullbergspett)
- **loretoskogsfalk** (v. 13 buckleyskogsfalk)
- **orangekindad papegoja** (v. 13 barrabandpapegoja)
- **mörknäbbad sparvpapegoja** (v. 13 Sclaters sparvpapegoja)
- **svavelvingad parakit** (v. 13 hoffmannparakit)
- **skifferhuvad parakit** (v. 13 weddellparakit)
- **lavendelparakit** (v. 13 derbyparakit)
- **större tigerpapegoja** (v. 13 Brehms tigerpapegoja)
- **brunhuvad tigerpapegoja** (v. 13 Madarász tigerpapegoja)
- **kivismyg** (v. 13 lyallklippsmyg)
- **räffelbent dvärgtyrann** (v. 13 Burmeisters dvärgtyrann)
- **tickdoradito** (v. 13 landbeckdoradito)
- **lektyrann** (v. 13 McConnells tyrann)
- **mustaschmyrsmyg** (v. 13 griscommysmyg)
- **grå myrsmyg** (v. 13 ménétriesmyrsmyg)
- **loretomyrsmyg** (v. 13 gentrymyrsmyg)
- **venezuelamyrfågel** (v. 13 klagesmyrfågel)
- **chocómyrfågel** (v. 13 zeledónmyrfågel)
- **strimryggig kanastero** (v. 13 wyattkanastero)
- **cyklophonungsfågel** (v. 13 mayrhonungsfågel)
- **svartkronad batis** (v. 13 erlangerbatis)
- **karstvireo** (v. 13 osburnvireo)
- **svartnäbbad bågnäbbsparadisfågel** (v. 13 d'Albertis bågnäbbsparadisfågel)
- **törellärka** (v. 13 barlowlärka)
- **ogadenlärka** (v. 13 gillett lärka)
- **vissellärka** (v. 13 friedmannlärka)
- **fynbossångare** (v. 13 victorinsångare)
- **mohélisångare** (v. 13 bensonsångare)
- **kongosvala** (v. 13 brazzasvala)
- **zambeziglasögonfågel** (v. 13 anderssonglasögonfågel)

- **svarttyglad glasögonfågel** (v. 13 goodfellowglasögonfågel)
- **beigebröstad timalia** (v. 13 tickelltimalia)
- **brunstreckad bandvinge** (v. 13 waldenbandvinge), samtidigt justeras streckbandvinge till **svartstreckad bandvinge**
- **gansufnittertrast** (v. 13 sukatsjovfnittertrast)
- **vitprickig fnittertrast** (v. 13 bietfnittertrast)
- **brunbabax** (v. 13 koslovbabax)
- **bantutrast** (v. 13 gurneytrast)
- **arundinariagärdsmyg** (v 13 zeledóngärdsmyg)
- **mindanaodjungelflugsnappare** (v. 13 Goodfellows djungelflugsnappare)
- **sichuannötväcka** (v. 13 prjevalskijnötväcka)
- **sāotomésolfågel** (v. 13 newtonsolfågel)
- **bamendavävare** (v. 13 bannermanvävare)
- **transflymunia** (v. 13 nevermannmunia)
- **regnbågsamadin** (v. 13 gouldamadin)
- **rödryggig droppastrild** (v. 13 dybowskidroppastrild)
- **svedjepiplärka** (v. 13 nicholsonpiplärka)
- **rosenstjärt** (v. 13 Przjevalskis rosenstjärt)
- **tibetrosenfink** (v. 13 roborovskijrosenfink)
- **stornäbbad siska** (v. 13 burtonsiska)
- **kongomyrpickare** (v. 13 jamesonmyrpickare)
- **tibetsparv** (v. 13 koslovsparv)
- **kaliforniensparv** (v. 13 bellsparv)
- **starrsparv** (v. 13 LeContes sparv)
- **madsparv** (v. 13 nelsonsparv)
- **gårdsparv** (v. 13 henslowsparv)
- **palmettosparv** (v. 13 bachmansparv)
- **orangekronad snårsparv** (v. 13 seebohmsnårsparv)
- **spetsnäbbad skogssångare** (v. 13 Swainsons skogssångare)
- **veracruztrupial** (v. 13 fuertestrupial)
- **californiagulhake** (v. 13 beldinggulhake)
- **pedregalgulhake** (v. 13 nelsongulhake)
- Strimmig trögfågel justeras till **östlig strimtrögfågel**.
- Skorstensseglare justeras till **skorstenseglare**.

Utdödalistan

Även listan med namn på arter som dött ut före år 1500 har uppdaterats.

- En ny rall har beskrivits från ön Rapa Iti i Franska Polynesien:
 - **raparall** (*Hypotaenidia astolfoi*)

- En ny vråk har beskrivits från Kuba och Hispaniola:
 - **vargvråk** (*Buteogallus irpus*)
- Woodwardörn stryks då inga fynd från Holocen föreligger.
- Azorisk dvärguv skrivs samman till **azordvärguv**.
- Maorikorp stryks som art (*Corvus antipodum*) då genetik och osteologi visat att den bättre betraktas som en underart till chathamkorp (*Corvus moriorum*). Den sammanslagna arten tar namnet **maorikorp**.
- Kubabobolink stryks då den visat sig vara en hybrid mellan bobolink och kubatrupal.
- Fyra arter med eponymer justeras till mer informativa namn:
 - **tranmoa** (tidigare Mantells moa)
 - **nyazeelandmanand** (v. 13 finschand)
 - **goliatkoua** (tidigare Berthas koua)
 - **större ibisstork** (tidigare Wetmores ibisstork)

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund och Tommy Tyrberg, Tk,
17 september 2022.

Namnlistan, version 13



En av nyheterna i IOC:s lista är att praktjuveltrasten delas upp i tre arter. På bilden en ornatjuveltrast från ön Lombok i Indonesien. Foto: Markus Lagerqvist.

Version 13 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 11.1 (januari 2021) och 11.2 (juli 2021). Liksom i IOC:s förra uppdatering görs ett antal ändringar på släktesnivå som inte påverkar de svenska namnen och därför inte redovisas här.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Mörkbent guan (*Penelope obscura*) delas upp i två arter:
 - mörkbent guan (*P. obscura*), som förekommer från sydöstra Brasilien söderut till nordöstra Argentina, och;
 - **yungasguan** (*P. bridgesi*) som förekommer på högre höjd i ett smalt bälte från centrala Bolivia till norra Argentina. Yungas är en växtzon och region vid den östra foten av Anderna, huvudsakligen i Bolivia.

- Vauxseglare (*Chaetura vauxi*) delas upp i två arter:
 - **småseglare** (*C. vauxi*), som förekommer längs Nordamerikas stillahavskust söderut till Panama, och;
 - **venezuelaseglare** (*C. andrei*), som är endemisk för östra Venezuela. Arten är bara känd från en handfull exemplar.

Gråbröstad sabelvinge (*Campylopterus largipennis*) delas upp i två arter:

- gråbröstad sabelvinge (*C. largipennis*) som är vida spridd i lågländerna på 100–800 meters höjd i de tropiska delarna av Sydamerika, och;
- **diamantinasabelvinge** (*C. diamantinensis*), som förekommer på 1 200–1 600 meters höjd i bergskedjan Serra Espinhaço, in delstaten Minas Gerais i sydöstra Brasilien.
- Fasansporrgök (*Centropus phasianinus*) delas upp i två arter:
 - fasansporrgök (*C. phasianinus*), som förekommer i norra Australien och på Nya Guinea, samt med en mycket distinkt underart i Östtimor, och;
 - **kaisporrgök** (*C. spilopterus*), som är endemisk för Kaiöarna i Moluckerna.
- Öturkduva (*Streptopelia bitorquata*) delas upp i två arter:
 - **sundaduva** (*S. bitorquata*), på Java och Små Sundaöarna, och;
 - **filippinduva** (*S. dusumieri*), som är vida spridd i Filippinerna.
- Turkduva (*Streptopelia decaocto*) delas upp i två arter:
 - turkduva (*S. decaocto*) som förekommer över stora delar av Europa, Nordafrika och Asien, och;
 - **burmaduva** (*S. xanthocykla*), som är endemisk för det torra slättlandet i centrala Burma.
- Taiwangrönduva (*Treron formosae*) delas upp i två arter:
 - taiwangrönduva (*T. formosae*) som förekommer i Taiwan, Lanyu, samt Batanes- och Babuyan-öarna i norra Filippinerna, och;
 - **ryukyugrönduva** (*T. permagnus*), som är endemisk för Ryukyuöarna.
- Tahitifruktduva (*Ptilinopus purpuratus*) delas upp i två arter:
 - tahitifruktduva (*P. purpuratus*) som förekommer på Tahiti och Moorea i östra Sällskapsöarna, och;
 - **raiateafruktduva** (*P. chrysogaster*), som finns på Maupiti, Bora Bora, Tahaa, Raiatea och Huahine i västra Sällskapsöarna.
- Gulbandad fruktduva (*Ptilinopus solomonensis*) delas upp i två arter:
 - gulbandad fruktduva (*P. solomonensis*) från Bismarck-arkipelagen och Salomonöarna, och;
 - **geelvinkfruktduva** (*P. speciosus*), som förekommer på öarna Numfor, Biak, Padaido och Marai i Cenderawasihbukten, mer känd under det gamla namnet Geelvinkbukten.
- Svartvårtig kejsarduva (*Ducula myristicivora*) delas upp i två arter:
 - svartvårtig kejsarduva (*D. myristicivora*) som förekommer på Widi och Raja Ampatöarna väster om Nya Guinea, och;

- **geelvinkkejsarduva** (*D. geelvinkiana*), som förekommer på öarna Numfor, Biak och Mios Num i Cenderawasihbukten.
- Bergkejsarduva (*Ducula badia*) delas upp i två arter:
 - bergkejsarduva (*D. badia*) som förekommer från Nepal österut till sydcentrala Kina och Vietnam vidare på Malackahalvön, Sumatra, Boreo och Java, samt;
- **ghatskejsarduva** (*D. cuprea*), endemisk för bergkedjan Västra Ghats i södra Indien.
- Brokspringhöna (*Turnix varius*) delas upp i två arter:
 - brokspringhöna (*T. varius*), från Australien, och;
 - **nyakaledonienspringhöna** (*T. novaecaledoniae*) som är endemisk för Nya Kaledonien, men numera tyvärr troligen är utdöd.
- Sydamerikansk beckasin (*Gallinago paraguaiae*) delas upp i två arter:
 - sydamerikansk beckasin (*G. paraguaiae*), som förekommer över stora delar av Sydamerika söderut till norra Argentina och Uruguay, och;
 - **magellanbeckasin** (*G. magellanica*), som förekommer i centrala Chile och centrala Argentina söderut till Eldslandet, samt på Falklandsöarna.
- Fiskmås (*Larus canus*) delas upp i två arter:
 - fiskmås (*L. canus*), som förekommer från västra Europa österut till nordöstra Sibirien och inkluderar underarterna *canus*, *heinei* och *kamtschatschensis* och;
 - **kortnäbbad mås** (*L. brachyrhynchus*), i nordvästra Nordamerika.
- Salomonuggla (*Ninox jacquinoti*) flyttas från släktet *Ninox* till *Athene* och delas upp i fyra arter:
 - salomonuggla (*Athene jacquinoti*), från Buka, Bougainville, Choiseul, Santa Isabel och några mindre öar i västra delen av Salomonöarna;
 - **guadalcanaluggla** (*A. granti*), endemisk för Guadalcanal;
 - **malaitauggla** (*A. malaitae*), endemisk för Malaita, samt;
 - **makirauggla** (*A. roseoaxillaris*), endemisk för Makira.
- Afrikansk dvärguv (*Otus senegalensis*) delas upp i två arter:
 - afrikansk dvärguv (*O. senegalensis*), vida spridd i tropiska Afrika och;
 - **annobóndvärguv** (*O. feae*), endemisk för ön Annobón i Guineabukten.
- Sulawesidvärguv (*Otus manadensis*) delas upp i två arter:
 - sulawesidvärguv (*O. manadensis*), som förekommer på Sulawesi och några mindre öar, samt;
 - **banggaidvärguv** (*O. mendeni*), endemisk för Banggaiöarna utanför Sulawesi.
- Fläckuv (*Bubo africanus*) delas upp i två arter:
 - fläckuv (*B. africanus*), som förekommer i södra Afrika från Uganda och söderut, och;
 - **arabuv** (*B. milesi*), som förekommer på Arabiska halvön i sydvästra Saudiarabien, Jemen och Oman.
- Blåkragad biätare (*Merops variegatus*) delas upp i två arter:
 - blåkragad biätare (*M. variegatus*), som förekommer i tropiska Afrika från Nigeria österut till Tanzania och söderut till Zambia och;
 - **etiopisk biätare** (*M. lafresnayii*), från Eritrea, Etiopien och Sydsudan.

- Grön dvärgbiätare (*Merops orientalis*) delas upp i tre arter:
 - **orientbiätare** (*M. orientalis*), som förekommer från Iran österut genom Indien till Vietnam;
 - **sahelbiätare** (*M. viridissimus*), som förekommer i ett bälte över Afrika från Senegal österut till Sudan, samt i Nildalen i Egypten, och;
 - **arabisk biätare** (*M. cyanophrys*), som förekommer i Israel, Palestina, Jordanien och på Arabiska halvön.
- d'Arnauds barbett (*Trachyphonus darnaudii*) delas upp i två arter:
 - **bomabarbett** (*T. darnaudii*), som förekommer i östra Afrika från Etiopien söderut till norra Tanzania. Arten påträffas ofta kring gamla massajbosättningar s.k. bomas eller manyattas;
 - **usambirobarbett** (*T. usambiro*), som förekommer mer begränsat i ett område från sydvästra Kenya till nordcentrala Tanzania. Namnet kommer av typlokalen i Tanzania.
- Gråspett (*Picus canus*) delas upp i två arter:
 - gråspett (*P. canus*), som förekommer i ett stort område från Frankrike i väster till Japan och Malackahalvön i öster och;
 - **sumatragröngöling** (*P. dedemi*), som endast förekommer sällsynt på 1 000–2 000 meters höjd i Sumatras högländer.
- Sotspett (*Mulleripicus funebris*) delas upp i två arter:
 - **sorgspett** (*M. funebris*), som är endemisk för Luzon och några mindre öar i norra Filippinerna, och;
 - **sotspett** (*M. fuliginosus*), på Samar, Leyte och Mindanao i östcentrala och södra Filippinerna.
- Mindre vasapapegoja (*Coracopsis nigra*) delas upp i två arter:
 - mindre vasapapegoja (*C. nigra*), i Madagaskar, och;
 - **komorvasapapegoja** (*C. sibilans*), som är endemisk för öarna Grand Comore och Anjouan i Komoreerna.
- Blåryggig papegoja (*Psittinus cyanurus*) delas upp i två arter:
 - **blågumpad papegoja** (*P. cyanurus*), som förekommer från södra Myanmar genom Malackahalvön till Sumatra och Borneo, samt;
 - **simeuluepapegoja** (*P. abbotti*), som är endemisk för öarna Simeulue och Siemat utanför Sumatras västkust.
- Papualorikit (*Charmosyna papou*), delas upp i två arter:
 - **vogelkoplorikit** (*C. papou*), som förekommer i Arfak- och Tamraubergen på Vogelkophalvön i Västpapua, och;
 - **paradislorikit** (*C. stellae*), som förekommer i bergsområden på Nya Guinea från Weylandbergen i öster till Owen Stanley-bergen i öster, samt på Huonhalvön.
- **Gulgrön lorikit** (*Trichoglossus flavoviridis*) flyttas till släktet *Saudareos* och delas upp i två arter:
 - **sulalorikit** (*S. flavoviridis*), som är endemisk för Sulaöarna utanför östra Sulawesi och;
 - **gulörad lorikit** (*S. meyeri*), på Sulawesi.

- **Praktjuveltrast** (*Pitta elegans*) delas upp i tre arter:
 - praktjuveltrast (*P. elegans*), med tre underarter, *elegans* i centrala Små Sundaöarna (Semau, Timor, Kisar), *maria* på Sumba och *virginalis* på de små öarna Tanahjampea, Kalao och Kalaotoa söder om Sulawesi;
 - **ornatjuveltrast** (*P. concinna*), i Små Sundaöarna på öarna Nusa Penida, Lombok, Sumbawa, Flores, Adonara, Lembata och Alor, samt;
 - **bandajuveltrast** (*P. vigorsii*), på ett antal mindre öar i Bandasjön (Banda, Kasiui, Kur, Tiur, Kai-öarna, Damar och Babar).
- **Fläckbröstad taggstjärt** (*Synallaxis stictothorax*) delas upp i två arter:
 - fläckbröstad taggstjärt (*S. stictothorax*), som förekommer från sydvästra Ecuador till nordvästra Peru (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad) och;
 - **chinchipetaggstjärt** (*S. chinchipensis*), som förekommer i avrinningsområdena för floderna Chinchipe och Marañón i Cajamarca i nordvästra Peru.
- **Rostvingad myrsmyg** (*Herpsilochmus rufimarginatus*) delas upp i två arter:
 - **rostkantad myrsmyg** (*H. rufimarginatus*), som förekommer från Panama söderut till sydcentrala Brasilien och;
 - **rostvingad myrsmyg** (*H. frater*), som förekommer i östra Brasilien från Paraíba söderut till östra Paraguay och nordöstra Argentina.
- **Rostmyrpitta** (*Grallaria rufula*) delas upp i hela åtta kryptiska arter som är mycket lika varandra till utseenden med skiljer sig i läten och genetik (därtill beskrivs sex nya arter i komplexet, se under "tolv nyligen beskrivna arter" nedan):
 - **taironamyrpitta** (*G. spatiator*), som är endemisk för Colombia där den finns i Sierra Nevada de Santa Marta in Magdalena, La Guajira, och Cesa. Namnet kommer av den förcolumbianska taironacivilisationen i området;
 - **perijámyrpitta** (*G. saltuensis*), som är endemisk för bergskedjan Serranía de Perijá i Zulia, Venezuela, och La Guajira och Cesar, Colombia;
 - **muiscamyrpitta** (*G. rufula*), som förekommer i östra Anderna från Tamámassivet i Táchira, Venezuela, och Norte de Santander, Colombia, söderut till Cundinamarca och västra Meta, Colombia, med undantag för de västra sluttningarna av Iguaquemassivet i Boyacá och sydvästligaste Santander, Colombia. Namnet kommer från muiscacivilisationen på höglandet och de östra sluttningarna av Anderna, vars kultur fortfarande påverkar samhället i de här delarna av Colombia;
 - **ekvatorialmyrpitta** (*G. saturata*), som förekommer i Iguaquemissivet på Östra Andernas västsluttningar i Boyacá och i sydvästligaste Santander, Colombia; i centrala Anderna från södra Antioquia till Tolima och i Cauca, Colombia; och i Anderna från Nariño och västra Putumayo, Colombia, söderut genom Ecuador till Piura och Cajamarca, Peru, norr om Marañónfloden och öster om Huancabambafloden. Namnet speglar utbredningen på bägge sidor om Ekvatorn;
 - **cajamarcamyrpitta** (*G. cajamarcae*), som är endemisk för Peru där den förekommer i Anderna i Piura, Cajamarca, och i Lambayeque väster om Huancabambafloden och kring övre Marañónflodens flöde;
 - **junínmyrpitta** (*G. obscura*), som är endemisk för Peru där den återfinns på Andernas östsluttningar i departementet Junín, söder om Perenéfloden and Paucartambofloden, norr om Mantarofloden, och väster om Enefloden;

- **urubambamyrpitta** (*Grallaria occabambae*), som är endemisk för Peru där den förekommer i Cordillera Vilcabamba i allra östligaste Junín och Cusco öster om Enefloden och Apurímacfloden och mellan Tambofloden i norr till Marcapatafloden i söder. Namnet kommer från provinsen Urubamba där arten samlats in, samt;
- **boliviamyrpitta** (*Grallaria cochabambae*), som är endemisk för Bolivia där den förekommer i östra La Paz och Cochabamba.
- **Páramotapakul** (*Scytalopus opacus*) delas upp i två arter:
 - páramotapakul (*S. opacus*), som förekommer i centrala Anderna i Colombia (Caldas) söderut till sydcentrala Ecuador och;
 - **lojatapakul** (*S. androstictus*), som återfinns i bergsområdena som separerar provinserna Loja och Zamora-Chinche i södra Ecuador, samt i departementen Piura och Cajamarca i norra Peru.
- **Svartgrå tapakul** (*Scytalopus latrans*) delas upp i två arter:
 - svartgrå tapakul (*S. latrans*), som förekommer i Anderna, från västra Venezuela söderut till norra Peru (norr om Marañónfloden);
 - **utcubambatapakul** (*S. intermedius*), som förekommer i Utcubambaflodens avrinningsområde i södra Amazonas i Peru (söder om Marañónfloden).
- **Brun myzomela** (*Myzomela obscura*) delas upp i fyra arter:
 - brun myzomela (*M. obscura*), som förekommer på Nya Guinea, i norra Australien, Aruöarna och öarna i Torres sund;
 - **halmaheramyzomela** (*M. simplex*), på Halmahera och de mindre öarna Ternate, Tidore, Kasiruta, Bacan, Damar och Morotai;
 - **rödryggig myzomela** (*M. rubroincta*), på öarna Obi och Bisa i norra Moluckerna, och;
 - **biakmyzomela** (*M. rubrobrunnea*), endemisk för ön Biak i Cenderawasihbukten, Västpapua.
- **Röd myzomela** (*Myzomela cruentata*) delas upp i två arter:
 - röd myzomela (*M. cruentata*), som förekommer på Nya Guinea, Yapen, New Britain och Duke of York-öarna och;
 - **karminmyzomela** (*M. erythrina*), på New Ireland, New Hanover, Tabar och Djaul i Bismarckarkipelagen.
- **Rödhalsad myzomela** (*Myzomela rosenbergii*) delas upp i två arter:
 - rödhalsad myzomela (*M. rosenbergii*), på Nya Guinea och;
 - **goodenoughmyzomela** (*M. longirostris*), som endast förekommer på ön Goodenough i D'Entrecasteaux-öarna.
- **Solfjädersångsmyg** (*Gerygone flavolateralis*) delas upp i två arter:
 - solfjädersångsmyg (*G. flavolateralis*), som återfinns på Banks Island i Vanuatu, på Nya Kaledonien och Loyautéöarna, samt;
 - **rennellsångsmyg** (*G. citrina*), endemisk för ön Rennell i Salomonöarna.
- **Prickig bärpickare** (*Rhamphocharris crassirostris*) delas upp i två arter:
 - **tjocknäbbad bärpickare** (*R. crassirostris*), från bergsområden på västra Nya Guinea (Vogelkop, Snow Mountains, Border Ranges);

- **prickig bärpickare** (*R. piperata*), från bergsområden på östra Nya Guinea (Central Ranges, Huon).
- Tofsbärfågel (*Paramythia olivacea*) delas upp i två arter:
 - **västlig tofsbärfågel** (*P. olivacea*), från Snow Mountains på västra Nya Guinea och;
 - **östlig tofsbärfågel** (*P. montium*), från bergsområden på östra Nya Guinea (Central Ranges, Huon).
- Alexanderbatis (*Batis poensis*) delas upp i två arter:
 - **biokobatis** (*B. poensis*), endemisk för ön Bioko i Guineabukten och;
 - **västafrikansk batis** (*B. occulta*), som förekommer i regnskogsbältet från östra Sierra österut till, sydvästra Centralafrikanska republiken, Gabon och norra Kongo-Brazzaville.
- Papuadrillfågel (*Lalage atrovirens*) delas upp i två arter:
 - papuadrillfågel (*L. atrovirens*), som förekommer på Nya Guinea och Raja Ampatöarna, samt;
 - **biakdrillfågel** (*L. leucoptera*), endemisk för ön Biak i Cenderawasihbukten, Västpapua.
- Kinesisk varfågel (*Lanius sphenocercus*) delas upp i två arter:
 - kinesisk varfågel (*L. sphenocercus*), som förekommer i östra Mongoliet österut till sydöstra Ryssland, nordöstra och nordcentrala Kina och Koreanska halvön och;
 - **jättevarfågel** (*L. giganteus*), som förekommer i centrala och östra Qinghai, sydvästra Gansu, östra Xizang, och norra och västra Sichuan i centrala Kina.
- Timorgylling (*Oriolus melanotis*) delas upp i två arter:
 - timorgylling (*O. melanotis*), på Timor, Roti och Semau, och;
 - **wetargylling** (*O. finschi*), på Wetar och Atauro.
- Gråbröstad solfjäderstjärt (*Rhipidura rufiventris*) delas upp i två arter:
 - gråbröstad solfjäderstjärt (*R. rufiventris*), som är vida spridd från östra Indonesien österut till Nya Guinea och Bismarckarkipelagen, samt i norra Australien och;
 - **biaksolfjäderstjärt** (*R. kordensis*), endemisk för ön Biak i Cenderawasihbukten, Västpapua.
- Sydöstasiatisk paradismonark (*Terpsiphone affinis*) delas upp i två arter:
 - **orientparadismonark** (*T. affinis*), som finns på det asiatiska fastlandet från Nepal österut till Vietnam, Malackahalvön och Sumatra, Java och Borneo, samt;
 - **tenggaraparadismonark** (*T. floris*), på Små Sundaöarna.
- Vithalsad monark (*Carterornis pileatus*) delas upp i två arter:
 - vithalsad monark (*C. pileatus*), på Buru och Halmahera i Moluckerna, samt;
 - **tanimbarmonark** (*C. castus*), endemisk för Tanimbaröarna.
- Sammetsmonark (*Myiagra hebetior*) delas upp i tre arter:
 - **svarthuvad sammetsmonark** (*M. hebetior*), på ön Mussau i norra Bismarckarkipelagen;

- **sothuvad sammetsmonark** (*M. eichhorni*), på New Hanover, New Ireland och New Britain i Bismarckarkipelagen och;
- **gråhuvad sammetsmonark** (*M. cervinicolor*), endemisk för ön Djaul, utanför New Ireland. Namnen refererar till honornas dräkt som skiljer tydligt mellan arterna, medan hanarna har en helsvart dräkt.
- Svartskata (*Platysmurus leucopterus*) delas upp i två arter:
 - **malackasvartskata** (*P. leucopterus*), på Malackahalvön, Sumatra, Bangka och Belitung, och;
 - **borneosvartskata** (*P. aterrimus*), på Borneo.
- Sundakråka (*Corvus enca*) delas upp i tre arter:
 - sundakråka (*C. enca*), på Malackahalvön, Borneo, Java, Bali, Sulawesi, Sulaöarna och ett antal mindre öar i regionen;
 - **småkråka** (*C. samarensis*), på Luzon, Samar och Mindanao i Filippinerna, samt;
 - **palawankråka** (*C. pusillus*), på Palawan och Mindoro i Filippinerna.
- Paradiskråka (*Lycocorax pyrrhopterus*) delas upp i två arter:
 - **halmaheraparadiskråka** (*L. pyrrhopterus*), på Halmahera och de mindre öarna Morotai, Rau, Kasiruta och Bacan, och;
 - **obiparadiskråka** (*L. obiensis*), på Obi och Bisa.
- Asksydhake (*Heteromyias albispecularis*) delas upp i två arter:
 - asksydhake (*H. albispecularis*), på Vogelkophalvön i Västpapua, samt eventuellt i Fojabergen, och;
 - **svartkronad sydhake** (*H. cinereifrons*), från bergsområden på övriga Nya Guinea.
- Streckig ökenlärka (*Eremalauda dunni*) delas upp i två arter:
 - **saharalärka** (*E. dunni*), i södra Sahara från Västsahara österut till centrala Sudan, och;
 - **arablärka** (*E. eremodites*), som är nomadisk i Jordanien (Azraq), norra och centrala Saudiarabien, Kuwait, södra Jemen och sydvästra Oman. Har även häckat på Sinaihalvön, södra Israel och i Syrien.
- Dvärglärka (*Aldatala rufescens*) delas upp i två arter:
 - **medelhavsdvärglärka** (*A. rufescens*), med underarterna *apetzii* (Iberiska halvön), *polatzeki* (östra Kanarieöarna), *rufescens* (Teneriffa, utdöd) och *minor* (Marocko till nordvästra Egypten, södra Turkiet till Sinaihalvön och östra Irak), samt;
 - **turkestandvärglärka** (*A. heinei*), med underarterna *heinei* (Ukraina till östra Kazakstan), *beicki* (södra Mongoliet och nordcentrala Kina), *pseudobaetica* (östra Turkiet, Transkaukasien och norra Iran) och *aharonii* (centrala Turkiet).
- Sundabulbyl (*Ixos virescens*) delas upp i två arter:
 - **javabulbyl** (*I. virescens*), endemisk för Java, och;
 - **sumatrabulbyl** (*I. sumatranus*), endemisk för Sumatra.
- Everetbulbyl (*Hypsipetes everetti*) delas upp i två arter:

- **mindanaobulbyl** (*H. everetti*), på Mindanao, Samar, Leyte, Suluöarna och några mindre öar, samt;
- **camiguinbulbyl** (*H. catarmanensis*), på Camiguin Sur.
- Hussvala (*Delichon urbicum*) delas upp i två arter:
 - hussvala (*D. urbicum*), med underarterna *urbicum* (västra, centrala och norra Europa till västra Sibirien) och *meridionale* (södra Europa, norra Afrika till västra Mongoliet, Tianshan och Kashmir), samt;
 - **sibirisk hussvala** (*D. lagopodum*), monotypisk i Asien från mellersta och övre Jenisej, Altajbergen och Mongoliet, öster ut till Anadyr, Ochotska havet och nordöstra Kina.
- Sulawesisångare (*Phylloscopus sarasinorum*) delas upp i två arter:
 - **lompobattangsångare** (*P. sarasinorum*), i Lompobatangbergen på södra Sulawesi, och;
 - **sulawesisångare** (*P. neosphilus*), på norra, centrala och sydöstra Sulawesi.
- Streckig prinia (*Prinia gracilis*) delas upp i två arter:
 - **nilprinia** (*P. gracilis*), som förekommer i norra Egypten och nordöstra Afrika till södra Syrien och norra Saudiarabien, och;
 - **dvärgprinia** (*P. lepida*), som förekommer i södra Turkiet och norra Syrien österut till Sydöstasien, samt i Förenade Arabemiraten och norra Oman.
- Gulbröstad apalis (*Apalis flavida*) delas upp i två arter:
 - gulbröstad apalis (*A. flavida*), som är vida spridd över stora delar av tropiska Afrika från Senegal i väster, till sydvästra Etiopien i öster och söderut till sydöstra Sydafrika, samt;
 - **brunstjärtad apalis** (*A. flavocincta*), som förekommer i nordvästra Somalia och angränsande Etiopien, sydöstra Sydsudan, södra Etiopien, nordöstra Uganda, nordöstra och östra Kenya samt södra Somalia.
- Kastanjevingad timalia (*Cyanoderma erythropterum*) delas upp i två arter:
 - kastanjevingad timalia (*C. erythropterum*), som förekommer på Malackahalvön, Sumatra och några mindre öar, samt;
 - **tvåfärgad timalia** (*C. bicolor*), på norra Borneo och Banggiöarna.
- Kastanjeryggig sabeltimalia (*Pomatorhinus montanus*) delas upp i två arter:
 - **javasabeltimalia** (*P. montanus*), endemisk för Java och Bali, samt;
 - **sundasabeltimalia** (*P. bornensis*), på Malackahalvön, Sumatra, Bangka och Borneo.
- Svartkronad timalia (*Pellorneum capistratum*) delas upp i tre arter:
 - svartkronad timalia (*P. capistratum*), på Java;
 - **gråbrynad timalia** (*P. nigrocapitatum*), på Malackahalvön, Sumatra och Bangka, och;
 - **vitbrynad timalia** (*P. capistratoides*), på Borneo och Banggiöarna.
- Gråbröstad lövtimalia (*Illadopsis rufipennis*) delas upp i två arter:
 - **beigebröstad lövtimalia** (*I. rufipennis*), som förekommer från Sierra Leone österut till Ghana, och Nigeria österut till södra Centralafrikanska republiken,

Kongo-Brazzaville, Cabina, nordöstra Kongo-Kinshasa, södra Uganda, nordvästra Tanzania, västra och sydvästra Kenya, samt Bioko, och;

- **tanzanialövtimalia** (*I. distans*), som är endemisk för östra Tanzania.
- Klippsmygtimalia (*Gypsophila crispifrons*) delas upp i tre arter:
 - **variabel karsttimalia** (*G. crispifrons*), som förekommer i norra Tenasserim, genom sydöstra Myanmar till nordvästra och västra Thailand;
 - **grå karsttimalia** (*G. annamensis*), som förekommer i södra Yunnan, norra Laos och norra Vietnam, och;
 - **rödbrun karsttimalia** (*G. calcicola*), i centrala Thailand, nordöst om Bangkok.
- Svartkronad glasögonfågel (*Sterrhoptilus nigrocapitatus*) delas upp i två arter:
 - **visayaglasögonfågel** (*S. nigrocapitatus*), på Samar, Layte och Bohol i Visayaöarna, och;
 - **calabarzonglasögonfågel** (*S. affinis*), på södra Luzon, huvudsakligen i provinsen Calabarzon.
- Svavelstrupig glasögonfågel (*Zosterops minor*) delas upp i två arter:
 - **grönpannad glasögonfågel** (*Z. minor*), som förekommer på norra och västcentrala Nya Guinea (Weylandbergen) och Yapen Island, och;
 - **svavelstrupig glasögonfågel** (*Z. chrysolaemus*), som förekommer på nordvästra, centrala, östcentrala, nordöstra och sydöstra Nya Guinea, samt på öar i D'Entrecasteaux-arkipelagen.
- Svarthuvad glasögonfågel (*Zosterops fuscicapilla*) delas upp i två arter:
 - svarthuvad glasögonfågel (*Z. fuscicapilla*), som förekommer i västra och centrala Nya Guinea, och;
 - **oyatabuglasögonfågel** (*Z. crookshanki*), på öarna Goodenough and Fergusson i D'Entrecasteaux-arkipelagen. Namnet kommer från typlokalen, berget Oya Tabu på Fergusson.
- Gråstrupig glasögonfågel (*Zosterops rendovae*) delas upp i tre arter:
 - **makiraglasögonfågel** (*Z. rendovae*), endemisk för ön Makira i Salomonöarna;
 - **bougainvilleglasögonfågel** (*Z. hamlini*), endemisk för ön Bougainville i Salomonöarna och;
 - **guadalcanalglasögonfågel** (*Z. oblitus*), endemisk för ön Guadalcanal i Salomonöarna.
- Blygrå myggsnappare (*Polioptila plumbea*) delas upp i två arter:
 - blygrå myggsnappare (*P. plumbea*), som förekommer från centrala och östra Colombia till Peru and nordöstra Brasilien och;
 - **vitbrynad myggsnappare** (*P. bilineata*), från södra Mexiko söderut till västra Colombia.
- Brunhuvad nötväcka (*Sitta pusilla*) delas upp i två arter:
 - brunhuvad nötväcka (*S. pusilla*), i sydöstra USA, och;
 - **bahamanötväcka** (*S. insularis*), endemisk för Grand Bahama Island, en akut utrotningshotad art om den inte redan är utgången.
- Svartvit stare (*Gracupica contra*) delas upp i tre arter:

- svartvit stare (*G. contra*), från östra Pakistan, genom södra Nepal och norra och centrala Indien österut till sydvästra Kina;
- **thaistare** (*G. floweri*), i södra och östra Burma och södra Kina till Thailand, Laos och Kambodja, samt;
- **jallastare** (*G. jalla*), på Java and Bali. Namnet kommer troligen från ett lokalt namn på arten på Java.
- Gråkindad rabdornis (*Rhabdornis inornatus*) delas upp i två arter och släktet ges, tillsammans med ytterligare två arter i släktet, det mer svenskklingande namnet **krypstarar** som speglar detta unika starsläkte:
 - mindanaokrypstare (*R. inornatus*), på Mindanao, Samar, Bilaran och Leyte, och;
 - **visayakrypstare** (*R. rabori*), på Panay och Negros.
- Ötrast (*Turdus poliocephalus*) delas upp i två arter:
 - ötrast (*T. poliocephalus*), som förekommer med 49 underarter från den indonesiska övärlden österut till Samoa, och;
 - **taiwantrast** (*T. niveiceps*), endemisk för Taiwan.
- Vitbrynad shama (*Copsychus luzoniensis*) delas upp i två arter:
 - luzonshama (*C. luzoniensis*), på Luzon och några mindre öar och;
 - **visayashama** (*C. superciliaris*), på Ticao, Masbate, Negros och Panay i västcentrala Visayaöarna.
- Javaflugsnappare (*Cyornis banyumas*) delas upp i två arter:
 - javaflugsnappare (*C. banyumas*), på Java och;
 - **dajakflugsnappare** (*C. montanus*), på Borneo. Namnet kommer från dajakfolket – ursprungsbefolkningen på ön.
- Floresflugsnappare (*Cyornis oscillans*) delas upp i två arter:
 - floresflugsnappare (*C. oscillans*), endemisk för Sumbawa och Flores i Små Sundaöarna, och;
 - **sandelflugsnappare** (*C. stresemanni*), endemisk för Sumba i Små Sundaöarna. Ön kallades tidigare Sandelwood Island.
- Roststjärtad flugsnappare (*Cyornis ruficauda*) delas upp i tre arter:
 - roststjärtad flugsnappare (*C. ruficauda*), som förekommer på Samar, Leyte, Mindanao och Basilan i Filippinerna;
 - **suluflugsnappare** (*C. ocularis*), endemisk för Suluöarna och;
 - **crockerflugsnappare** (*C. ruficrissa*), som förekommer i bergsområden, inklusive Crockerbergen, på norra Borneo.
- Kinesisk niltava (*Niltava vivida*) delas upp i två arter:
 - **taiwanniltava** (*N. vivida*), endemisk för Taiwan, och;
 - **kinesisk niltava** (*N. oatesi*), som förekommer i södra Kina, från sydöstra Tibet österut till Sichuan och Yunnan.
- Bocageakalat (*Sheppardia bocagei*) delas upp i två arter:
 - **gråkronad akalat** (*S. bocagei*), som förekommer i sydöstra Kongo-Kinshasa och västra Tanzania till västra Angola och norra Zambia och;

- **kortstjärtad akalat** (*S. poensis*), som förekommer från sydöstra Nigeria och Bioko till östra Kongo-Kinshasa och västra Tanzania.
- Ryukyunäktergal (*Larvivora komadori*), delas upp i två arter:
 - ryukyunäktergal (*L. komadori*), som förekommer på norra Ryukyuöarna, samt;
 - **okinawanäktergal** (*L. namiyei*), som är endemisk för Okinawa i Ryukyuöarna.
- Sundanäktergal (*Myiomela diana*) delas upp i två arter:
 - **javanäktergal** (*M. diana*), endemisk för Java, och;
 - **sumatranäktergal** (*M. sumatrana*), endemisk för Borneo.
- Gulbrynad narcissflugsnappare (*Ficedula narcissina*) delas upp i två arter:
 - **narcissflugsnappare** (*F. narcissina*), på Sachalin, Kurilerna och i större delen av Japan och;
 - **ryukyuflugsnappare** (*F. owstoni*), på Ryukyuöarna.
- Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*) delas upp i två arter:
 - stenskvätta (*O. oenanthe*), som är den vida spridda arten i Palearktis och;
 - **atlasstenskvätta** (*O. seebohmi*), i Atlasbergen i Nordvästafrika.
- Sorgstenskvätta (*Oenanthe lugens*) delas upp i tre arter:
 - sorgstenskvätta (*O. lugens*), som förekommer från östra Egypten, genom Arabiska halvön österut till Iran;
 - **maghrestenskvätta** (*O. halophila*), i Nordafrika, från Marocko till västra Egypten, och;
 - **basaltstenskvätta** (*O. warriae*), i nordöstra Jordanien och södra Syrien.
- Filippinblåfågel (*Irena cyanogastra*) delas upp i två arter:
 - filippinblåfågel (*I. cyanogastra*), över större delen av Filippinerna och;
 - **palawanblåfågel** (*I. tweeddalii*), endemisk för Palawan och några mindre närliggande öar i västra Filippinerna.
- Blåvingad bladfågel (*Chloropsis cochinchinensis*) delas upp i två arter:
 - **javabladfågel** (*C. cochinchinensis*), endemisk för Java, och;
 - **blåvingad bladfågel** (*C. moluccensis*), som förekommer över stora delar av Sydostasien från Bangladesh i väster till Borneo i öster.
- Orangebukig bladfågel (*Chloropsis hardwickii*) delas upp i två arter:
 - orangebukig bladfågel (*C. hardwickii*), som förekommer från Himalaya till norra Laos och på Malackahalvön, samt;
 - **gråkronad bladfågel** (*C. lazulina*), i norra och centrala Vietnam och sydöstra Kina.
- Orangekronad blomsterpickare (*Dicaeum anthonyi*) delas upp i två arter:
 - **gulkronad blomsterpickare** (*D. anthonyi*), endemisk för bergsområden på Luzon i Filippinerna och;
 - **brandkronad blomsterpickare** (*D. kampalili*), endemisk för bergsområden på Mindanao i Filippinerna.
- Grön solfågel (*Anthreptes rectirostris*) delas upp i två arter:

- **gulhakad solfågel** (*A. rectirostris*), som förekommer från Sierra Leone till Ghana och;
- **gråhakad solfågel** (*A. tephrolaemus*), som förekommer från södra Nigeria österut till västra Kenya och nordvästra Tanzania, söderut till nordvästra Angola, samt på Bioko.
- Gråhuvad domherre (*Pyrrhula erythaca*) delas upp i två arter:
 - gråhuvad domherre (*P. erythaca*), som förekommer från östra Himalaya till centrala Kina, och;
 - **taiwandomherre** (*P. leucogenis*), endemisk för Taiwan.
- Orientgrönfink (*Chloris sinica*) delas upp i två arter:
 - orientgrönfink (*C. sinica*), som förekommer i östra Asien från Kamtjatkahalvön söderut till Vietnam, och;
 - **boningrönfink** (*C. kittlitzi*), endemisk för öarna Hahajima and Minamiiwoto i Boninöarna, sydöst om Japan.
- Reichardsiska (*Crithagra reichardi*) delas upp i två arter:
 - **miombosiska** (*C. reichardi*), som förekommer i framför allt miomboskog från södra Kongo-Kinshasa till centrala Tanzania och norra Moçambique, och;
 - **högländssiska** (*C. striatipectus*), i höglänt terräng i södra Sudan, södra Etiopien och norra Kenya.
- Bergsiska (*Chrysocorythus estherae*) delas upp i två arter:
 - bergsiska (*C. estherae*), i bergsområden på 1 300–3 500 meters höjd på Sulawesi, Sumatra och Java, samt;
 - **mindanaosiska** (*C. mindanensis*), som återfinns på bergen Kitanglad och Apo på Mindanao, Filippinerna.
- Buskeufonia (*Euphonia affinis*) delas upp i två arter:
 - buskeufonia (*E. affinis*), som förekommer i östra Mexiko söderut till Costa Rica, och;
 - **västmexikansk eufonia** (*E. godmani*), endemisk för västra Mexiko.
- Kastanjestrimmig sparv (*Rhynchospora strigiceps*) delas upp i två arter:
 - **chacosparv** (*R. strigiceps*), som förekommer i slättlandsområdet Gran Chaco från sydcentrala Paraguay till nordcentrala Argentina och;
 - **yungassparv** (*R. dabbenei*), från sydöstra Bolivia till nordvästra Argentina. Yungas är ett smalt bälte på östsidan av Anderna i sydöstra Bolivia till nordvästra Argentina, som kännetecknas av subtropiskt högländsklimat och städsegrön skog.
- Saffransnäbbad sparv (*Arremon flavirostris*) delas upp i två arter:
 - saffransnäbbad sparv (*A. flavirostris*), som förekommer i centrala och östra Brasilien, samt från östra Bolivia till sydcentrala Brasilien, Paraguay och nordöstra Argentina, och;
 - **mossparv** (*A. dorbignii*), som förekommer från centrala Bolivia till nordvästra Argentina. Namnet kommer av den mossgröna färgen.
- Rostkronad skogssångare (*Basileuterus rufifrons*) delas upp i två arter:
 - rostkronad skogssångare (*B. rufifrons*), som förekommer från Mexiko till centrala Guatemala, och;

- **kastanjekronad skogssångare** (*B. delatirii*), från södra Guatemala till norra Colombia och västra Venezuela.
- Grå saltator (*Saltator coerulescens*) delas upp i tre arter:
 - **kanelbukig saltator** (*S. grandis*), som förekommer från Mexiko söderut till Costa Rica;
 - **olivgrå saltator** (*S. olivascens*), från norra Colombia till Trinidad och norra Brasilien.
 - **blågrå saltator** (*S. coerulescens*), som är vida spridd i Sydamerika söder om ovanstående arters utbredning, söderut till Uruguay och norra Argentina.
- Oxtangara (*Melopyrrha portoricensis*) delas upp i två arter:
 - oxtangara (*M. portoricensis*), endemism för Puerto Rico, och;
 - **saintkittstangara** (*M. grandis*), på Saint Kitts. Arten är numera utdöd.

Tolv nyligen beskrivna arter tillkommer:

- **Chamímyrpitta** (*G. alvarezi*), som förekommer i västra Anderna i Colombia från Paramillo, nordvästra Antioquia, söderut till nordvästra Cauca. Namnet kommer från Embará-Chamí-folken som bor i området, chamí betyder 'berg' på embaráspråket.
- **Chachapoyamyrpitta** (*G. gravesi*), som är endemisk för Peru där den förekommer på Andernas östsluttningar i Amazonas och San Martín söder och öster om Marañónfloden, söderut till Huánuco norr om Huallagafloden. Namnet kommer från chachapoyacivilisationen som fanns i området innan inkariket.
- **Panaomyrpitta** (*G. oneilli*), som förekommer på Andernas östsluttningar i Huánuco och Pasco, Peru, söderut till Huallagafloden och norr om Perenéfloden. Namnet kommer från typlokalen Panao.
- **Oxapampamyrpitta** (*G. centralis*), som är endemisk för Peru på Andernas östsluttningar från Huánuco söder om Huallagafloden genom Pasco till Junín väster om Enefloden och norr om Mantarofloden. Namnet kommer från provinsen Oxapampa i Pasco där arten först hittades.
- **Ayacuchomyrpitta** (*Grallaria ayacuchensis*), som är endemisk för Peru på Andernas östsluttningar i departementet Ayacucho väster om Apurímacfloden mellan Mantaro- och Pampasfloderna.
- **Punomyrpitta** (*Grallaria sinaensis*), som förekommer i departementet Puno, Peru, och i västligaste La Paz, Bolivia.
- **Vitvingetapakul** (*Scytalopus krabbei*), som förekommer i norra Amazonas i norra Peru.
- **Ampaytapakul** (*Scytalopus whitneyi*), som förekommer i Ayacucho and Apurímac i södra Peru. Namnet kommer från typlokalen för arten.
- **Jalkatapakul** (*Scytalopus frankeae*), som förekommer i centrala Peru (Huánuco till Junín). Namnet refererar till artens typiska habitat – jalka – halvfuktig fjällhed ovan trädgränsen, och som domineras av småbuskar och ett fjädergräs (*Stipa ichu*), snarligt habitatet páramo längre norrut.
- **Kumawabärpickare** (*Melanocharis citreola*), som endast är känd från Kumawabergen i Västpapua.

- **Kilomberocistikola** (*Cisticola bakerorum*), som är endemisk för Kilombero-flodslätten i centrala Tanzania.
- **Vitstjärtad cistikola** (*Cisticola anderseni*), även den endemisk för Kilombero-flodslätten i centrala Tanzania.

Fem arter stryks från listan:

- **Tarimnattskärre** (*Caprimulgus centralasicus*) synonymiseras med underarten *plumipes* av nattskärre (*Caprimulgus europaeus*).
- **Amazonseglare** (*Chaetura viridipennis*) slås samman med chapmanseglare (*C. chapmani*), den sammanslagna arten får namnet **amazonseglare** (*C. chapmani*).
- **Nordlig tofskarakara** (*Caracara cheriway*) slås samman med sydlig tofskarakara (*C. plancus*), den sammanslagna arten får namnet **tofskarakara** (*C. plancus*).
- **Layardträdklättrare** (*Lepidocolaptes layardi*) slås samman med rondônia-trädklättrare (*L. fuscicapillus*), den sammanslagna arten får namnet **brunhättad trädklättrare** (*L. fuscicapillus*).
- **Kokonorsångare** (*Phylloscopus occisinensis*) slås samman med alpsångare (*P. affinis*), den sammanslagna arten behåller namnet alpsångare (*P. affinis*).

Justeringar pga. högre systematiska förändringar

- Genetiska studier av hönsfåglarna har visat att frankolinerna i släktet *Pternistis* inte står nära de egentliga frankolinerna varför namnet frankolin begränsas till släktena *Francolinus*, *Ortygornis*, *Campocolinus* och *Scleroptila*. Namnen på samtliga arter i släktet *Pternistis* justeras därför till **sporrhöna** (eng. spurfowl). I samband med detta byter till de tre arterna i släktet *Galloperdix* namnändelse från sporrhöna till **dvärgfasan**. De nya namnen är:
 - **kopjesporrhöna** (v. 12, hartlaubfrankolin)
 - **kamerunsporrhöna** (v. 12, kamerunfrankolin)
 - **rostbukig sporrhöna** (v. 12, rostbukig frankolin)
 - **rostkindad sporrhöna** (v. 12, rostkindad frankolin)
 - **svartpannad sporrhöna** (v. 12, svartpannad frankolin)
 - **rostkronad sporrhöna** (v. 12, erckelfrankolin)
 - **djiboutisporrhöna** (v. 12, djiboutifrankolin)
 - **angolasporrhöna** (v. 12, sweistrafrankolin)
 - **ahantasporrhöna** (v. 12, ahantafrankolin)
 - **gråstrimmig sporrhöna** (v. 12, gråstrimmig frankolin)
 - **kikuyusporrhöna** (v. 12, jacksonfrankolin)
 - **rödnäbbad sporrhöna** (v. 12, rödnäbbad frankolin)
 - **kapsporrhöna** (v. 12, kapfrankolin)
 - **natalsporrhöna** (v. 12, natalfrankolin)
 - **bergsporrhöna** (v. 12, hildebrandtfrankolin)
 - **marockansk sporrhöna** (v. 12, marockansk frankolin)
 - **fjällig sporrhöna** (v. 12, fjällig frankolin)
 - **gulnäbbad sporrhöna** (v. 12, gulnäbbad frankolin)
 - **sahelsporrhöna** (v. 12, clappertonfrankolin)
 - **etiopisk sporrhöna** (v. 12, harwoodfrankolin)

- **svartbent sporrhöna** (v. 12, svartbent frankolin)
- **gulstrupig sporrhöna** (v. 12, gulstrupig frankolin)
- **victoriasporrhöna** (v. 12, victoriafrankolin)
- **rödstrupig sporrhöna** (v. 12, rödstrupig frankolin)
- **röd dvärgfasan** (v. 12, röd sporrhöna)
- **brokdvärgfasan** (v. 12, broksporrhöna)
- **ceylondvärgfasan** (v. 12, ceylonsporrhöna)
- Ordningen nattskärrefåglar (Caprimulgiformes) delas upp i sex ordningar:
 - **Nattskärrefåglar** (Caprimulgiformes)
 - **Oljefåglar** (Steatornithiformes)
 - **Potofåglar** (Nyctibiiformes)
 - **Grodmunfåglar** (Podargiformes)
 - **Uggleskärrefåglar** (Aegotheliformes)
 - **Seglar- och kolibrifåglar** (Apodiformes)
- Genetiska studier visar att rafflesmalkoha (*Rhinortha chlorophaea*) är en basal art inom Cuculinae och får därför namnet **rostgök**.
- Kraglori flyttas från lori-släktet *Phygis* till lorikterna i släktet *Vini*, varför namnet justeras till **kraglorikit** (*Vini solitaria*).
- Genetiska studier har visat att dvärgtyrannerna i släktena *Phylloscartes* och *Leptopogon* inte står nära de egentliga dvärgtyrannerna i exempelvis släktet *Zimmerius*.
 - Samtliga namn i *Phylloscartes* justeras från dvärgtyrann till **lövtyrann**. Olivdvärgtyrann justeras till **olivgrön lövtyrann**, oustaletdvärgtyrann till **långstjärtad lövtyrann** och gulgrön dvärgtyrann till **panamalövtyrann**.
 - Tre arter i släktet *Leptopogon* justeras från dvärgtyrann till **tyrann**. Brunbröstad dvärgtyrann får namnet **rostbröstad tyrann**.
- Genetiska studier har visat att *Heteroxolmis* inte är en del av *Xolmiini* utan syster till *Alectrurus* i tribus Fluvicolini, varför svartvit monjita (*Heteroxolmis dominicana*) får namnet **dominikanertyrann**. Resultaten visar även att kastanjegumpad tyrann (*Neoxolmis rufiventris*) är systerart till rostryggig monjita och att monjitorna inte är en monofyletisk grupp – namnet på samtliga justeras därför till busktyrann:
 - **vitgumpad busktyrann** (v. 12, vitgumpad monjita)
 - **vit busktyrann** (v. 12, vit monjita)
 - **eldögd busktyrann** (v. 12, eldögd monjita)
 - **grå busktyrann** (v. 12, grå monjita)
 - **svartkronad busktyrann** (v. 12, svartkronad monjita)
 - **rostryggig busktyrann** (v. 12, rostryggig monjita)
 - **salinasbusktyrann** (v. 12, salinasmonjita)
 - **kastanjegumpad busktyrann** (v. 12, kastanjegumpad tyrann)
- Rödflammig tyrann flyttas från släktet *Deltarhynchus* till plattnäbbarna i släktet *Ramphotricon* och den får namnet **rödflammig plattnäbb** (*Ramphotricon flammulatum*).
- Vitstrimmig munkskata (*Melitograis giloloensis*) står inte nära övriga munkskator i släktet *Philemon* varför namnet ändras till **halmaherahonungsfågel**.

- Genetiska studier har visat att kopjeskvätta (*Pinarornis plumosus*) i själva verket är en trast, varför den flyttas från familjen flugsnappare (Muscicapidae) till trastar (Turdidae) och får namnet **kopjetrast**.
- Solitärtrastarna i släktena *Cichlopsis* och *Entomodestes* står inte nära solitärtrastarna i *Myadestes*, utan är systergrupp till skogstrastarna i *Catharus* och *Hylocichla*, varför namnen på tre arter justeras till **kannelskogstrast** (v. 12 brun solitärtrast), **svart skogstrast** och **vitörad skogstrast**.
- Tre trastar med ”koltrast” i namnet justeras till bara ”trast” då de genetiskt inte står närmast koltrast; **mandarintrast** (v. 12, kinesisk koltrast), **indisk trast** och **tibettrast**.

Övriga justeringar

- Stavningen ”streckig” justeras till ”streckad”, vilket ~~påverkar~~ ger följande arter nya namn; **svartstreckad trögfågel**, **streckad barbett**, **streckad lorikit**, **gulstreckad lori**, **blåstreckad lori**, **streckad trädklättare**, **streckad sprödstjärt**, **streckad myrtörnskata**, **streckad myrpitta**, **trestreckad tchagra**, **gulstreckad bulbyl**, **gulstreckad sångare**, **streckad rörsångare**, **vitstreckad fnittertrast**, **streckad flugsnappare**, **streckad spindeljägare**, **streckad vävare**, **svartstreckad sparv**, **grönstreckad sparv** och **gulstreckad snårsparv**.
- Några arter med nationsnamn i genitiv ersätts med kortare sammanskrivna namn:
 - **argentinakopparand**, **argentinadoradito** (v. 12, argentinsk);
 - **brasilientinamo**, **brasilienand**, **brasilienmyrtrast**, **brasilienorsorgfågel**, **brasilienkrika**, **brasilientangara** (v. 12, brasiliansk);
 - **papuatigerhäger** (v. 12, papuansk);
 - **taiwanbambuhöna** (v. 12, taiwanesisk);
 - **tibetrapphöna**, **tibetsnöhöna**, **tibetsnöfink** (v. 12 tibetansk), och;
 - **vietnamkutia** (v. 12, vietnamesisk).
- Tre namn på blygrå fåglar förenklas från ”blygrå” till det kortare ”bly-”; **blyrall**, **blyvråk**, **blytrast**.
- Två namn med ”tandnäbbad/tandnäbbs” förenklas till ”tand-” i linje med ett flertal andra arter som redan heter ”tand-”; **tandkolibri**, **tandlövsalsfågel**.
- Större sporrök ändras till **orientssporrkök**, då arten inte är den största av sporrökarna.
- Mindre hökgök ändras till **berghökgök**, då arten inte är den minsta hökgöken.
- I samband med att flera arter i släktet *Streptopelia* delas upp justeras namnet på ytterligare två arter genom att det felvisande ”turk” tas bort från namnet, då de genetiskt inte står närmast turkduvan, de nya namnen är **flodduva** (v. 12, vitvingad turkduva) och **savannduva** (v. 12, kapturduva).
- Forskning visar att hispaniolatornugglan och den numera utdöda puertoricotornugglan bör betraktas som en och samma art, som får namnet **gråmaskad tornuggla** (*Tyto glaucops*).
- Eftersom arten förekommer från södra USA ned till Nicaragua justeras namnet på mexikansk skrikuv till **mustaschskrikuv**, i linje med det engelska namnet.
- Västlig jako ändras till **temnejako**, i linje med det engelska namnet. Temne är kommer av namnet på en folkgrupp i Sierra Leone, där arten förekommer.
- Müllerpapegja ändras till **blåryggig papegoja**, vilket också är i linje med det engelska namnet på arten.

- Tjocknäbbad sparvpapegoja ändras till **flodsparvpapegoja**, då arten inte är unikt tjocknäbbad. IOC gör samma justering efter rekommendation från South American Classification Committee (SACC).
- Namnet på de två endemiska monarkerna på Tanimbar i Indonesien anpassas efter det engelska språkbruket. *Symposiachrus mundus* får namnet **svarthakad monark** och det tidigare namnet **tanimbarmonark** reserveras för *Carterornis castus*.
- I samband med att dvärglärka delas upp görs ytterligare två ändringar bland dvärglärkorna (släktet *Alaudala*). Dels justeras sandlärka till **sanddvärglärka**, dels ändras mongolisk dvärglärka till **sidenvägsdvärglärka**, då arten förekommer över en långt större område än Mongoliet – från Turkmenistan i väster till nordöstra Kina i öster. Utbredningen följer i stora drag de medeltida sidensvägarnas sträckning från nordöstra Kina till Centralasien.
- I samband med att sundabulbyl delas upp i java- respektive sumatrabulbyl, justeras namnet på *Hemixos leucogrammicus* från sumatra- till **vitstreckad bulbyl**, i linje med det engelska språkbruket.
- **Himalayasångare** blir nytt namn istället för sydlig kungsfågelsångare, då denna inte är systerart till kungsfågelsångare.
- Marianersångare ändras till **guamsångare**, då den numera utdöda arten efter splitt av saipan- och aguijansångare var endemisk för Guam.
- I samband med att det engelska namnet på Swinhoe's Prinia ändras till Striped Prinia, justeras även det svenska namnet från swinheoprinia till **strimprinia**.
- För att undvika sammanblandning med de egentliga grästimalierna (släktet *Graminicola*) justeras namnet på rostgumpad grästimalia och brahmaputrgrästimalia (släktet *Laticilla*) till **industimalia** respektive **brahmaputratimalia**.
- Emeishanpraktimalia förenklas till **emeipraktimalia**, i linje med bruket för andra artnamn, såsom emeibambusångare och emeikronsångare. Shan betyder 'berg' på kinesiska, så är överflödigt.
- För att undvika förväxling med bandgårdsmyg justeras bandad gårdsmyg till det mer specifika namnet **zebragårdsmyg**.
- Svarthättad trast justeras till **svarthuvad trast** då det mer korrekt beskriver artens utseende.
- Ön Sumba i Indonesien hyser tre endemiska flugsnappare, alla med brunaktig dräkt. *Muscicapa segregata* har ett unikt drillande läte och får namnet **drillflugsnappare**, samtidigt som det tidigare namnet **sumbaflugsnappare** reserveras för *Ficedula harterti* (v. 12, hartertflugsnappare) i linje med det engelska namnet Sumba Flycatcher.
- I samband med uppdelningen av ryukyunäktergal i två arter, justeras namnet på den närbesläktade arten japansk rödhake, även den i näktergalssläktet *Larvivora*, till **japansk näktergal**.
- I samband med att gulbrynad narcissflugsnappare (*Ficedula narcissina*) delas upp i två arter och namnet narcissflugsnappare reserveras för *narcissina*, förenklas namnet på två närstående arter till **solflugsnappare** (v. 12, vitbrynad narcissflugsnappare), respektive **shanxiflugsnappare** (v. 12, kinesisk narcissflugsnappare).
- Namnet på två skogstrastar justeras till **gulstrupig skogstrast** (v. 12, gouldskogstrast), resp. **spräcklig skogstrast** (v.12, sclaterskogstrast). IOC gör samma justering efter rekommendationer från South American Classification Committee (SACC) och North American Classification Committee (NACC).

- Då det finns ett flertal tangaror med lika eller tjockare näbbar än tjocknäbbad tangara, justeras namnet till **svavelstrupig tangara**, i linje med det engelska Sulphur-throated.
- För att undvika sammanblandning med de egentliga grästangarna (släktet *Emberizoides*) justeras namnet på grästangara (släktet *Sicalis*) till **gultangara**.

Utdödalistan

Även listan med namn på arter som dött ut före år 1500 har uppdaterats.

- En ny tornuggla har beskrivits från Kuba:
 - **mindre kubatornuggla** (*Tyto maniola*)
- Cravestornuggla byter namn till **större kubatornuggla** (*Tyto cravesi*).
- Haititornuggla byter namn till **hispanionlatornuggla** (*Tyto ostologa*), ett namn som bättre beskriver utbredningen på ön Hispaniola, snarare än landet Haiti.
- En ny marklevande uggla har beskrivits från Kuba:
 - **mindre markuggla** (*Ornimegalonyx ewingi*)
- En ny sothöna har beskrivits från Chile:
 - **chilesothöna** (*Fulica montanei*)
- En ny snäppa har beskrivits från ön Henderson i Stilla havet:
 - **hendersonsnäppa** (*Prosobonia sauli*)

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund och Tommy Tyrberg, Tk,
29 juli 2021.

Namnlistan, version 12



En av nyheterna i IOC:s lista är att svartbent strandpipare delas upp i två arter när sandstrandpipare *Charadrius dealbatus* får artstatus. På bilden en sandstrandpipare från Laem Pak Bia i norra Thailand. Foto: Markus Lagerqvist.

Version 12 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 10.2 (juli 2020). I denna uppdatering görs en stor mängd ändringar på släktesnivå, varav de flesta inte påverkar de svenska namnen och därför inte redovisas här. Observera att Tk alltid har haft andfåglar före hönsfåglar, vilket IOC kommer att ändra till i sin kommande v. 11.1, för att följa allmän konsensus. Samtliga Tk:s listor har denna ordning.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Tofsargusfasan (*Rheinardia ocellata*) delas upp i två arter:
 - tofsargus (*R. ocellata*), som är endemisk inom ett litet bergsområde på centrala Malackahalvön, huvudsakligen inom nationalparken Taman Negara, och;
 - **annamitargus** (*R. nigrescens*) som förekommer i bergsområdet Annamiterna på gränsen mellan Vietnam och Laos.
- Svartbent strandpipare (*Charadrius alexandrinus*) delas upp i två arter:
 - svartbent strandpipare (*C. alexandrinus*), vidspridd från Europa till östra Asien, och;
 - **sandstrandpipare** (*C. dealbatus*), som häckar i södra Kina och troligen Vietnam. Där arterna förekommer tillsammans föredrar sandstrandpiparen hårdare, sandigare marker.
- Tullbergspett (*Campethera tullbergi*) delas upp i två arter:
 - tullbergspett (*C. tullbergi*) som förekommer i gränstrakterna mellan Nigeria och Kamerun, samt på ön Bioko, och;
 - **finbandad hackspett** (*C. taeniolaema*), från östra Kongo-Kinshasa till västra Kenya och norra Tanzania.
- Vittryggigt eldöga (*Pyriglena leuconota*) delas upp i tre arter:
 - **amazoneldöga** (*P. leuconota*), som förekommer i östra Amazonas-området samt i östra Pernambuco och östra Alagoas;
 - **tapajóseldöga** (*P. similis*), som förekommer i Pará and norra Mato Grosso, från Rio Tapajós österut till Rio Xingu, och;
 - **västligt eldöga** (*P. maura*), som förekommer från södra Colombia till Bolivia till Paraguay och sydvästra Brasilien.
- Strimmig grässmyg (*Amytornis striatus*) delas upp i tre arter:
 - strimmig grässmyg (*A. striatus*), från centrala Australien;
 - **opaltongrässmyg** (*A. rowleyi*), som är endemisk för det lilla opalrika området kring Opalton i västra Queensland, och;
 - **rostgrässmyg** (*A. whitei*), från västra, västcentrala och sydcentrala Australien.
- Lyrdrongo (*Dicrurus hottentottus*) delas upp i två arter:
 - lyrdrongo (*D. hottentottus*) som förekommer med 13 raser från Indien i väster till Moluckerna i väster, och;
 - **palawandrongo** (*D. palawanensis*), som är endemisk för öarna Palawan och några mindre öar i Filippinerna.
- Melanesisk sydhake (*Petroica pusilla*) delas upp i två arter:
 - melanesisk sydhake (*P. pusilla*) som förekommer i Vanuatu, Fiji och Samoa, samt;
 - **salomonsydhake** (*P. polymorpha*), som är endemisk för öarna Bougainville Kolombangara, Guadalcanal och Makira i Salomonöarna.
- Gultygld borstbulbyl (*Bleda notatus*) delas upp i två arter:
 - gultygld borstbulbyl (*B. notatus*) som förekommer från Nigeria till Centralafrikanska republiken och Kongo-Brazzaville, samt på ön Bioko, och;

- **gulögd borstbulbyl** (*B. ugandae*), från centrala och norra Kongo-Kinshasa till sydvästra Sudan och Uganda.
- Gråkindad bulbyl (*Alophoixus bres*) delas upp i två arter:
 - **brunkindad bulbyl** (*A. bres*) endemisk för Java och Bai, och;
 - **gråkindad bulbyl** (*A. tephrogenys*), från Malackahalvön, Sumatra och Borneo.
- ockrabulbyl (*Alophoixus ochraceus*) delas upp i två arter:
 - ockrabulbyl (*A. ochraceus*) som förekommer från Burma till Vietnam, söderut till Malackahalvön och Sumatra, och;
 - **penanbulbyl** (*A. ruficrissus*), endemisk för Borneo. Namnet kommer från folkslaget penan på Borneo.
- Svarttyglad bulbyl (*Pycnonotus flavescens*) delas upp i två arter:
 - svarttyglad bulbul (*P. flavescens*) som förekommer från nordöstra Indien öster- och söderut till södra Kina och Thailand, och;
 - **vitmaskad bulbyl** (*P. leucops*), endemisk för Borneo.
- Indonesisk smygsångare (*Locustella castanea*) delas upp i tre arter:
 - **sulawesismygsångare** (*L. castanea*), från Sulawesi;
 - **seramsmygsångare** (*L. musculus*) endemisk för ön Seram, och;
 - **burusmygsångare** (*Locustella disturbans*), endemisk för ön Buru.
- Rödstrupig sångare (*Curruca cantillans*) delas upp i två arter (denna splitt har sedan tidigare genomförts av svenska Tk):
 - rödstrupig sångare (*C. cantillans*), i östra Medelhavsområdet och;
 - **rostsångare** (*C. iberiae*), på Iberiska halvön, södra Frankrike och nordvästra Afrika.

Tre nyligen beskrivna arter tillkommer:

- **taliabumyzomela** (*Myzomela wahe*), som är endemisk för ön Taliabu i Indonesien.
- **pelengsolvfjäderstjärt** (*Myzomela prawiradilagae*), som är endemisk för ön Peleng i Indonesien.
- **taliabusmygsångare** (*Locustella portenta*), som är endemisk för ön Taliabu i Indonesien.

Två arter stryks från listan:

- Alagoasdvärgspett (*Picumnus fulvescens*) och cearadvärgspett (*Picumnus limae*) slås samman till en art, som får namnet **ockradvärgspett** (*Picumnus limae*). Samtidigt justeras namnet på ockradvärgspett (v. 11) till **rosthalsad dvärgspett** (*Picumnus fuscus*).
- Alaskakråka (*Corvus caurinus*) förlorar sin artstatus och räknas framöver som en ras av amerikansk kråka (*Corvus brachyrhynchos*).

Justeringar pga. byte av släkte eller familj

- Två arter flyttas från sånghönsen i släktet *Arborophila* till släktet *Tropicoperdix*, varvid namnen justeras till **charltonhöna** (v. 11, charltonsånghöna) och **grönfotshöna** (v. 11, grönbent sånghöna).

- Släktet *Rallicula* flyttas från familjen rallar (*Rallidae*) till familjen dunrallar (*Sarothruridae*). Namnen på de fyra arterna justeras från rall till dunrall och blir:
 - **kastanjedunrall** (*Rallicula rubra*)
 - **arfakdunrall** (*Rallicula leucospila*)
 - **svartvingad dunrall** (*Rallicula forbesi*)
 - **cyklopdunrall** (*Rallicula mayri*)
- Afrikansk kornknarr har visat sig inte alls vara nära släkt med kornknarren (släktet *Crex*) och får det nya namnet **gräsrall** (*Creopsis egregia*).
- Tre arter bland dvärgrallarna i släktet *Laterallus*, justeras med tillägget dvärg i namnet, det gäller **svart dvärgrall** (v. 11, svartrall), **galápagosdvärgrall** (v. 11, galápagosrall), **atlantdvärgrall** (v. 11, atlanrall).
- En art bland det nyligen utökade sumphönssläktet *Zapornia*, justeras från korprall till **korpsumphöna**. Samtidigt justeras vattenhöna till **vattensumphöna** för att bättre överensstämma med övriga arter sumphöner i släktet *Amaurornis*.
- Hökörnarna i släktena *Nisaetus* och *Spizaetus* står inte närmast hökörn och afrikansk hökörn i släktet *Aquila*, varför förledet ”hök” stryks från namnet. För fem av arterna görs ytterligare justering av namnet det gäller:
 - orientörn (v. 11, variabel hökörn)
 - sundaörn (v. 11, Blyths hökörn)
 - mindanaoörn (v. 11, pinskerhökörn)
 - tyrannörn (v. 11, svart hökörn)
 - isidoreörn (v. 11, Isidores hökörn)
- Puertoricoskrikuv (*Gymnasio nudipes*) har visat sig inte alls vara nära släkt med skrikuvorna i släktet *Megascops*, utan istället stå närmare ponderosaugglan. Den får det nya namnet **puertoricouggla**
- Palauuggla (*Pyrroglaux podargina*) har visat sig stå nära dvärguvarna i släktet Otus. Den får det nya namnet **palaudvärguv**
- Salomonspökuggla (*Ninox jacquinoti*) har visat sig inte alls vara nära släkt med späkugglorna i släktet *Ninox*, utan istället stå närmare släkte Athene. Den får det nya namnet **salomonuggla**
- Orientsparvuggla (*Glaucidium brodiei*) och sundasparvuggla (*Glaucidium sylvaticum*) har visat sig inte alls vara nära släkt med sparvugglorna i släktet *Glaucidium*, utan istället stå närmare borstuggla (*Xenoglaux*) och kaktusuggla (*Micrathene*). De får de nya namnen **janusuggla** och **sundauggla**.
- Trådstjärt (*Sylviorthorhynchus desmurei*) justeras till **trådsprötstjärt**, då den visat sig vara systerart till gyllenbrun sprötstjärt.
- Gulvingad kotinga (*Tijuca atra*) och gråvingad kotinga (*Tijuca condita*) justeras till **gulvingad piha** och **gråvingad piha**, då genetiska studier visat att släktet *Tijuca* ligger inbäddad bland pihorna i släktet *Lipaugus*.
- Gulbrynad madagaskarsångare (*Crossleyia xanthophrys*) justeras till **gulbrynad tetraka** då den genetiskt står nära tetrakorna i släktet *Xanthomixis*.
- Vitkindad olivastrild (*Delacourella capistrata*) justeras till **vitkindad atrild**, då den visat sig inte tillhöra olivastrilderna i släktet *Nesocharis*.
- Grön droppastrild (*Mandingoa nitidula*) justeras till **grönastrild** då den inte står nära droppastrilderna i de tre närliggande släktena *Euschistospiza*, *Hypargos* och *Clytospiza*

- Rödkronad piplärksångare (*Seiurus aurocapilla*) har visat sig vara endast avlägset släkt med de båda andra piplärksångarna och är faktiskt istället systerart till resten av familjen. Därför får arten det nya namnet **brandkronad skogssångare**.

I samband med att IOC justerar namnen på arterna i släktet *Piranga*, som tidigare hetat "tanager" på engelska trots att de tillhör familjen kardinaler (*Cardinalidae*) justeras namnet på de arter i familjen som istället för kardinal hette tangara, tjocknäbb eller fink. För de allra flesta innebär det bara att efterledet ersätts med "kardinal", men för några arter behöver ytterligare justering göras, t.ex. för att undvika dubbeltnamn. De arter som berörs är:

- fläckvingad kardinal (v. 11, fläckvingad tangara)
- tandkardinal (v. 11, tandtangara)
- caatingakardinal (v. 11, röd tangara)
- tegelröd kardinal (v. 11, tegelröd tangara)
- sommarkardinal (v. 11, sommartangara)
- rosenstrupskardinal (v. 11, rosenstruptangara)
- scharlakanskardinal (v. 11, schrlakanstangara)
- brandkardinal (v. 11, västlig tangara)
- vitbandad kardinal (v. 11, vitbandad tangara)
- rödhuvad kardinal (v. 11, rödhuvad tangara)
- eldkardinal (v. 11, eldtangara)
- röd myrkardinal (v. 11, röd myrtangara)
- rödstrupig myrkardinal (v. 11, rödstrupig myrtangara)
- svartkindad myrkardinal (v. 11, svartkindad myrtangara)
- sotfärgad myrkardinal (v. 11, sotfärgad myrtangara)
- tofsmyrkardinal (v. 11, kardinalmyrtangara)
- blåkardinal (v. 11, blåtjocknäbb)
- turkoskardinal (v. 11, indigofink)
- lazulikardinal (v. 11, lazulifink)
- purpurkardinal (v. 11, brokfink)
- påvekardinal (v. 11, påvefink)
- rositakardinal (v. 11, rositafink)
- orangeblå kardinal (v. 11, orangeblå fink)

I samband med att IOC gör en större ommöblering bland släktena i familjen tangaror (*Thraupidae*) justeras namnet på de arter i familjen som istället för tangara hette fink eller hemispingus. För de allra flesta innebär det bara att "fink" (inkl. gulfink och sångfink) byts ut till "tangara", men för några arter behöver ytterligare justering göras, t.ex. för att undvika dubbeltnamn eller för att spegla den uppdaterade taxonomin, det gäller:

- plyschpanna (v. 11, mestangara)
- rostryggig inkatangara (v. 11, brunryggig inkafink)
- blågul tangara (v. 11, gulgumpad bergtangara)
- guvernanttangara (v. 11, gul kardinaltangara)
- svarthättad tangara (v. 11, svartkronad tanagara)
- vitkantad tangara (v. 11, magellanfink)
- grönaktig tangara (v. 11, olivgulfink)
- altiplanotangara (v. 11, gulgumpad gulfink)
- sadeltangara, (v. 11, brunryggig fink)
- glaciärtangara (v. 11, vitvingad fink)
- skuggtangara (v. 11, skifferfink)
- orangebröstad tangara (v. 11, rostbröstad tangara)
- vitbröstad tangara (v. 11, vitbröstad fink)

- savanntangara (v. 11, svarttofsad fink)
- svartkindad tangara (v. 11, svartmaskad fink)
- kusttangara (v. 11, halsbandssångfink)
- argentinatangara (v. 11, kanelsångfink)
- sotmaskad tangara (v. 11, svartmaskad sångfink)
- chusqueatangara (v. 11, rostbrynad sångfink)
- kastanjetangara (v. 11, vitbrynad sångfink)
- ögonbrynstangara (v. 11, vitbrynad tangara)
- rostsidig tangara (v. 11, brunsidig sångfink)
- cerradotangara (v. 11, gråsångfink)
- chacotangara (v. 11, svarthuvad sångfink)
- tiaratangara (v. 11, gulstrupig gräsfink)
- oxtangara (v. 11, puertoricofink)
- jamaicatangara (v. 11, gulryggig gräsfink)
- talltangara (v. 11, kubagräsfink)
- sisitangara (v. 11, skiffergräsfink)
- blektangara (v. 11, brun gräsfink)
- bladtangara (v. 11, tjocknäbbad darwinfink)
- vassnäbbad tangara (v. 11, spetsnäbbad darwinfink)
- vampyrtangara (v. 11, vampyrdarwinfink)
- genovesatangara (v. 11, genovesadarwinfink)
- españolatangara (v. 11, españoladarwinfink)
- större kaktustangara (v. 11, genovesakaktusfink)
- stornäbbad frötangara (v. 11, maximilianfröfink)

De 13 arterna busksparvar i släktena *Melospiza* och *Pipilo* justeras till **snårsparvar**, då de står närmare snårsparvarna i släktet *Atlapetes*, än busksparvarna i släktet *Chlorospingus*. För en art behöver ytterligare justering göras, för att undvika dubblettnamn, varför glasögonsnårsparv justeras till **vitmaskad snårsparv**.

Övriga justeringar

- större argus (v. 11, större argusfasan)
- De två kolibrierna i släktet *Schistes* byter engelska namn från wedgebill till daggerbill då det är en mer korrekt beskrivning av näbbens form. Samma justering görs därför på svenska; från kilnäbbskolibri till **dolknäbb**.
- barololira (v. 11, makaronesisk lira)
- afepduva (v. 11, afrikansk ringduva)
- blåfläckduva (v. 11, blåfläcksduva)
- olivbiätare (v. 11, olivgrön biätare)
- guatemaladvärgtyrann (v. 11, oansenlig dvärgtyrann)
- sotsångare (v. 11, sotbrunsångare)
- laurasångare (v. 11, gulgrön sångare)
- dalatkrokia (v. 11, annamkrokia)
- skiffertrast (v. 11, bergskiffertrast)
- smedtrast (v. 11, östlig skiffertrast)
- yuccatrupal (v. 11, Scotts trupial)
- amazonkardinal (v. 11, rotschildkardinal)

Utdödalistan

Även listan med namn på arter som dött ut före år 1500 har uppdaterats med sex nya arter.

- En ny art av nya världens gamar har beskrivits från Kuba:
 - **kubagam** (*Coragyps seductus*)
- Från Kuba har även tre nya arter av hökartade rovfåglar beskrivits:
 - **royvråk** (*Buteogallus royi*)
 - **kubavråk** (*Buteo sanfelipensis*)
 - **itchevråk** (*Gigantohierax itchei*)
- En gigantisk fruktätande duva, som kunde svälja frukter stora som tennisbollar hela, har beskrivits i ett nytt släkte från Tonga:
 - **tongaduva** (*Tongoenas burleyi*)
- En ny art av karakara har beskrivits, även den från Kuba:
 - **mindre kubakarakara** (*Milvago diazfrancoi*) – samtidigt justeras namnet på kubakarakara till större kubakarakara (*Milvago carbo*)

Namnet på caymanfink (*Melopyrrha latirostris*) justeras till caymatangara, då den hör hemma i familjen tangaror.

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund och Tommy Tyrberg, Tk,
3 oktober 2020.

Namnlistan, version 11



En av nyheterna i IOC:s lista är kattuggla delas upp i två arter när atlaskattugglan i Nordvästafrika får artstatus. På bilden en atlaskattuggla från Forêt de Djimla i norra Algeriet. Foto: Markus Lagerqvist.

Version 11 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 10.1 (januari 2020).

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Småspov (*Numenius phaeopus*) delas upp i två arter:
 - småspov (*N. phaeopus*), i Eurasien, och;
 - **amerikansk småspov** (*N. hudsonicus*) i Nordamerika.
- Kungstärna (*Thalasseus maximus*) delas upp i två arter:
 - kungstärna (*T. maximus*), i Nya världen, och;
 - **guineatärna** (*T. albididorsalis*), i Västafrika.
- Orientsparvuggla (*G. brodiei*) delas upp i två arter:

- oriensparvuggla (*G. brodiei*) som förekommer från Himalaya österut till södra Kina och Malaysia, och;
- **sundasparvuggla** (*G. sylvaticum*), från Större Sundaöarna.
- Kattuggla (*Strix aluco*) delas upp i två arter:
 - kattuggla (*S. aluco*), som förekommer i västra Eurasien, och;
 - **atlaskattuggla** (*S. maritana*), i Nordvästafrika.
- Festkokett (*Lophornis chalybeus*) delas upp i två arter:
 - festkokett (*L. chalybeus*), i sydöstra Brasilien, och;
 - **fjärilskokett** (*L. verreauxii*), som förekommer från östra Colombia till centrala Bolivia, nordvästra Brasilien och sydöstra Venezuela.
- Slank honungsfågel (*Microptilotis gracilis*) delas upp i två arter:
 - slank honungsfågel (*M. gracilis*), på södra Nya Guinea, Aruöarna, öar i Torres sund, samt på Cape York-halvön i Australien, och;
 - **kryptisk honungsfågel** (*M. imitatrix*), i nordöstra Queensland.
- Strimmig prinia (*Prinia crinigera*) delas upp i två arter:
 - **himalayaprinia** (*P. crinigera*), som förekommer från Afghanistan österut till nordöstra Indien, Bhutan, och södra Kina, och;
 - **swinhoeparinia** (*P. striata*), från Kina och Taiwan.
- Brun prinia (*Prinia polychroa*) delas upp i tre arter:
 - brun prinia (*P. polychroa*), i Thailand, Laos och Kambodja, samt på Java;
 - **burmaprinia** (*P. cooki*), i centrala Burma, och;
 - **dalatprinia** (*P. rocki*), på Đà Lạt-platån i Vietnam.
- Papuasångare (*Phylloscopus maforensis*) delas upp i tre arter:
 - **papuasångare** (*P. poliocephalus*), som förekommer från Moluckerna och Nya Guinea österut till Salomonöarna;
 - **numforsångare** (*P. maforensis*), endemisk för ön Numfor väster om Nya Guinea, och;
 - **biaksångare** (*P. misoriensis*), endemisk för ön Biak i Cenderawasihbukten norr om Västpapua.
- Medelhavsstenskvätta (*Oenanthe hispanica*) delas upp i två arter (denna splitt har sedan tidigare genomförts av Taxonomikommittén):
 - **västlig medelhavsstenskvätta** (*O. hispanica*), i västra Medelhavsområdet, och;
 - **östlig medelhavsstenskvätta** (*O. melanoleuca*), i östra Medelhavsområdet, österut till Kazakstan.

Två nyligen beskrivna arter tillkommer:

- **alormyzomela** (*Myzomela prawiradilagae*), som är endemisk för ön Alor i Små Sundaöarna i Indonesien.
- **dajakblomsterpickare** (*Dicaeum dayakorum*), från Borneo.

Två arter stryks från listan:

- Acehfasan (*Lophura hoogerwerfi*) förlorar sin artstatus och räknas framöver som en underart till salvadorifasan (*Lophura inornata*).
- Deignantimalia (*Stachyridopsis rodolpheii*) förlorar sin artstatus och räknas framöver som en färgvariant av rostpannad timalia (*Stachyridopsis rufifrons*).

Övriga justeringar

Réunionuggla, mauritiusuggla och rodiguesuggla justeras från -uggla till **-dvärguv**, efter att genetiska analyser visat att dessa tre utdöda arter står nära dvärguvarna i släktet *Otus*.

Svartgumpad springhöna ändras till det mer rättvisande namnet **kapspringhöna**.

Olivryggig flampett justeras till **olivryggig hackspett**, då genetiska studier visat att arten inte tillhör flampettarna i släktet *Dinopium*, utan istället är syster till de två arterna i släktet *Gecinulus* (bambuspett och blekhuvad hackspett).

Langbiantimalia justeras till **dalattimalia**, arten är uppkallad efter högplatån i södra Vietnam där den förekommer. Platån kallas omväxlande dalatplatån eller langbianplatån, men för ett konsekvent språkbruk ändras namnet då övriga arter uppkallade efter platån har förledet dalat- (dalatbrokvireo, dalatsmygsångare, dalatprinia).

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund och Tommy Tyrberg, Tk, 15 mars 2020.

Namnlistan, version 10



En av nyheterna i IOC:s lista är att mindre törntrast delas upp i hela åtta arter! På bilden den nya arten variabel törntrast (*Colluricincla fortis*). Foto: Markus Lagerqvist.

Version 10 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 9.2 (juni 2019). Pga. att IOC 9.2 anammat en ny systematisk ordning har även en stor mängd omflyttningar skett av ordningar och familjer inom icke-tättingarna.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Knölsvärta (*Melanitta deglandi*) delas upp i två arter:
 - amerikansk knölsvärta (*M. deglandi*)

- **sibirisk knölsvärta** (*N. stejnegeri*)
- Gråstrupig skogsrall (*Canirallus oculus*) är inte nära släkt med de andra skogsrallarna i familjen dunrallar (*Sarothruridae*) och flyttas till familjen rallar (*Rallidae*). Namnet justeras till **gråstrupig rall**.
- Sandtärna (*Gelochelidon nilotica*) delas upp i två arter:
 - sandtärna (*G. nilotica*), som förekommer över stora delar av världen
 - **australisk sandtärna** (*G. macrotarsa*), från Nya Guinea och norra Australien
- Afrikansk palmseglare (*Cypsiurus parvus*) delas upp i två arter:
 - afrikansk palmseglare (*C. parvus*) som förekommer över större delen av tropiska Afrika
 - **madagaskarpalmseglare** (*C. gracilis*), från Madagaskar och Komoreerna
- Punabergstjärna (*Oreotrochilus estella*) delas upp i två arter:
 - punabergstjärna (*O. estella*), som förekommer från sydvästra Peru till nordvästra Argentina
 - **grönhuvad bergstjärna** (*O. stolzmanni*), som förekommer från södra Ecuador till centrala Peru
- Indisk blåkråka (*Coracias benghalensis*) delas upp i två arter:
 - indisk blåkråka (*C. benghalensis*), som förekommer från Arabiska halvön österut till Bangladesh
 - **indokinesisk blåkråka** (*C. affinis*), från Indokina
- Mindre trädklättrare (*Xiphorhynchus fuscus*) delas upp i två arter:
 - mindre trädklättrare (*X. fuscus*), som förekommer i stort område från Bahia i Brasilien, söderut till nordöstra Argentina
 - **cearáträdklättrare** (*X. atlanticus*), begränsad till Nordeste-regionen i nordöstra Brasilien
- Napomyrsmyg (*Epinecrophylla haematonota*), negromyrsmyg (*E. pyrrhonota*) och yasunímyrsmyg (*E. fjeldsaai*) slås samman till en art, som får namnet **rostmantlad myrsmyg** (*E. haematonota*).
- Höglandselenia (*Elaenia obscura*) delas upp i två arter:
 - höglandselenia (*E. obscura*), som finns i stora delar av Sydamerika, från sydöstra Ecuador till nordvästra Argentina
 - **småhuvad elenia** (*E. sordida*), från sydöstra Brasilien, östra Paraguay och nordöstra Argentina
- Mindre törntrast (*Colluricincla megarhyncha*) delas upp i åtta arter:
 - **arafuratörntrast** (*C. megarhyncha*), som förekommer i nordvästra Australien, österut till västra Carpentaria-viken, på Aruöarna och i Trans-Fly-regionen på södra Nya Guinea, samt från Vogelkophalvön till Cenderawasihbukten och de närliggande lågländerna i sydvästra Nya Guinea och på Raja Ampatöarna
 - **variabel törntrast** (*C. fortis*), som förekommer på Papuahalvön (i norr från Huon-bukten och i söder från övre Fly-Digul-floderna), samt i d'Entrecasteaux-arkipelagen och på Trobrianderna sydöst om Nya Guinea
 - **waigeotörntrast** (*C. affinis*), endemisk för ön Waigeo i Raja Ampatöarna väster om Nya Guinea

- **mamberamotörtrast** (*C. obscura*), från nordvästra and västcentrala Nya Guinea, samt ön Yapen i Schoutenöarna i Cenderawasih-bukten
- **tagulatörtrast** (*C. discolor*), endemisk för ön Tagula i Louisiaderna sydöst om Nya Guinea
- **sepiktörtrast** (*C. tappenbecki*), som förekommer från nordcentrala Nya Guinea till Astrolabe-bukten, på Huonhalvön och i östcentrala New Guinea
- **rosttörtrast** (*C. rufogaster*), som förekommer i kustnära östcentrala Australien, från nordöstra New South Wales till Burdekinfloden i Queensland, södra Carpentariaviken och Cape Yorkhalvön till Torres Strait, kustnära delar av Trans-Fly-region i södra Nya Guinea och i nordöstra Queensland mellan floderna Burdekin och Endeavour
- **biakvisslare** (*Pachycephala melanorhyncha*), endemisk för ön Biak i Cenderawasih-bukten – som visat sig inte vara en törtrast, utan en visslare
- Vitögd bulbyl (*Pycnonotus simplex*) delas upp i två arter:
 - **blekgumpad bulbyl** (*P. simplex*), som förekommer på Malackahalvön, Sumatra, Borneo och Java
 - **gräddögd bulbyl** (*P. pseudosimplex*), från Borneo, men mer begränsat till primärregnskog än blekgumpad bulbyl
- gulbukig glasögonfågel (*Zosterops chloris*) delas upp i två arter:
 - gulbukig glasögonfågel (*Z. chloris*), som förekommer från Sulawesi till Små Sundaöarna
 - **wakatobiglasögonfågel** (*Z. flavissimus*), som är endemisk för Wakatobiöarna sydöst om Sulawesi
- halmaheraglasögonfågel (*Zosterops atriceps*), delas upp i två arter:
 - halmaheraglasögonfågel (*Z. atriceps*), från Halmahera, Bacan och Obi, i norra Moluckerna
 - **morotaiglasögonfågel** (*Z. dehaani*), endemisk för Morotai, i norra Moluckerna
- vittyglad myggsnappare (*Polioptila albiloris*) delas upp i två arter:
 - vittyglad myggsnappare (*P. albiloris*), som förekommer från västra Mexiko, söderut till Costa Rica
 - **yucatánmyggsnappare** (*P. albiventris*), från Yucatánhalvön, i Mexiko
- svartnäbbad trast (*Turdus ignobilis*) delas upp i tre arter:
 - svartnäbbad trast (*T. ignobilis*), från norra och västra Amazonas
 - **campinatrast** (*T. arthuri*), från låglandet i sydöstra Venezuela, Guyana, Surinam, östra Colombia och västcentrala brasilianska Amazonas. Namnet kommer från miljön – campina är en ekoregion i Amazonas, med vegetation på näringsfattiga sandjordar med dålig avrinning. Termen inkluderar öppet skogslandskap, busk- och ängsmarker
 - **tepuítrast** (*T. murinus*), från tepuíberg i södra Venezuela och Guyana
- bergflugsnappare (*Cyornis banyumas*) delas upp i två arter:
 - **javaflugsnappare** (*C. banyumas*), från Java och Borneo. Det är troligt att underarten på Borneo i sin tur är egen art.

- **bergflugsnappare** (*C. whitei*), som förekommer från Burma, österut till södra Kina och söderut till Malackahalvön
- tickellflugsnappare (*Cyornis tickelliae*) delas upp i två arter:
 - tickellflugsnappare (*C. tickelliae*), i Sydasiens
 - **indokinesisk flugsnappare** (*C. sumatrensis*), från Indokina, Malackahalvön och på Sumatra
- långnäbbad piplärka (*Anthus similis*) delas upp i två arter:
 - långnäbbad piplärka (*A. similis*), som förekommer över stora delar av Afrika och Asien
 - **nicholsonpiplärka** (*A. nicholsoni*), från södra Afrika

En nyligen beskriven art tillkommer:

- **blåstrupig bergstjärna** (*Oreotrochilus cyanolaemus*), från sydvästra Ecuador

Flera nya grupper får familjestatus:

- Brednäbbarna delas upp i
 - **Praktbrednäbbar** (*Eurylaimidae*)
 - **Asiter** (*Philepittidae*)
 - **Grönbrednäbbar** (*Calyptomenidae*)
- Tofsvisslaren (*Falcunculus frontatus*) bryts ut från visslarna (*Pachycephalidae*) och får status som en monotypisk familj – **falknäbbar** (*Falcunculidae*). Arten får samtidigt namnet **falknäbb**, efter det vetenskapliga namnet.
- Grön hylia (*Hylia prasina*) och meshylia (*Pholidornis rushiae*), som tidigare klassats som okänd familjetillhörighet, bildar den nya familjen **hylior** (*Hyliidae*).

Övriga justeringar

Klippmarkkrypare korrigeras till **chilemarkkrypare** (*Ochetorhynchus melanurus*), pga. konflikt med klippmarkkrypare (*Ochetorhynchus andaecola*).

Rödstjärtad uppnäbb ändras till **rödstjärtad trädlopä** (*Microxenops milleri*), då den inte tillhör uppnäbbarna i släktet *Xenops*.

Svavelstrupig taggstjärt ändras till **svavelstrupig sumpjägar** (*Cranioleuca sulphurifera*), då den inte tillhör taggstjärtarna, utan visat sig vara nära släkt med sumpjägar (*Limnoides rectirostris*), vars namn samtidigt specificeras till **långnäbbad sumpjägar**.

Rostryggig sibia ändras till **rostryggig minla** (*Leioptila annectens*) för att bättre reflektera artens släktskap, då den inte hör till samma grupp som övriga sibior i släktet *Heterophasia*.

Svart fnittertrast och nakenhuvad fnittertrast justeras till **svarttimalia** (*Garrulax lugubris*) och **nakenhuvad timalia** (*Garrulax calvus*), då en ny genetisk studie visat att de inte tillhör

familjen fnittertrastar (*Leiothrichidae*) utan bör flyttas till familjen timalior (*Timaliidae*), där de utgör en egen gren, syster till sabeltimaliorna i släktet *Pomatorhinus*.

Övriga justeringar:

- humefasan (v. 9, Humes fasan)
- swinhoerall (v. 9, Swinhoes rall)
- sundapurpurhöna (v. 9, sydöstasiatisk purpurhöna)
- solfjäderspapegoja (v. 9, solfjäderspapegoja)
- svartseglare (v. 9, svart seglare)
- kapseglare (v. 9, afrikansk svartseglare)
- västlig borstsmyg (v. 9, västborstsmyg)
- brun sångsmyg (v. 9, brunsångsmyg)
- solfjädersångsmyg (v. 9, solfjädersångsmyg)
- svartmonark (v. 9, svart monark)
- solfjädersgräsfågel (v. 9, afrikansk gräsfågel)
- kachartimalia (v. 9, cachartimalia)
- veracruzgårdsmyg (v. 9, rostnackad gårdsmyg)
- zappeyflugsnappare (v. 9, Zappeys flugsnappare)
- bruntangara (v. 9, brun tangara)

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund och Tommy Tyrberg, Tk, 14 juli 2019.

Namnlistan, version 9



En av nyheterna i IOC:s lista är att timorspökuggla (bilden) splittas från australisk spökuggla.
Foto: Markus Lagerqvist.

Version 9 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 9.1 (januari 2019).

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Australisk spökuggla (*Ninox boobook*) delas upp i fyra arter:
 - australisk spökuggla (*P. boobook*), som förekommer i Australien, på södra New Guinea, Kaiöarna och ytterligare några mindre öar i sydöstra Indonesien.
 - **timorspökuggla** (*N. fusca*), från Timor.

- **rotespökuggla** (*N. rotiensis*), från Rote sydväst om Timor.
- **alorspökuggla** (*N. plesseni*), från Alor, norr om Timor.
- Buruspökuggla (*Ninox squamipila*) delas upp i två arter:
 - **seramspökuggla** (*N. squamipila*), endemisk för Seram.
 - **buruspökuggla** (*N. hantu*), endemisk för Buru.
- Gråbröstad sabelvinge (*Campylopterus largipennis*) delas upp i två arter:
 - gråbröstad sabelvinge (*Campylopterus largipennis*), som förekommer i Amazonasbäckenet från östra Colombia till sydöstra Brasilien.
 - **karstsabelvinge** (*C. calcirupicola*), med en mycket begränsad förekomst i karstområdena i Minas Gerais i sydöstra Brasilien.
- Vitstjärtad kolibri (*Urochroa bougueri*) delas upp i två arter:
 - **Bouguers kolibri** (*U. bougueri*), från sydvästra Colombia till nordvästra Ecuador.
 - **vitstjärtad kolibri** (*U. leucura*), i södra Colombia, östra Ecuador och nordöstra Peru
- Klipplöpare flyttas till markkryporna i släktet *Ochetorhynchus* och namnet justeras till **klippmarkkrypare** (*Ochetorhynchus melanurus*).
- Gulstrupig lövletare (*Automolus ochrolaemus*) delas upp i två arter:
 - gulstrupig lövletare (*A. ochrolaemus*), med en vidspridd förekomst från södra Mexiko till nordöstra Bolivia.
 - **chiriquílövletare** (*A. exsertus*), från sydvästra Costa Rica till västra Panama. Chiriquí är en provins i västra Panama.
- Trastmyrpitta (*Myrmothera campanisona*) delas upp i två arter:
 - trastmyrpitta (*M. campanisona*), från stora delar av Amazonasbäckenet
 - **tapajósmyrpitta** (*M. subcanescens*), begränsad till brasilianska Amazonas söder om Amazonfloden, från Río Madeira österut till den högra banken av nedre Río Tapajós söderut till Rondônia.
- Rostbandad myrpitta (*Grallaricula ferrugineipectus*) delas upp i två arter:
 - rostbandad myrpitta (*G. ferrugineipectus*), från norra Venezuela till östra Colombia.
 - **leymebambamyrpitta** (*Grallaricula leyme bambae*), från Peru och västra Bolivia. Uppkallad efter det peruanska distriktet Leymebamba, varifrån den först beskrevs.
- Vitbrynad busksmyg (*Sericornis frontalis*) delas upp i två arter:
 - vitbrynad busksmyg (*S. frontalis*), från västra, södra och östra Australien.
 - **fläckbusksmyg** (*S. maculatus*), från södra och sydvästra Australien.
- Bergbusktörnskata (*Laniarius poensis*) delas upp i två arter:
 - **kamerunbusktörnskata** (*L. poensis*), som huvudsakligen förekommer i bergen i sydvästra Kamerun, men även i allra östligaste Nigeria och på ön Bioko i Guineabukten.
 - **albertinebusktörnskata** (*Laniarius holomelas*), från bergen kring Albertineriften i östra Kongo-Kinshasa, Uganda, Rwanda och Burundi
- Rödögd vireo (*Vireo olivaceus*) delas upp i två arter:

- rödögd vireo (*V. olivaceus*), som häckar i Kanada och USA, men övervintrar i Sydamerika.
- **chivivireo** (*V. chivi*), som förekommer över stora delar av Sydamerika. Namnet chivi är onomatopoetiskt.
- Tvärstjärtad drongo (*Dicrurus ludwigii*) delas upp i tre arter:
 - tvärstjärtad drongo (*D. ludwigii*), förekommer över stora delar av östra och södra Afrika, från södra Somalia till Sydafrika.
 - **västafrikansk drongo** (*D. occidentalis*), förekommer i västra Afrika, från Senegal till Nigeria, väster om floden Niger.
 - **sharpedrongo** (*D. sharpei*), förekommer från södra Sudan och västra Kenya västerut till öster om floden Niger och söderut till nordvästra Angola.
- Klykstjärtad drongo (*Dicrurus adsimilis*), delas upp i två arter:
 - klykstjärtad drongo (*D. adsimilis*), i centrala, östra och södra Afrika.
 - **saheldrongo** (*D. divaricatus*), som förekommer i ett bälte genom sahel- och savannområdena från södra Mauretanien österut till norra Somalia.
- Sammetsdrongo (*Dicrurus modestus*) delas upp i två arter:
 - sammetsdrongo (*D. modestus*), i västra och centrala Afrika.
 - **fantidrongo** (*D. atactus*), från Sierra Leone österut till sydvästra Nigeria. Namnet kommer av fantispråket/-folket, även stavat fante.
- Blanfordlärka (*Calandrella blanfordi*) delas upp i två arter:
 - blanfordlärka (*C. blanfordi*), i Eritrea och Etiopien.
 - **brunkronad lärka** (*C. eremica*), på sydvästra Arabiska halvön och Somaliland.
- Stora förändringar har skett bland vad som tidigare var följande fem asiatiska arter av glasögonfåglar; bergglasögonfågel (*Zosterops montanus*), everettglasögonfågel (*Z. everetti*), indisk glasögonfågel (*Z. palpebrosus*), japansk glasögonfågel (*Z. japonicus*) och engganoglasögonfågel (*Z. salvadorii*). Det nya arrangemanget är:
 - **sångglasögonfågel** (*Z. japonicus*), en sammanslagning av den tidigare arten japansk glasögonfågel, med de flesta raser som tidigare fördes till arten bergglasögonfågel, vilket innebär att arten numera förekommer från Sachalin och Japan, söderut till Filippinerna och stora delar av Indonesien.
 - **swinhoeglasögonfågel** (*Z. simplex*), en sammanslagning av några raser av japansk glasögonfågel, indisk glasögonfågel och engganoglasögonfågel, som förekommer i östra Kina, Taiwan, Thailand, Kambodja, Malackahalvön, Borneo, Sumatra och Enggano.
 - **humeglasögonfågel** (*Z. auriventer*), en sammanslagning av några raser av everettglasögonfågel och indisk glasögonfågel, som förekommer i sydöstra Burma, södra Thailand, Malackahalvön och Borneo. Det innebär också att everettglasögonfågel numera är endemisk för Filippinerna.
 - indisk glasögonfågel (*Z. palpebrosus*), efter att flera raser numera förs till andra arter förekommer arten numera från Afghanistan österut till Vietnam.
 - **sangkarglasögonfågel** (*Z. melanurus*), består av ett par raser som tidigare fördes till indisk glasögonfågel vilka förekommer på Bali och Java.
- Abessinsk glasögonfågel (*Zosterops abyssinicus*) delas upp i tre arter:

- abessinsk glasögonfågel (*Z. abyssinicus*), från nordöstra Sudan, Eritrea, Etiopien och södra Arabiska halvön.
- **sokotraglasögonfågel** (*Z. socotranus*), endemisk för ön Sokotra.
- **kenyaglasögonfågel** (*Z. flavilateralis*), som förekommer från centrala och östra Kenya till östra Tanzania.
- Högländsglasögonfågel (*Zosterops poliogastrus*) delas upp i två arter:
 - **heuglinglasögonfågel** (*Z. poliogastrus*), i sydöstra Sudan, Eritrea, Etiopien och Mt. Kulal i norra Kenya.
 - **mbuluglasögonfågel** (*Z. mbuluensis*), från södra Kenya och norra Tanzania. Namnet kommer från distriktet Mbulu i norra Tanzania.
 - **pareglasögonfågel** (*Z. winifredae*), endemisk för Södra Pare-bergen i norra Tanzania.
 - **kilimanjaroglasögonfågel** (*Z. eurycricotus*), från nordöstra Tanzania, bl.a. Mt. Kilimajaro och Mt. Meru.
- Madagaskarglasögonfågel (*Zosterops maderaspatanus*) delas upp i två arter:
 - madagaskarglasögonfågel (*Z. maderaspatanus*), från Madagaskar, Komorerna och sydvästra Seychellerna.
 - **aldabraglasögonfågel** (*Z. aldabrensis*), endemisk för Aldabraöarna i Seychellerna.
- Afrikansk glasögonfågel (*Zosterops senegalensis*), delas upp i två arter:
 - afrikansk glasögonfågel (*Z. senegalensis*), vidspriidd över stora delar av Afrika, från Mauretanien österut till Kenya och söderut till centrala Angola.
 - **anderssonglasögonfågel** (*Z. anderssoni*), från södra Afrika, söder om en linje från östra Angola västerut till östra Tanzania. Uppkallad efter den svenske upptäcktsresanden Karl Johan Andersson (1827–1867).
 - **grön glasögonfågel** (*Z. stuhlmanni*), som förekommer i östra Kongo-Kinshasa, Uganda och nordvästra Tanzania.
- Långnäbbad knottsmyg (*Ramphocaenus melanurus*) delas upp i två arter, som bäst skiljs åt på lätet:
 - **drillknottsmyg** (*R. melanurus*), som förekommer över ett stort område från sydöstra Mexiko till östcentrala Brasilien.
 - **tjatterknottsmyg** (*R. sticturus*) som förekommer i Amazonasbäckenet i sydcentrala Brasilien, östra Peru och norra Bolivia.
- Blå kortvinge (*Brachypteryx montana*) delas upp i fyra arter:
 - **himalayakortvinge** (*B. cruralis*), som förekommer från centrala Himalaya österut till norra Indokina.
 - **kinesisk kortvinge** (*B. sinensis*), från sydöstra Kina.
 - **taiwankortvinge** (*B. goodfellowi*), endemisk för Taiwan.
 - blå kortvinge (*B. montana*), som förekommer i Filippinerna, Stora Sundaöarna och på Flores. Arten behåller tills vidare namnet blå kortvinge då fler splittar är att vänta bland de elva kvarvarande raserna.
- Costaricatangara (*Ramphocelus costaricensis*) lumpas med rödgumpad tangara (*R. passerinii*). Den sammanslagna arter behåller namnet rödgumpad tangara (*R. passerinii*).

En nyligen beskriven art tillkommer:

- **Rotesångare** (*Phylloscopus rotiensis*), från ön Rote sydväst om Timor.

Övriga justeringar

Nymfparakit (*Nymphicus hollandicus*) byter namn till **nymfkakadua**, då arten tillhör familjen kakaduor (*Cacatuidae*) och inte är en parakit. Samtliga övriga arter i familjen heter kakadua. Tk har hittills avvaktat med detta namnbyte då namnet nymfparakit är väletablerat då den är en vanlig burfågel, men genomför nu bytet då namnet nymfkakadua börjat etablera sig även i burfågelkretsar. Motsvarande justering har tidigare gjorts på bl.a. norska (nymfekakadu), finska (neitokakadu), italienska (cacatua ninfa) och spanska (cacatúa ninfa).

Ceylonskriktrast korrigeras till **gråhuvad skriktrast** (*Argya cinereifrons*), pga. konflikt med ceylonskriktrast (*Argya rufescens*).

I samband med att *Saxicola stejnegeri* får artstatus även på Tk:s Västpalearktislista får den det svenska namnet **amurbuskskvätta** (tidigare Stejnegers buskskvätta) då en stor del av artens utbredningsområde ligger inom Amurflodens avrinningsområde.

Markus Lagerqvist, Erling Jirle och Tommy Tyrberg, Tk, 1 april 2019.

Namnlistan, version 8



Rotemyzomela – en av tre nyligen beskrivna arter i version 8.2 av IOC:s världslista. Foto: Markus Lagerqvist.

Version 8 av listan över svenska namn innehåller ändringar föranledda av nya taxonomiska rön och förändringar i IOC:s världslista version 8.2 (juni 2018).

- Colombiaskrikuv (*Megascops colombianus*) och rotskrikuv (*M. ingens*) slås samman till en art. Den nya arten behåller namnet rotskrikuv (*M. ingens*).
- Naposkrikuv (*Megascops napensis*) och roraimaskrikuv (*M. roraimae*) slås samman till en art. Eftersom de båda tidigare artnamnen beskriver respektive tidigare arts utbredning får den sammanslagna arten namnet det nya namnet **bergskrikuv** (*M. roraimae*).
- En ny art av skrikuv har beskrivits; **santamartaskrikuv** (*Megascops gilesi*), från bergskedjan Sierra Nevada de Santa Marta i norra Colombia.
- Ecuadortaggstjärt (*Cranioleuca antisiensis*) och bergtaggstjärt (*C. baroni*) slås samman till en art. Den nya arten behåller namnet **bergtaggstjärt** (*C. antisiensis*).

- Rödbrun myrtörnskata (*Thamnistes anabatinus*) delas upp i två arter:
 - rödbrun myrtörnskata (*T. anabatinus*), från sydöstra Mexiko till centrala Bolivia, och;
 - **rostbrun myrtörnskata** (*T. rufescens*), från östra Peru till västra Bolivia.
- Nya studier visar att strimmanakinerna som tidigare betraktades som en art, består av tre arter:
 - **kungsfågelmanakin** (*Machaeropterus regulus*), från atlantregnskogarna i sydöstra Brasilien;
 - **strimmanakin** (*M. striolatus*), från de västra och nordvästra delarna av Amazonasbäckenet, och;
 - den nyligen beskrivna arten **brokmanakin** (*M. eckelberryi*), som finns i ett litet område i Cordillera Azul och övre Rio Mayo-dalen – huvudsakligen på över 500 m höjd – i departementen San Martín och Loreto i norra Peru;
- Gråtofsad snärtfågel (*Psophodes nigrogularis*) delas upp i två arter:
 - **västlig snärtfågel** (*P. nigrogularis*), från Western Australia, och;
 - **malleesnärtfågel** (*P. leucogaster*), som förekommer i mallee (lågvoxen busk- och skogsmark med flerstammiga eucalyptusträd) i sydcentrala Australien.
- **Rotemyzomela** (*Myzomela irianawidodoae*), från ön Rote i Indonesien, har beskrivits som ny art.
- En omfattande genetisk studie av familjen gråfåglar (*Campephagidae*) föranleder att sex arter som tidigare tillhörde gråfågarna i släktet *Coracina*, flyttas till drillfågarna i släktet *Lalage*, varför deras namn justeras till **svartvingad drillfågel** (*L. melaschistos*), **svarthuvad drillfågel** (*L. melanoptera*), **indokinesisk drillfågel** (*L. polioptera*), **sundadrillfågel** (*L. fimbriata*), **mauritiusrillfågel** (*L. typica*) och **réuniondrillfågel** (*L. newtoni*).
- Cikadagråfågel delas upp i två arter:
 - cikadagråfågel (*Edolisoma tenuirostre*), vidspriidd från Sulawesi till sydöstra Australien.
 - **amiralitetsgråfågel** (*Edolisoma admiralitatis*), från Amiralitetsöarna norr om Nya Guinea.
- Sulawesisolfjäderstjärt (*Rhipidura teysmanni*), delas upp i två arter:
 - sulawesisolfjäderstjärt (*R. teysmanni*), från Sulawesi, och;
 - **taliabusolfjäderstjärt** (*R. sulaensis*), från ön Taliabu öster om Sulawesi.
- Artgränserna inom varfågelkomplexet justeras ytterligare genom att ökenvarfågel (*Lanius meridionalis*) slås samman med varfågel (*L. excubitor*). Samtidigt ges rasen *meridionalis* artstatus som en monotypisk art. Detta innebär att IOC delar in varfågelkomplexet i följande fyra arter:
 - beringvarfågel (*L. borealis*)
 - varfågel (*L. excubitor*)
 - saxaulvarfågel (*L. pallidirostris*)
 - **iberisk varfågel** (*L. meridionalis*)
- Skata (*Pica pica*) delas upp i fem arter:
 - **skata** (*P. pica*), i norra Eurasien från Brittiska öarna och Västeuropa till östra Sibirien;

- **maghrebskata** (*P. mauritanica*), från nordvästra Afrika;
- **asirskata** (*P. asirensis*), från Asirbergen i sydvästra Saudiarabien;
- **svartgumpad skata** (*P. bottanensis*), från centrala Bhutan och västcentrala Kina (Qinghai och västra Sichuan söderut till södra och östra Autonoma regionen Tibet), och;
- **orientalkata** (*P. serica*), från sydöstra Ryssland och Burma till östra Kina, Taiwan och norra Indokina.
- Kragparadisfågel (*Lophorina superba*) delas upp i tre arter:
 - **större kragparadisfågel** (*L. superba*), stora delar av Nya Guinea;
 - **vogelkopkragparadisfågel** (*L. niedda*), Birds Neck och Vogelkophalvön, Västpapua, och;
 - **mindre kragparadisfågel** (*L. minor*), från Papuan Peninsula västerut åtminstone till Wharton Range, Papua Nya Guinea.
- En omfattande genetisk studie av familjen gräsfåglar (*Locustellidae*) visar att flertalet arter tillhör två huvudgrenar; ”smygsångare”, resp. ”gräsfåglar”. Till smygsångarna hör 26 arter i de två släktena *Helopsaltes* och *Locustella*, medan gräsfåglarna består av 34 arter fördelade på åtta släkten (bl.a. *Bradypterus*, *Poodytes* och *Cincloramphus*). Studien leder till att ett antal arter får ny släktestillhörighet och föranleder några namnändringar:
 - Namnen på fyra arter i släktet *Helopsaltes* förtydligas till smygsångare; **graysmygsångare** (*Helopsaltes fasciolatus*), **kilstjärtad smygsångare** (*Helopsaltes pryeri*), **koreasmygsångare** (*Helopsaltes pleskei*) och **ochotsksmygsångare** (*Helopsaltes ochotensis*). Fyra mycket väletablerade svenska namn ändras inte trots att de tillhör ”smygsångarna” (träksångare, starrsångare, flodsångare och vassångare).
 - Brun lärksångare justeras till **sothgräsfågel** (*Cincloramphus cruralis*) och rostlärksångare till **rostgumpad gräsfågel** (*C. mathewsi*)
 - Ceylonsmygsångare justeras till **ceylongräsfågel** (*Elaphrornis palliseri*)
 - Namnet på elva arter i släktet *Bradypterus* ändas från smygsångare till gräsfågel; **knysnagräsfågel** (*B. sylvaticus*), **bangwagräsfågel** (*B. bangwaensis*), **natalgräsfågel** (*B. barratti*), **skogsgräsfågel** (*B. lopezi*), **kanelsgräsfågel** (*B. cinnamomeus*), **stråstjärtad gräsfågel** (*B. brunneus*), **djagräsfågel** (*B. grandis*), **sumpgräsfågel** (*B. baboecala*), **vitvingad gräsfågel** (*B. carpalis*), **albertinegräsfågel** (*B. graueri*) och **berggräsfågel** (*B. centralis*).
- En omfattande genetisk studie av familjen fnittertrastar (*Leiothrichidae*) föranleder några namnändringar:
 - ceylonfnittertrast justeras till **ceylonskriktrast** (*Garrulax cinereifrons*)
 - blåstjärtad siva justeras till **blåstjärtad bandvinge** (*Minla cyanouroptera*)
 - rostkronad minla justeras till **rostkronad bandvinge** (*Minla cyanouroptera*)
 - annamsibia justeras till **annamkrokia** (*Crociopsis langbianis*) och javasibia till **javakrokia** (*C. albonotatus*). Det vetenskapliga namnet kommer ur det grekiska ordet krokias, som betyder saffransfärgad sten.
- Sulaflugsnappare (*Cyornis colonus*) delas upp i två arter:
 - sulaflugsnappare (*C. colonus*), från Sulaöarna öster om Sulawesi, och;
 - **banggaiflugsnappare** (*C. pelingensis*), från Banggaiöarna öster om Sulawesi.

- Vithalsad fröfink (*Sporophila torqueola*) delas upp i två arter:
 - **kanelgumpad fröfink** (*S. torqueola*), från västra Mexiko, och;
 - **vithalsad fröfink** (*S. morelleti*), som förekommer från södra Texas, söderut till Panama;

Övriga justeringar:

- djungeluggla (v. 7, blewittuggla)
- lärksnårlöpare (v. 7, lärklik snårlöpare)

Markus Lagerqvist och Erling Jirle, Tk, 3 juli 2018.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar i IOC v. 7.2, 7.3 och 8.1 som påverkar version 7 av Namnlistan.

- Rostkindad frankolin (*Pternistis castaneicollis*) delas upp i två arter:
 - rostkindad frankolin (*P. castaneicollis*), som förekommer i Etiopien och Somaliland (norra Somalia);
 - **svartpannad frankolin** (*P. atrifrons*), som förekommer i ett mindre område på gränsen mellan södra Etiopien och norra Kenya.
- Rödbrostad kronduva (*Goura scheepmakeri*) delas upp i två arter:
 - **scheepmakerkronduva** (*G. scheepmakeri*), från sydöstra Nya Guinea;
 - **sclaterkronduva** (*G. sclaterii*), från sydcentrala Nya Guinea.
- Glanssalangan (*Collocalia esculenta*) delas upp i hela åtta arter:
 - **fjäderfotssalangan** (*C. affinis*), från bl.a. Andamanerna, Nikobarerna, Malackahalvön, Sumatra och Borneo;
 - **julösalangan** (*C. natalis*), endemisk för Julön;
 - **bergsryggssalangan** (*C. isonota*), från norra Luzon, Mindoro, Mindanao och Suluarkipelagen i Filippinerna;
 - **grågumpssalangan** (*C. marginata*), från Babuyan, Calayan, Camiguin, centrala–södra Luzon, västra Visayaöarna och Palawan i Filippinerna;
 - **tenggarasalangan** (*C. sumbawae*), från västra Små Sundaöarna (bl.a. Lombok, Sumbawa, Flores och Sumba), på indonesiska Nusa Tenggara;
 - **timorsalangan** (*C. neglecta*), från östra Små Sundaöarna (bl.a. Timor, Alor och Wetar);
 - glanssalangan (*C. esculenta*), som förekommer från Sulawesi österut till Salomonöarna;
 - **satängsalangan** (*C. uropygialis*), från Santa Cruz-öarna, Vanuatu, Loyautéöarna och Nya Kaledonien.
- Tornuggla (*Tyto alba*) delas upp i två arter:
 - tornuggla (*T. alba*), i Europa, Mellanöstern och Afrika;
 - **amerikansk tornuggla** (*T. furcata*), i Nord- och Sydamerika.
- Archbolds uggleskärra (*Aegotheles archboldi*) stryks från listan, *archboldi* räknas numera som en underart av berguggleskärra (*Aegotheles albertsi*).
- Stålblåbukig smaragd (*Amazilia saucerottei*) delas upp i två arter:
 - stålblåbukig smaragd (*A. saucerottei*), som förekommer i Colombia och Venezuela;
 - **hoffmannsmaragd** (*A. hoffmanni*), från Nicaragua och Costa Rica.

- Flaggkolibri (*Ocreatus underwoodii*) delas upp i tre arter:
 - **vittosad flaggkolibri** (*O. underwoodii*), som förekommer från norra Venezuela till västra Ecuador;
 - **peruflaggkolibri** (*O. peruanus*), som förekommer från östra Ecuador till nordöstra Peru;
 - **boliviaflaggkolibri** (*O. addae*), från centrala Peru och Bolivia.
- Thayertrut (*Larus thayeri*) stryks från listan, *thayeri* räknas numera som en underart av vitvingad trut (*Larus glaucoides*).
- Rödkronad parakit (*Psittacara wagleri*) delas upp i två arter:
 - rödkronad parakit (*P. wagleri*), från Colombia och Venezuela;
 - **kordiljärparakit** (*P. frontatus*), från Kordiljéerna i Peru.
- Zusikolibri (*Helianthus zusii*) stryks då genetiska studier av det enda kända exemplaret visat att det är av hybridursprung.
- Brokblåsmyg (*Malurus lamberti*) delas upp i två arter:
 - purpurryggig blåsmyg (*Malurus assimilis*), i västra och centrala Australien;
 - brokblåsmyg (*Malurus lamberti*), i sydöstra Australien.
- Silkesstjärt (*Lamprolia victoriae*) delas upp i två arter:
 - taveunisilkesstjärt (*L. victoriae*), endemisk för Taveuni i Fijiöarna;
 - **natewasilkesstjärt** (*L. klinesmithi*), endem som bara finns på Natewahalvön på Vanua Levi i Fijiöarna.
- Olivbulbyl (*Iole viridescens*) delas upp i två arter:
 - olivbulbyl (*I. viridescens*), från Burma, Thailand och Malackahalvön;
 - **kacharbulbyl** (*I. cacharensis*), från nordöstra Indien och östra/sydöstra Bangladesh. Artens namn anspelar på det gamla kungadöme som fanns i området fram till det införlivades i Brittiska Indien.
- Ockragumpad bulbyl (*Iole crypta*) delas upp i två arter:
 - ockragumpad bulbyl (*I. crypta*), från Burma, Thailand, Malackahalvön och Sumatra;
 - **charlottebulbyl** (*I. charlottae*), från Borneo.
- Liberisk grönbulbyl (*Phyllastrephus leucolepis*) stryks då den visat sig vara en färgvariant av citrongrönbulbyl.
- Varfågel (*Lanius excubitor*) delas upp i två arter:
 - varfågel (*L. excubitor*), som förekommer från norra Europa österut till centrala Ryssland (underarterna *excubitor* och *homeyeri*);
 - **beringvarfågel** (*L. borealis*), som förekommer både på den asiatiska och den amerikanska sidan om Berings sund, från sydcentrala Ryssland och Kazakstan till Alaska och Kanada (underarterna *bianchii*, *mollis*, *funereus*, *sibiricus* och *borealis*).
- Miombosolfågel (*Cinnyris manoensis*), delas upp i två arter:
 - **västlig miombosolfågel** (*Cinnyris gertrudis*);
 - **östlig miombosolfågel** (*Cinnyris manoensis*).
- Angolasolfågel (*Cinnyris ludovicensis*) delas upp i två arter:
 - angolasolfågel (*C. ludovicensis*), endemisk för Angola;
 - **whytesolfågel** (*C. whytei*), från Zambia, Malawi och Tanzania.
- Gulbröstad skogstrast (*Catharus dryas*) delas upp i två arter:
 - **gouldskogstrast** (*Catharus dryas*), som förekommer från södra Mexiko, söderut till Nicaragua;
 - **sclaterskogstrast** (*Catharus maculatus*), som förekommer i Anderna i Sydamerika, från västra Venezuela till norra Argentina.
- Nilgirifnittertrast (*Montecincla cachinnans*) delas upp i två arter:
 - nilgirifnittertrast (*M. cachinnans*), förekommer i Nilgiriberget i västra Tamil Nadu och nordöstra Kerala i sydvästra Indien;

- **banasurafnittertrast** (*M. jerdoni*), förekommer i sydvästra Karnataka och nordöstra Kerala (bl.a. Banasura Peak) i sydvästra Indien.
- Keralafnittertrast (*Montecincla fairbanki*) delas upp i två arter:
 - **palanifnittertrast** (*M. fairbanki*), förekommer i södra Västra Ghats, i sydöstra Kerala och sydvästra Tamil Nadu (bl.a. Palani Hills), i sydvästra Indien;
 - **ashambufnittertrast** (*M. meridionale*), förekommer i sydligaste Kerala och Tamil Nadu (bl.a. Ashambu Hills) i sydligaste Indien.
- Mindre korsnäbb (*Loxia curvirostra*), delas upp i två arter:
 - mindre korsnäbb (*Loxia curvirostra*);
 - **cassiakorsnäbb** (*L. sinesciurus*), som endast förekommer i Cassia County och troligen även delar av angränsande Twin Falls County i sydligaste Idaho.
- Gråsiska (*Acanthis flammea*) delas – i avvaktan på ytterligare studier i komplexet – upp i två arter:
 - gråsiska (*A. flammea*);
 - **brunsiska** (*A. cabaret*).
- Gräspiplärka (*Anthus lutescens*) delas upp i två arter:
 - gräspiplärka (*A. lutescens*), som finns stora delar av Sydamerika;
 - **perupiplärka** (*A. peruvianus*), som förekommer längs Perus västkust, söderut till nordligaste Chile.
- Kortnäbbad piplärka (*Anthus brevirostris*) delas upp i:
 - kortnäbbad piplärka (*A. furcatus*) som förekommer i tempererade gräsmarker i lågländerna i Argentina, Uruguay och sydöstra Brasilien;
 - **punapiplärka** (*A. brevirostris*) som förekommer i punagräsmarker upp till 4 300 meters höjd från centrala Peru, genom Bolivia till nordvästligaste Argentina.
- Gulögd junco (*Junco phaeonotus*) delas upp i två arter:
 - gulögd junco (*J. phaeonotus*), som förekommer från södra Arizona, söderut till Guatemala;
 - **californiajunco** (*J. bairdi*), endemisk för sydligaste Baja California.

Två nyligen beskrivna arter tillkommer:

- **Gråbrynad myrfågel** (*Myrmoderus eowilsoni*), från Cordillera Azul i norra Peru.
- **Tatamátapakul** (*Scytalopus alvarezlopezi*), från västra Anderna i Colombia; arten är uppkallad efter berget Cerro Tatamá.

Tre numera utdöda arter läggs till huvudlistan:

- **bermudavråk** (*Bermuteo avivorus*).
- **norfolkmarkduva** (*Alopecoenas norfolkensis*).
- **bermudaspett** (*Colaptes oceanicus*).

Familjer

Flera nya familjer tillkommer, framför allt som en följd av genetiska studier av superfamiljen Passeriodea. De nya familjerna är:

- **Sångtangaror** (Phaenicophilidae). Fyra arter som alla förekommer på Hispaniola.
- **Snårtangaror** (Calyptophilidae). Två arter, även denna familj är endemisk för Hispaniola.
- **Puertoricotangaror** (Nesospingidae). Monotypisk familj, som endast består av puertoricotangaran, endemisk för Puerto Rico.
- **Trasttangaror** (Rhodinocichlidae). Monotypisk familj, som endast består av trasttangaran, som förekommer från Mexiko till Venezuela.
- **Falsktangaror** (Mitrospingidae). Fyra huvudsakligen sydamerikanska arter.

- **Kubasångare** (Teretistridae). Två arter som båda förekommer i Kuba.
- **Zeledonior** (Zeledoniidae). Monotypisk familj, som endast består av zeledonian, som förekommer i Costa Rica och Panama.
- **Ikterior** (Icteriidae). Monotypisk familj, som endast består av den nordameriska arten gulbröstad ikteria. OBS! Ej ett förväxla med familjen Icteridae (trupialer)!
- **Spindalior** (Spindalidae), består av fyra karibiska arter, för vilka det svenska namnet justeras från spindalis till spindalia för att bättre passa svenskt böjningsmönster.
- **Amerikanska sparvar** (Passerellidae), består av de amerikanska arter som tidigare fördes till fältsparvarna (Emberizidae).

Övriga justeringar

- Sydlig brunand (*Netta erythrophthalma*) byter namn till **sammetsand**, då den inte tillhör samma släkte som brunand (*Aythya*).
- Madagaskarbrunand (*Aythya innotata*) byter namn till **madagaskardyland** då den troligen står närmare t.ex. australisk dyland och amurdyland än brunand.
- Uppdelningen av rallarna i två familjer (*Sarothruridae* och *Rallidae*) fick som konsekvens att ”skogsrallar” används som beteckning på två olika släkten i skilda familjer; *Canirallus* i *Sarothruridae* och *Aramides* i *Rallidae*. För att undvika detta begränsas skogsrall till de två arterna i *Canirallus*, medan arterna i *Rallidae* – som hör till de ”egentliga” rallarna framöver endast kallas ”rall”. Detta medför följande justeringar:
 - **grånackad rall** (v. 6, mindre skogsrall)
 - **rödhalsad rall** (v. 6, rödhalsad skogsrall)
 - **gråhalsad rall** (v. 6, gråhalsad skogsrall)
 - **centralamerikansk rall** (v. 6, centralamerikansk skogsrall)
 - **brunrall** (v. 6, brun skogsrall)
 - **ipécaharall** (v. 6, jätteskogsrall)
 - **saracúrarall** (v. 6, gråbröstad skogsrall)
 - **rödvingad rall** (v. 6, rödvingad skogsrall)
- Svartbandad rall (*Laterallus fasciatus*) justeras till **svartbandad dvärrall** för att spegla artens tillhörighet till dvärrallarna.
- För att bättre spegla släkestillhörigheten justeras några namn bland hönsfåglarna:
 - **långnäbbshöna** (v. 6, långnäbbad skogshöna)
 - **dulithöna** (v. 6, Hoses skogshöna)
 - **svarthöna** (v. 6, svart skogshöna)
 - **madagaskarvaktel** (v. 6, madagaskarhöna)
 - **papuavaktel** (v. 6, papuaberghöna)
 - **rosthöna** (v. 6, rostskogshöna)
 - **blodhöna** (v. 6, rödhuvad skogshöna)
- Newells lira (*Puffinus newelli*) justeras till **hawaiiilira**, då den efter splitten av rapalira (*Puffinus myrtae*) numera är endemisk för Hawaiiöarna.
- Australisk skedstork (*Platalea regia*) byter namn till **kungsskedstork**, vilket den heter på de flesta andra språk.
- Praktnatthäger (*Gorsachius magnificus*) ändras till **prakthäger** då arten verkar stå närmare hägrarna i släktet *Egretta* än natthägerarna.
- Genetiska studier visar att de två arterna tofsduvökar inte är nära släkt med övriga arter i släktet *Accipiter*, varför namnen justeras till tofshökar; **orienttofshök** (v. 6, tofsduvhök) och **sulawesitofshök** (v. 6, sulawesiduvhök).
- De amerikanska markduvorna i släktena *Columbina*, *Claravis*, *Metriopelia* och *Uropeliakallas* framledes **sparvduvor** för att särskilja dem från de avlägset besläktade markduvorna i Gamla världen. *Columbina minuta* hette sedan tidigare sparvduva och får namnet

specificerat till **dvärgsparvduva**. Av samma anledning byter tjocknäbbad markduva (*Trugon terrestris*) namn till **gladiatorduva**.

- Australisk tornuggla (*Tyto javanica*) justeras till **östlig tornuggla** för att bättre spegla utbredningområdet som sträcker sig från Pakistan österut till Melanesien.
- Kragdvärguvar förenklas till dvärguvar, berör fem arter vilka får namnen **indisk dvärguv**, **kinesisk dvärguv**, **japansk dvärguv**, **sundadvärguv** och **filippindvärguv**.
- Papuahökuggla (*Uroglaux dimorpha*) ändras till **papuaspökuggla** för att spegla artens släktskap. Detta föranleder att papuaspökuggla (*Ninox theomacha*) samtidigt får det nya namnet **häxspökuggla**.
- Nacundanattskärre (*Chordeiles nacunda*) justeras till nacundafalknattskärre, för att harmoniera med övriga arter i släktet *Chordeiles*.
- Brokpipare (*Hoploxypterus cayanus*) ändra till **brokvipa** då arten står nära viporna (*Vanellus*), snarare än pipare.
- Bergpipare (*Charadrius montanus*) ändras till **präriepipare** för att bättre spegla den miljö arten faktiskt återfinns i.
- Skovelnäbbskungsfiskare (*Clytoceyx rex*) justeras till **skovelnäbbskokaburra**, då släktet *Clytoceyx* i en ny studie visat sig vara inbäddat i kokaburrorna (släktet *Dacelo*).
- De tre arter som har namnet dvärgkungsfiskare är inte släktmässigt nära varandra, och justeras till **dvärgkungsfiskare** (v. 6, afrikansk dvärgkungsfiskare), **orientkungsfiskare** (v. 6, orientalisk dvärgkungsfiskare) och **bronskungsfiskare** (v. 6, grön dvärgkungsfiskare).
- Större gråfiskare (*Megaceryle lugubris*) ändras till **tofskungsfiskare** då den inte tillhör samma släkte som gråfiskaren (*Ceryle*).
- Svartnäbbad tukan (*Ramphastos ambiguus*) justeras till **gulstrupig tukan**. Namnet svartstrupig tukan reserveras till underarten *ambiguus*.
- Blåvingad parakit (*Brotogeris tirica*) byter namn till **tiricaparakit** för att undvika förväxling med blåvingeparakit (*Neophema chrysostoma*).
- Namnen på de två papegojfamiljerna *Psittacidae* och *Psittaculidae* förenklas till **västpapegojor** och **östpapegojor** från tidigare "Afrikanska och amerikanska papegojor" respektive "Asiatiska och australiska papegojor". Tilläggas kan att båda familjerna förekommer i Afrika i ungefärligen lika hög grad.
- Portlincolnparakit (*Barnardius zonarius*) justeras till **ringparakit** (eng. Australian Ringneck). Namnet portlincolnparakit reserveras för underarten *zonarius* (Port Lincoln Ringneck), en av fyra distinkta underarter, som ibland splittas.
- Kastanjemussmyg (*Crateroscelis nigrorufa*) och origma (*Origma solitaria*) justeras till **kastenjebusksmyg** och **klippmussmyg** då de genetiskt visat sig tillhöra busksmygarna (*Sericornis*) respektive mussmygarna (*Crateroscelis*).
- Blek vattentyrann (*Ochthornis littoralis*) har visat sig inte stå nära de andra vattentyrannerna och får namnet **brinktyrann**.
- Pygmétyrannerna i släktena *Myiornis*, *Lophotriccus* och *Atalotriccus* är inbäddade bland todityrannerna och endast avlägset släkt med andra pygmétyranner, namnen justeras därför till todityrann och blir då **örontodityrann**, **vitbukig todityrann**, **svartkronad todityrann**, **stubbstjärtad todityrann**, **rosttofsad todityrann**, **långtofsad todityrann**, **tvåbandad todityrann**, **hjelmtodityrann** och **blekögd todityrann**. Namnet på *Hemitriccus griseipectus* justeras till **vitbröstad todityrann** (pga. konflikt med *albiventris*).
- Rostvingad piggstjärt (*Premnornis guttuliger*) har visat sig stå långt ifrån övriga piggstjärtar och är istället nära släkt med markkryparna i släktet *Tarphonomus*. Den får därför istället namnet **stamkrypare**, från det vetenskapliga namnet *Premnornis*.
- Roraimapiggstjärt (*Roraimia adusta*) och fläcktaggstjärt (*Craniroleuca gutturata*) tillhör samma klad som mjukstjärtar i släktet *Thripophaga* och justeras till **roraimamjukstjärt** och **fläckmjukstjärt**.

- Nakenhalsad fruktkråka (*Gymnoderus foetidus*) står inte nära de övriga tre fruktkråkorna och ändras till **nakenhalsad kotinga**.
- Gråstjärtad piha (*Snowornis subalaris*) och olivpiha (*S. cryptolophus*) ändras till **gråstjärtad kotinga** och **olivkotinga** då de står närmare andra kotingasläkten än pihorna i släktet *Lipaugus*.
- En ny studie har visat att de två silkessjärtarna och drongosolfjädersjärt (*Chaetorhynchus papuensis*) från Nya Guinea, vilka idag förs till familjen solfjädersstjärtar (*Rhipiduridae*), tillsammans med sangihemonarken (*Eutrichomyias rowleyi*) tillsammans utgör en reliktdiad av arter, som kan särskiljas till en egen familj; ”silkesstjärtar” (*Lamprolidae*). För att visa på det nära släktskapet justeras namnen på de två senare till **papuasilkessjärt** och **sangihesilkessjärt**.
- Klippsvala reserveras för arterna i släktet *Ptyonoprogne* (dit ”vår” klippsvala hör). Förledet ”klipp-” stryks från namnen på tre arter i släktet *Petrochelidon*; **rödstrupig svala**, **rödahavssvala** och **kapsvala**.
- De två arterna bärpickare i familjen *Paramythiidae* byter namn till **bärfåglar** för att undvika förväxling med bärpickarna i familjen *Melanocharitidae*. Familjenamnet ändras därmed också; från Mesbärpickare till **Bärfåglar**.
- Genetiska studier har visat att av vissa av arterna i släktet *Alcippe* inte är nära släkt med varandra, tio av arterna bör flyttas till familjen *Leiothrichidae*, medan övriga sju hör hemma i familjen *Pellorneidae* – dessa behöver flyttas till ett nytt släkte; *Schoeniparus*. Dessa sju står nära timaliorna i släktena *Gampsorhynchus* och *Malacopteron* och byter namn alla namn från alkippa till timalia. De nya namnen blir **gulpannad timalia**, **gulbröstad timalia**, **rostvingad timalia**, **langbiantimalia**, **rosthalsad timalia**, **bronskronad timalia** och **brunkronad timalia**.
- De tre släktena *Zosterornis*, *Dasycrotapha* och *Sterrhoptilus* som tidigare troddes vara timalior och idag heter trädtimaliror är inbäddade inom glasögonfåglarna och inte heller varandras närmaste släktingar, varför det är bättre att kalla dem glasögonfåglar. De nya namnen blir **brunmaskad glasögonfågel**, **luzongglasögonfågel**, **panayglasögonfågel**, **negrosglasögonfågel**, **pala wanglasögonfågel**, **praktglasögonfågel**, **mindanaoglasögonfågel**, **samarglasögonfågel**, **gulkronad glasögonfågel**, **svaratkronad glasögonfågel**, **rostkronad glasögonfågel**. Samt pga. namnkonflikt justeras av ytterligare tre namn till **goodfellowglasögonfågel** (*Lophozosterops goodfellowi*), **låglandsglasögonfågel** (*Zosterops meyeri*) och **svarthättad glasögonfågel** (*Zosterops atricapilla*).
- De fyra arter som tidigare fördes till släktet *Speirops* och även har det engelska/svenska namnet speirops är alla inbäddade i släktet *Zosterops* och inte heller varandras närmaste släktingar, de byter därför till glasögonfågel, som de övriga arterna i släktet och får då namnen **biokoglasögonfågel** (*Zosterops brunneus*), **kamerunglasögonfågel** (*Zosterops melanocephalus*), **silverglasögonfågel** (*Zosterops leucophaeus*), och **sotglasögonfågel** (*Zosterops lugubris*).
- Namnet på två lövsångararter förenklas; *Phylloscopus affinis* från alpingsångare till **alpsångare** (konsekvent med den nyligen beskrivna alptrasten) och *Phylloscopus subaffinis* från subalpin sångare till **lidsångare**.
- Gråvingad snårskvätta (*Cossypha polioptera*) har visat sig vara en akalat (släktet *Sheppardia*) och namnet justeras till **gråvingad akalat**.
- Goodfellows flugsnappare (*Vauriella goodfellowi*) justeras till **Goodfellows djungelflugsnappare** för att spegla nya rön om släktskapsförhållande bland flugsnapparna.
- Granlöpare (*Peucedramus taeniatus*) ändras till **tallsmyg**, då arten framför allt förekommer i tall- snarare än granskogar och ”-löpare” kan ge en felaktig bild av att

arten är markbunden (jämför med t.ex. ökenlöpare). Påverkar även namnet på familjen *Peucedramidae* som ändras till **tallsmyg**.

- Stresemanns rosenfink (*Carpodacus waltoni*) justeras till **aurorarosenfink**. Namnet Stresemanns rosenfink reserveras för underarten *eos*.
- Gulgumpad skogssångare (*Setophaga coronata*) justeras till **myrtensångare**. Namnet gulgumpad skogssångare reserveras för gulgumpad skogssångare i vid mening (dvs. inklusive *auduboni*, *nigrifrons* och *goldmani*).
- Rostbrynad (*Hemispingus rufosuperciliaris*) och gråryggig hemispingus (*H. goeringi*) justeras till **rostbrynad** resp. **skifferryggig sångfink** då de genetiskt visat sig vara inbäddade bland sångfinkarna i släktet *Poospiza*.
- Puertoricosångtangara (*Nesospingus speculiferus*) justeras till endast **puertoricotangara** då den först till en egen monotypisk familj skild från sångtangarorna.
- Kubansk sångtrupial (*Ptiloxena atroviolacea*) ändras till **violtrupial** då den inte tillhör samma släkte som sångtrupialen (*Dives*).
- Geografiska förled har justerats för konsekvens:
 - filippinsk till filippin-
 - kambodjansk till kambodja-
 - karibisk till karib-
 - kubansk till kuba-
 - malajisk till malaj-
 - mexiko- till mexikansk
 - nepalesisk till nepal-
 - nykaledonsk till nykaledonien-
 - nyzeeländsk till nyzeeland-
 - tasmansk till tasman-
 - tropisk till tropik-
- Några arter med patronymikon (dvs. namn som getts för att hedra en person) får enklare namn:
 - fläckörn (v. 6, ayresörn)
 - sahelormörn (v. 6, Beaudoins ormörn)
 - törnnattskärre (v. 6, Donaldson-Smiths nattskärre)
 - borstpapegoja (v. 6, Pesquets papegoja)
 - gulbröstad spettpapegoja (v. 6, Meeks spettpapegoja)
 - grön spettpapegoja (v. 6, Fischers spettpapegoja)
 - parámyrpitta (v. 6, Snethlages myrpitta)
 - sonettcistikola (v. 6, Levaillants cistikola)
- Ytterligare några namn med patronymikon har för att få mer lättanvända namn skrivits samman; taczanowskitinamo, mellerand, sauzierkricka, shelleyfrankolin, temmincktragopan, stejnegerpetrell, pinskerhökörn, wallacehökörn, gurneyörn, cassinörn, doriahök, cooperhök, meyerduvhök, böhmdunrall, lewinrall, jerdonökenlöpare, sjöstedtduva, fischerfruktduva, mackinlaygökduva, coquerelkoua, horsfieldglansgök, hodgsonhökgök, gurneydvärguv, sjöstedtsparvuggla, blewittuggla, köpckeskrikuv, hodgsongrodmun, blythgrodmun, gouldgrodmun, bennettuggleskärre, köpckeeremit, jourdanskogsjuvel, whiteheadtrogon, böhmbiätare, tickellnashornsfågel, austennashornsfågel, waldennashornsfågel, cassinhonungsvisare, wahlberghonungsvisare, zenkerhonungsvisare, buckleyskogsfalk, müllerpapegoja, lyallklippsmyg, whiteheadbrednäbb, grauerbrednäbb, ménétiesmyrsmyg, parkermyrfågel, oustaletdvärgtyrann, kämpfertodityrann, hudsonsottyrann, cassinkungstyrann, toddvisseltyrann, nuttingtopptyrann, zimmerflatnäbb, zimmerschifforn, wiedmanakin, willardbusktörnskata, füllebornbusktörnskata, turatibuskörnskata, petitnålfågel, blythbrokvireo, fischerfinklärka, temminckgrönbulbyl, cassingrönbulbyl, shelleygrönbulbyl, ansorgegrönbulbyl,

sjöstedtgrönbulbyl, prigoginegrönbulbyl, fischergrönbulbyl, xaviergrönbulbyl, sharpegrönbulbyl, baumanngrönbulbyl, hartertsångare, levaillantcistikola, gurneysockerfågel, sclatergårdsmyg, hildebrandtglandsstare, wallerglandsstare, fraserrostrast, finschrostrast, hodgsonrödstjært, hartertflugsnappare, jacksonvidafink, dybowskidroppastrild, jamesonamarant, sillemrosenfink.

- Ett antal tvåstaviga namn där förledet utgörs av en färg eller ett väderstreck har skrivits samman, dels för att namnen blir tydligare (brunrast eller brun rast), dels för att få namnbruket mer konsekvent; blådaknis, brunkivi, brunkricka, brunkroknäbb, brunlori, brunmesit, brunrävsparv, brunsrikrast, brunsprötsstjært, brunsångsmyg, brunvaktel, gråbulbyl, grådrillfink, gråjako, gråpoto, gråångfink, grönjery, grönkrombek, grönmango, gröndrillfink, rödlori, svartbaza, svartbulbyl, svartfibi, svartguan, svarthocko, svartlori, svartmamo, svartmunia, svartpivi, svartshama.
- Likaså har några arter med kort efterled, med ledförledet nordlig, sydlig, västlig eller östlig skrivits samman; norddunrygg, nordkrombek, nordpoto, nordschifforn, västbortssmyg, västgrässmyg, västkilnäbb, östgråmes.
- Övriga justeringar/språkliga korrekationer:
 - malackapåfågelfasan (v. 6, malajpåfågelfasan)
 - Isidores hökörn (v. 6, Isidors hökörn)
 - tofsörn (v. 6, afrikansk tofsörn)
 - selayargökduva (v. 6, salayargökduva)
 - kapturkduva (v. 6, kapturturduva)
 - kortvingegök (v. 6, indisk gök)
 - saheluv (v. 6, grå fläckuv)
 - dunkelspökuggla (v. 6, Humes spökuggla)
 - cholibaskrikuv (v. 6, sydamerikansk skrikuv)
 - djungelnattskärre (v. 6, orientnattskärre)
 - gulpannad jaçana (v. 6, centralamerikansk jaçana)
 - gulpannad sothöna (v. 6, rödgulpannad sothöna)
 - tjocknäbbad tärna (v. 6, sydamerikansk flodtärna)
 - maoritärna (v. 6, nyzeeländsk flodtärna)
 - dvärgtoko (v. 6, rödnäbbad dvärgtoko)
 - dvärgnäshorns fågel (v. 6, svart dvärgnäshorns fågel)
 - spetsgröngöling (v. 6, indokinesisk gröngöling)
 - blyspett (v. 6, askspett)
 - vitgumpsfalk (v. 6, orientalisk pygméfalk)
 - **mind**rechathambeckasin (v. 6, chathambeckasin)
 - siaujuvelrast (v. 6, siajuvelrast)
 - sultanjuvelrast (v. 6, kryddjuvelrast)
 - rostnackad honungsfågel (v. 6, östlig synäbb)
 - rosthalsad honungsfågel (v. 6, västlig synäbb)
 - bambusmyg (v. 6, fläckig bambusmyg)
 - kolmyrfågel (v. 6, beckmyrfågel)
 - rödkronad tyrann (v. 6, social tyrann)
 - chocóvisse tyrann (v. 6, västlig visse tyrann)
 - sundasångsmyg (v. 6, orientångsmyg)
 - sittella (v. 6, sitella), berör tre arter i familjen *Neosittidae*
 - Lawes strålpardisfågel (v. 6, lawesstrålpardisfågel)
 - sotholärka (v. 6, transvaallärka)
 - taiwankupvinge (v. 6, taiwanesisk kupvinge)
 - bronsstjärtad glansstare (v. 6, bronsstjärts glansstare)
 - solfjädersbärpickare (v. 6, solfjädersstjärtsbärpickare)
 - gråhattad gråfågel (v. 6, bismarckgråfågel)
 - arabsångare (v. 6, arabisk sångare)
 - gyllingsångare (v. 6, gyllingssångare)

- sukatsjovfnittertrast (v. 6 Sukatjovs fnittertrast)
- tibetansk koltrast (v. 6, tibetkoltrast)
- rödbent trast (v. 6, rödfotad trast)
- miombotermitskvätta (v. 6, vitkronad termitskvätta)
- campossparv (v. 6, grässparv)
- stenknäckssiska (v. 6 stenknäcksiska)
- citronbröstad siska (v. 6, citronbröstsiska)
- laysan-apapane (v. 6, laysanhonungsfink)
- LeContes sparv (v. 6, Le Contes sparv)

Markus Lagerqvist och Erling Jirle, Tk, 30 januari 2018.

Namnlistan, version 6



BILDTEXT: Halsbandsmänbröst (*Melanopareia torquata*) delas upp i två arter på v. 7.1 av IOC:s världslista.
Foto: Markus Lagerqvist.

Version 6 av listan över svenska namn innehåller ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista version 7.1 (januari 2016).

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar i IOC v. 7.1

- Stewartskarv (*Leucocarbo chalconotus*) delas upp i två arter:
 - **otagoskarv** (*L. chalconotus*), som förekommer huvudsakligen i Otagoprovin sen på sydöstra Sydön, Nya Zeeland.
 - **foveauxskarv** (*M. stewarti*), som förekommer på båda sidor om Foveauxsundet som skiljer Sydön från Stewart Island.
- Ametiststrupig solängel (*Heliangelus amethysticollis*) delas upp i tre arter:
 - ametiststrupig solängel (*H. amethysticollis*), som förekommer från södra Ecuador till nordvästra Bolivia.
 - **méridasolängel** (*H. spencei*), endemisk för provinsen Mérida i Venezuela.
 - **longuemaresolängel** (*H. clarisse*), som förekommer i östra Colombia och västra Venezuela.
- Kilnäbbskolibri (*Schistes geoffroyi*) delas upp i två arter:

- **östlig kilnäbbskolibri** (*S. geoffroyi*), som förekommer från östra Colombia och norra Venezuela söderut till östra Peru och centrala Bolivia.
- **västlig kilnäbbskolibri** (*S. albogularis*), från västra Colombia och västra Ecuador.
- Halsbandsmånbröst (*Melanopareia torquata*) delas upp i två arter:
 - halsbandsmånbröst (*M. torquata*), som förekommer i östra och centrala Brasilien och nordöstra Paraguay.
 - **boliviamånbröst** (*M. bitorquata*), endemisk för östra Bolivia.
- Rubintyrann (*Pyrocephalus rubinus*) delas upp i fyra arter:
 - rubintyrann (*P. rubinus*), som förekommer från sydöstra Bolivia, Paraguay, och sydöstra Brasilien till Argentina och Uruguay.
 - **cinnobertyrann** (*P. obscurus*), som förekommer i Nord- och Mellanamerika, söderut till norra Chile.
 - **darwintyrann** (*P. nanus*), från Galápagosöarna, förutom San Cristóbal.
 - **sancristóbaltyrann** (*P. dubius*), endemisk för San Cristóbal, men sågs senast 1987 och betraktas numera som utdöd.
- Grå flugsnappare (*Muscicapa striata*) delas upp i två arter:
 - grå flugsnappare (*M. striata*).
 - **tyrrensk flugsnappare** (*M. tyrrenica*), med raserna *balearica* från Balearerna och *tyrrhenica* från Korsika, Sardinien, några små öar utanför Toscana och möjligen även längs tyrrenska kusten i Italien. Ordet tyrrensk kommer från grekiskan och betyder “icke-greker”. Man tror att grekerna med det främst avsåg etrusker, men även raeter och lemnier. Dessa talade vad man nu kallar tyrrenska språk. Just etruskerna befolkade området där denna flugsnappare häckar, och havet mellan Italien, Korsika och Sardinien heter Tyrrenska havet.
- Svartbröstad rubinnäktergal (*Calliope pectoralis*) delas upp i två arter:
 - svartbröstad rubinnäktergal (*C. pectoralis*), som förekommer från Tian Shan, söderut till Afghanistan och vidare österut genom Himalaya till Sikkim.
 - **tibetansk rubinnäktergal** (*C. tschebaiewi*), som förekommer i norra Kashmir, de södra, östra och nordöstra delarna av Tibetanska högplatån, norra och nordvästra Sichuan, nordvästra Yunnan och norra Myanmar – ett område som nästan helt täcks av det historiska Tibet.
- Spetsnäbbad darwinfink (*Geospiza difficilis*) delas upp i tre arter:
 - spetsnäbbad darwinfink (*G. difficilis*), som förekommer över stora delar av Galápagosöarna.
 - **genovesadarwinfink** (*G. acutirostris*), från Genovesa.
 - **vampyrdarwinfink** (*G. septentrionalis*), från Darwin och Wolf i nordvästra Galápagosöarna. Namnet kommer av dess vana att dricka blod från andra fåglar, fr.a. sulor.
- Större kaktusfink (*Geospiza conirostris*) delas upp i två arter:
 - **españoladarwinfink** (*G. conirostris*), från Española. Arten är systerart till större darwinfink (*G. magnirostris*), inte som man tidigare trott till genovesakaktusfink (*G. propinqua*), därav namnbytet från kaktusfink till darwinfink.

- **genovesakaktusfink** (*G. propinqua*), från Genova.

Markus Lagerqvist och Erling Jirle, Tk, 29 januari 2017.