

Namnlistan, version 19



IOC delar upp skogsskvätta i tre arter, på bilden en orangebröstad skogsskvätta *Stiphornis erythrothorax* från Sierra Leone. Foto: Markus Lagerqvist.

Version 19 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 15.1 (februari 2025). Liksom i IOC:s förra uppdatering görs ett antal ändringar på släktesnivå som inte påverkar de svenska namnen och därför inte redovisas här. Två nya familjer ser dagens ljus.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Klipp hopparpingvin (*Eudyptes chrysocome*) delas upp i två arter:
 - **östlig klipp hopparpingvin** (*E. filholi*), på Prince Edwardöarna, Crozetöarna, Kerguelen, Heardön, Macquarieön, Antipodöarna, Aucklandöarna och Campbellöarna, och;
 - **västlig klipp hopparpingvin** (*E. chrysocome*), på öar i södra Chile inkl. Kap Horn, samt på Falklandsöarna.
- Mangrovehäger (*Butorides striata*) delas upp i två arter:
 - **mangrovehäger** (*B. atricapilla*), i Gamla världen, från Afrika österut till Polynesien, och;
 - **strimhäger** (*B. striata*), i tropiska Amerika.
- Olomao (*Myadestes lanaiensis*) delas upp i två arter:
 - **amaui** (*M. woahensis*), på tidigare på Oahu, numera utdöd, och;
 - olomao (*M. lanaiensis*), på Lanai och Molokai (senast observerad 1980).

- Svartryggig trast (*Zoothera talaseae*) delas upp i två arter:
 - **newbritaintrast** (*Z. talaseae*), på New Britan och den mindre grannön Umboi, och;
 - **svartryggig trast** (*Z. atrigena*), på Bougainville.
- Skogsskvätta (*Stiphornis erythrothorax*) delas upp i tre arter:
 - **orangebröstad skogsskvätta** (*Stiphornis erythrothorax*), från Sierra Leone österut till centrala Kamerun och norra Gabon, samt på Bioko;
 - **gulbröstad skogsskvätta** (*S. xanthogaster*), från sydöstra Kamerun och nordöstra Gabon till sydvästra Centralafrikanska Republiken och nordcentrala Kongo-Kingshasa, och;
 - **olivryggig skogsskvätta** (*S. pyrrholaemus*), i västra och nordöstra Gabon och sydvästra Kongo-Brazzaville.
- Aposolfågel (*Aethopyga boltoni*) delas upp i två arter:
 - aposolfågel (*A. boltoni*), i bergområden på västra, östcentrala och östra Mindanao, och;
 - **tbolisolfågel** (*A. tibolii*), i bergområden på södra Mindanao.
- Halsbandssparv (*Arremon taciturnus*) delas upp i två arter:
 - **méridasparv** (*A. axillaris*), i nordöstra Colombia och västra Venezuela, och;
 - halsbandssparv (*A. taciturnus*), i nordvästra Sydamerika och Amazonasområdet.
- Svarthuvad tangara (*Stilpnia cyanoptera*) delas upp i två arter:
 - svarthuvad tangara (*S. cyanoptera*), från Colombia till norra Venezuela, och;
 - **tepuítangara** (*S. whitelyi*), i Venezuela, Guyana och norra Brasilien.

38 arter stryks från listan:

- Udzungwahöna (*Xenoperdix udzungwensis*) slås samman med rubehöhöna (*X. obscuratus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **udzungwahöna** (*X. udzungwensis*).
- Thaisånghöna (*Arborophila diversa*) slås samman med kambodjasånghöna (*A. cambodiana*). Den sammanslagna arten får namnet **kardemummasånghöna** (*A. cambodiana*), efter utbredningen i Kardemummabergen på gränsen mellan Thailand och Kambodja.
- Vitbröstad skarv (*Phalacrocorax lucidus*) slås samman med storskarv (*Ph. carbo*). Den sammanslagna arten behåller namnet **storskarv** (*Ph. carbo*).
- Otagoskarv (*Leucocarbo chalconotus*) slås samman med foveauxskarv (*L. stewarti*). Den sammanslagna arten får namnet **stewartskarv** (*L. chalconotus*).
- Bantuhök (*Aerospiza tachiro*) slås samman med rödbröstad hök (*A. toussenelii*). Den sammanslagna arten behåller namnet **bantuhök** (*A. tachiro*).
- Härfågel (*Upupa epops*) slås samman med afrikansk härfågel (*U. africana*). Den sammanslagna arten behåller namnet **härfågel** (*U. epops*).

- Violett skratthärfågel (*Phoeniculus damarensis*) slås samman med kenyaskratthärfågel (*Ph. granti*). Den sammanslagna arten behåller namnet **violett skratthärfågel** (*Ph. damarensis*).
- Caatingatrögfågel (*Nystalus maculatus*) slås samman med chacotrögfågel (*N. striatipectus*). Den sammanslagna arten får namnet **fläckryggig trögfågel** (*N. maculatus*).
- Vitnäbbad araçari (*Pteroglossus azara*) slås samman med brunnäbbad araçari (*P. mariae*). Den sammanslagna arten får namnet **vitnäbbad arassari** (*P. zara*). Se "Övriga justeringar" angående tecknet ç.
- Gulpannad hackspett (*Melanerpes aurifrons*) slås samman med snårspett (*M. santacruzi*). Den sammanslagna arten behåller namnet **gulpannad hackspett** (*M. aurifrons*).
- Grön parakit (*Psittacara holochlorus*) slås samman med rödhakad parakit (*P. rubritorquis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **grön parakit** (*P. holochlorus*).
- Halsbandsmånbröst (*Melanopareia torquata*) slås samman med boliviamånbröst (*M. bitorquata*). Den sammanslagna arten behåller namnet **halsbandsmånbröst** (*M. torquata*).
- Buskdvärgtyrann (*Nesotriccus incomtus*) slås samman med musfärgad dvärgtyrann (*N. murinus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **musfärgad dvärgtyrann** (*N. murinus*).
- Hjälmmunkskata (*Philemon buceroides*), papuamunkskata (*Ph. novaeguineae*) och kapyorkmunkskata (*Ph. yorki*) slås samman till en art. Den sammanslagna arten behåller namnet **hjelmmunkskata** (*Ph. buceroides*).
- Större busksmyg (*Sericornis nouhuysi*) slås samman med sepikbusksmyg (*S. virgatus*). Den sammanslagna arten får namnet **umbrabusksmyg** (*S. nouhuysi*).
- Västlig snärtfågel (*Psophodes nigrogularis*) slås samman med malleesnärtfågel (*P. leucogaster*). Den sammanslagna arten behåller namnet **västlig snärtfågel** (*P. nigrogularis*).
- Skogsbatis (*Batis mixta*) slås samman med mikindanibatis (*B. reichenowi*). Den sammanslagna arten behåller namnet **skogsbatis** (*B. mixta*).
- Mangrovevireo (*Vireo pallens*) slås samman med providenciavireo (*V. approximans*). Den sammanslagna arten behåller namnet **mangrovevireo** (*V. pallens*).
- Rostbukig paradismonark (*Terpsiphone rufiventer*) slås samman med annobónparadismonark (*T. smithii*). Den sammanslagna arten behåller namnet **rostbukig paradismonark** (*T. rufiventer*).
- Rostbukig mes (*Melaniparus rufiventris*) slås samman med gräddbukig mes (*M. pallidiventris*). Den sammanslagna arten behåller namnet **rostbukig mes** (*M. rufiventris*).
- Athilärka (*Alaudala athensis*) slås samman med tuvlärka (*A. somalica*). Den sammanslagna arten behåller namnet **tuvlärka** (*A. somalica*).
- Katangagrönbulbyl (*Phyllastrephus cabanisi*) slås samman med ljus grönbulbyl (*Ph. placidus*). Den sammanslagna arten får namnet **blek grönbulbyl** (*Ph. cabanisi*).
- Trädgårdsbulbyl (*Pycnonotus barbatus*), somaliabulbyl (*P. dodsoni*), djiboutibulbyl (*P. somaliensis*) och trefärgad bulbyl (*P. tricolor*) slås samman till en art. Den sammanslagna arten behåller namnet **trädgårdsbulbyl** (*P. barbatus*).

- Svartbrynad stjärtmes (*Aegithalos bonvaloti*) slås samman med burmastjärtmes (*A. sharpei*). Den sammanslagna arten behåller namnet **svartbrynad stjärtmes** (*A. bonvaloti*).
- Zebraprinia (*Prinia bairdii*) slås samman med svartmaskad prinia (*P. melanops*). Den sammanslagna arten behåller namnet **zebraprinia** (*P. bairdii*).
- Ulugurusångare (*Scepomycter winifredae*) slås samman med rubehosångare (*S. rubehoensis*). Den sammanslagna arten får namnet **rosthuvad sångare** (*S. winifredae*).
- Beostare (*Gracula religiosa*) slås samman med engganobeostare (*G. enganensis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **beostare** (*G. religiosa*).
- Mindre glansstare (*Lamprotornis chloropterus*) slås samman med miomboglansstare (*L. elisabeth*). Den sammanslagna arten behåller namnet **mindre glansstare** (*L. chloropterus*).
- Afrikansk buskskvätta (*Saxicola torquatus*) slås samman med madagaskarbuskskvätta (*S. sibilla*). Den sammanslagna arten behåller namnet **afrikansk buskskvätta** (*S. torquatus*).
- Svarthuvad klippskvätta (*Thamnolaea cinnamomeiventris*) slås samman med vitkronad klippskvätta (*T. coronata*). Den sammanslagna arten får namnet **klippskvätta** (*T. cinnamomeiventris*).
- Strimmig blomsterpickare (*Dicaeum aeruginosum*) slås samman med tjocknäbbad blomsterpickare (*D. agilis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **tjocknäbbad blomsterpickare** (*Pachyglossa agilis*), och placeras i släktet *Pachyglossa*.
- Zambezisolfågel (*Cinnyris shelleyi*) slås samman med ruvusolfågel (*C. hofmanni*). Den sammanslagna arten behåller namnet **zambezisolfågel** (*C. shelleyi*).
- Asiatisk bergsökenfink (*Rhodopechys sanguineus*) slås samman med afrikansk bergsökenfink (*R. alienus*). Den sammanslagna arten får namnet **bergsökenfink** (*R. sanguineus*).

Två nya familjer

- Två familjer bryts ut från de neotropiska familjen tityror (*Tityridae*);
 - **vassnäbbar** (*Oxyruncidae*), endast innehållande en art, och;
 - **krontyranner** (*Onychorhynchidae*), innehållandes två arter krontyranner (släktet *Onychorhynchus*) och fem myjober (släktena *Myiobius* och *Terenotriccus*).

Övriga justeringar

Ytterligare några namn justeras, av taxonomiska skäl eller för att nuvarande namn är bristfälliga. För förklaring av geografiska namn m.m. se ordlistan med geografiska namn, biotopnamn, folkslag m.m. på Tk:s webbplats.

- Stavning på arter med ”ç” försvenskas till ”ss”, en stavning som tidigare använts parallellt, det påverkar **jassanor** och **arassarier** (tidigare jaçanor, araçarier,). Observera dock ”ç” finns kvar i fem arter vars namn bildats av landet Moçambique.

- Pärlrall, cayennerall, ussurirall och gulrall specificeras till **pärldvärgrall**, **cayennedvärgrall**, **ussuridvärgrall** och **guldvärgrall** för att harmoniera ned övriga dvärgrallar (släktena *Rufirallus*, *Coturnicops* och *Laterallus*).
- Fläckgluttsnäppa ändras till **trädsnäppa** då arten inte är nära släkt med gluttsnäppan. Arten är den enda i familjen som bygger egna bon i träd.
- I samband med uppdelningen av klipp hopparpingvin i två arter justeras namnet på atlantpingvin till **nordlig klipp hopparpingvin**, för att visa på de tre arternas nära släktskap.
- I samband med byte av engelska namn justeras även de svenska namnen på två träd klättrare till mer unika namn. Långstjärtad träd klättrare får namnet **visselträd klättrare** och amazonträd klättrare blir **sorgträd klättrare**.
- Gråkindad alkippa får det geografiskt beskrivande namnet **taiwanalkippa**, i linje med flera andra arter i släktet.
- Östlig klippnötväcka får det mer unika namnet **ravinnötväcka**, för att tydligare skilja arten från klippnötväcka.
- Prärielappsparv justeras till **präriesporrparv**, arten tillhör det monotypiska släktet *Rhynchophanes* i familjen sporrparvar.
- Vitbrynad sparv justeras till det mer informativa namnet **boliviasparv**, då flertalet arter i släktet är vitbrynade.
- Smalnäbbad tangara justeras till **slytangara**, då det finns många tangaror med smalare näbb än denna art.
- Gulstrimmig tangara justeras till **tatamátangara** efter artens utbredning, då gulstrimmig inte är en bra beskrivning av hur arten ser ut.

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund, Martin Stervander, TK,
28 februari 2025

Namnlistan, version 18

Version 18 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 14.2 (augusti 2024). Liksom i IOC:s förra uppdatering görs ett antal ändringar på släktesnivå som inte påverkar de svenska namnen och därför inte redovisas här. Bland övriga justeringar får ytterligare några arter med eponymer i namnet enklare och/eller mer informativa namn.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Dalripa *Lagopus lagopus* delas upp i två arter:
 - dalripa *L. lagopus*, i norra Nordamerika och norra Palearktis från Norge till Sachalin, och;
 - **moripa** *L. scotica*, på Brittiska öarna.
- Grå uggleskärre *Aegothales bennetti* delas upp i två arter:
 - grå uggleskärre *A. bennetti*, från centrala till sydöstra Nya Guinea, och;

- **karimuiuggleskärria** *A. terborghi*, endast känd från typexemplaret och en observation i Karimui, Chimbuprovinsen, Papua Nya Guinea.
- Rödhättad koua *Coua ruficeps* delas upp i två arter:
 - rödhättad koua *C. ruficeps*, från nordvästra Madagaskar, och;
 - **spikskogskoua** *C. olivaceiceps*, från sydvästra Madagaskar.
- Rödb bröstad malkoha *Phaenicophaeus curvirostris* delas upp i två arter:
 - rödb bröstad malkoha *P. curvirostris*, från Malackahalvön, Stora Sundaöarna och sydvästra Filippinerna, och;
 - **mentawaimalkoha** *P. oeneicaudus*, på Mentawai, väster om Sumatra.
- Mindre glansgök *Chalcites minutillus* delas upp i två arter:
 - mindre glansgök *C. minutillus*, från Sydöstasien till Filippinerna, Små Sundaöarna och norra och östra Australien, och;
 - **tanimbarglansgök** *C. crassirostris*, på Tayandu, Kai och Tanimbaröarna i Moluckerna.
- Indonesisk buskgök *Cacomantis sepulcralis* delas upp i två arter:
 - **sundabuskgök** *C. sepulcralis*, från Malackahalvön till Stora och Små Sundaöarna och sydvästra Filippinerna, och;
 - **sulawesibuskgök** *C. virescens*, från Sulawesi, Banggai- och Sulaöarna, Butung och Tukangbesiöarna.
- Vanlig buskgök *Cacomantis variolosus* delas upp i tre arter:
 - **sahulbuskgök** *C. variolosus*, i östra Wallacea, Nya Guinea, norra och östra Australien och Bismarkarkipelagen;
 - **manusbuskgök** *C. blandus*, på Ninigo och Amiralitetsöarna, och;
 - **salomonbuskgök** *C. addendus*, på Salomonöarna (förutom Rennell).
- Vegatrut *Larus vegae* delas upp i två arter (denna uppdelning har sedan tidigare genomförts av Tk):
 - vegatrut *L. vegae*, i centrala och östra Sibirien, från Tajmyr till Tjuktjen, Nysibiriska öarna och Saint Lawrence Island, och;
 - **mongoltrut** *L. mongolicus*, från Altaj till Bajkalsjön och Mongoliet, Chankasjön (nordöstra Kina) och Gula havet.
- Brunsula *Sula leucogaster* delas upp i två arter:
 - brunsula *S. leucogaster*, vid spridd på öar i tropiska och subtropiska vatten, och;
 - **cocossula** *S. brewsteri*, på öar utanför södra Kalifornien (Channel Islands), västra Mexiko – från centrala Baja California och Californiaviken (nordvästra Mexiko) till Revillagigedoöarna (väster om centrala Mexiko) – och Clippertonön (sydväst om Mexiko).
- Gulnäbbad barbett *Trachyphonus purpuratus* delas upp i två arter:
 - **gulmaskad barbett** *T. purpuratus*, från Sierra Leone till sydvästra Nigeria, och;
 - **guineabarbett** *T. goffinii*, från sydöstra Nigeria till västra Kenya.
- Rödpannad dvärgbarbett *Pogoniulus pusillus* delas upp i två arter:

- **nataldvärgbarbett** *P. pusillus*, i södra Moçambique och östra Sydafrika, och;
- **rödpannad dvärgbarbett** *P. uropygialis*, som förekommer från Eritrea, Etiopien och Somalia till sydöstra Sudan, Uganda och sydöstra Tanzania.
- Guldspett *Colaptes auratus* delas upp i två arter:
 - guldspett *C. auratus*, vidspridd i Nordamerika, och;
 - **guatemalaspett** *C. mexicanoides*, från sydligaste Mexiko till Nicaragua.
- Brunbukig uppnäbb *Xenops genibarbis* delas upp i två arter:
 - **amazonuppnäbb** *X. genibarbis*, från östra Colombia och Venezuela genom Amazonas och Guyanaregionen till norra Bolivia, samt nordöstra Brasilien, och;
 - **nordlig uppnäbb** *X. mexicanus*, från södra Mexiko genom Panama till norra Colombia och nordvästra Venezuela söderut genom västra Colombia, västra Ecuador och nordvästra Peru.
- Rostgrässmyg *Amytornis whitei* delas upp i två arter:
 - **pilbaragrässmyg** *A. whitei*, i steniga områden i västra Western Australia, och;
 - **sandgrässmyg** *A. oweni*, i sandöknar och mallee i centrala Western Australia till centrala Queensland och nordvästra och södra Southern Australia.
- Vitögd gråfågel *Coracina striata* delas upp i fyra arter:
 - vitögd gråfågel *C. striata*, från Sydöstasien till norra Filippinerna, Sumatra och Borneo;
 - **visayagråfågel** *C. panayensis*, på västra Visayaöarna;
 - **sulugråfågel** *C. guillemardi*, på Suluöarna, och;
 - **boholgråfågel** *C. kochii*, i östcentrala och södra Filippinerna.
- Större gråfågel *Coracina javensis* (f.d. *C. macei*) delas upp i tre arter:
 - **orientgråfågel** *C. javensis*, som förekommer från Himalaya genom Sydöstasien till östra Kina och Taiwan, även Java och Bali;
 - **indisk gråfågel** *C. macei*, i centrala och södra Indien, på Sri Lanka, och;
 - **malackagråfågel** *C. larutensis*, på Malackahalvön.
- Gråhättad gråfågel *Edolisoma remotum* delas upp i två arter:
 - **bismarckgråfågel** *E. remotum*, i Bismarckarkipelagen (på Lavongai, New Ireland, Dyaul, Feni, Mussau, Emirau, Umboi, New Britain och Lolobau), och;
 - **bukidagråfågel** *E. erythropygium*, på Tabar, Lihir och Tangaöarna i Bismarckarkipelagen österut till Malaita i Salomonöarna.
- Cikadagråfågel *Edolisoma tenuirostre* delas upp i åtta arter:
 - **sahulgråfågel** *E. tenuirostre*, på Nya Guinea, i norra och östra Australien, samt Bismarckarkipelagen;
 - **rosselgråfågel** *E. rostratum*, på Rossel, sydöst om Nya Guinea;
 - **banggaigråfågel** *E. pelingi*, på Banggai, öster om Sulawesi;
 - **obigråfågel** *E. obiense*, på Obi och Bisa, i Moluckerna;
 - **sultangråfågel** *E. grayi*, på Tukangbesiöarna, sydöst om Sulawesi, samt från Morotai till Bacan, i norra Moluckerna;

- **seramgråfågel** *E. amboinense*, på Buru, Ambon, Seram och Seram Laut, i centrala Moluckerna;
- **geelvinkgråfågel** *E. meyerii*, på Numfor och Biak, nordväst om Nya Guinea, och;
- **timorgråfågel** *E. timoriense*, på Kalaoa (sydöst om Sulawesi), Lembata, Alor och Timor (i Små Sundaöarna).
- Salomongråfågel *Edolisoma holopolium* delas upp i två arter:
 - salomongråfågel *E. holopolium*, i norra, sydcentrala och västra Salomonöarna, och;
 - **malaitagråfågel** *E. tricolor*, på Malaita, sydöstra Salomonöarna.
- Sulawesigråfågel *Edolisoma morio* delas upp i två arter:
 - sulawesigråfågel *E. morio*, på Sulawesi och omgivande satellitöar, och;
 - **sangihegråfågel** *E. salvadorii*, på Sangihe och Talaud (norr om Sulawesi).
- Orangebröstad visslare *Pachycephala fulvotincta* delas upp i två arter:
 - **tenggaravisslare** *P. calliope* (f.d. *P. fulvotincta*), från Java och Bali till centrala, östra Små Sundaöarna, och;
 - **selayarvisslare** *P. teysmanni*, på Selayar, söder om sydvästra Sulawesi.
- Fijivisslare *Pachycephala vitiensis* delas upp i två arter:
 - **vitstrupig fijivisslare** *P. vitiensis*, på södra Fijiöarna, och;
 - **gulstrupig fijivisslare** *P. graeffii*, på östra, västra och centrala Fijiöarna.
- Temotuvisslare *Pachycephala vanikorensis* delas upp i tre arter:
 - **vanikolovisslare** *P. vanikorensis*, på Vanikolo (sydöstra Salomonöarna);
 - **utupuavisslare** *P. utupuae*, på Utupua (sydöstra Salomonöarna), och;
 - **nendovisslare** *P. ornata*, på Nendo samt Reef- och Dufföarna (sydöstra Salomonöarna).
- Bandavisslare *Pachycephala macrorhyncha* delas upp i två arter:
 - bandavisslare *P. macrorhyncha*, på Banggai- och Sulaöarna (öster om Sulawesi), centrala, södra Moluckerna och östra Små Sundaöarna, och;
 - **babarvisslare** *P. sharpei*, på Babar (östra Små Sundaöarna).
- Rödvingad lärka *Corypha hypermetra* delas upp i två arter:
 - **storlärka** *C. hypermetra*, i Etiopien och södra Somalia till nordöstra Tanzania, och;
 - **kidepolärka** *C. kidepoensis*, i sydöstra, södra Sudan och nordöstra Uganda.
- Rödnackad lärka *Corypha africana* delas upp i fem arter:
 - **savannlärka** *C. africana*, vidspriidd i östra och södra Afrika, från Uganda i norr till Sydafrika i söder;
 - **höglandslärka** *C. kurrae*, som förekommer från Guinea västerut till västra Sudan;
 - **vaktlärka** *C. athi*, som förekommer från centrala Kenya till nordöstra Tanzania;

- **slättlärka** *C. kabalii*, från Gabon till södra Kongo-Kinshasa, östra Angola och nordvästra Zambia, och;
- **platålärka** *C. nigrescens*, från östra Zambia, norra Malawi och södra Tanzania.
- Vitstrupig grönbulbyl *Phyllastrephus albigularis* delas upp i två arter:
 - vitstrupig grönbulbyl *P. albigularis*, som förekommer från Senegambia till södra Sudan, västra Uganda och östra Kongo-Kinshasa, och;
 - **angolagrönbulbyl** *P. viridiceps*, i nordvästra Angola.
- Gulstrupig grönbulbyl *Atimastillas flavicollis* delas upp i två arter:
 - gulstrupig grönbulbyl *A. flavicollis*, som förekommer från Senegambia till norra Kamerun och nordvästra Centralafrikanska republiken, och;
 - **blekstrupig grönbulbyl** *A. flavigula*, från Kamerun till västcentrala Etiopien, Östafrika, Angola och Kongo-Kinshasa.
- Salomonmonark *Symposiachrus barbatus* delas upp i två arter:
 - salomonmonark *S. barbatus*, som förekommer från Buka till Guadalcanal (förutom New Georgia-öarna), och;
 - **malaitamonark** *S. malaitae*, på Malaita.
- Kolombangaramonark *Symposiachrus browni* delas upp i två arter:
 - kolombangaramonark *S. browni*, i östra och södra New Georgia-öarna (Kolombangara, New Georgia, Vangunu, Rendova, Tetepare) och;
 - **vellalavellamonark** *S. nigrotectus*, i nordvästra och norra New Georgia-öarna (Vella Lavella, Ranongga).
- Nötkråka *Nucifraga caryocatactes* delas upp i två arter (denna uppdelning har sedan tidigare genomförts av Tk):
 - nötkråka *N. caryocatactes*, som förekommer från Europa till nordöstra Japan, och;
 - **kinesisk nötkråka** *N. hemispila*, från nordvästra Himalaya österut till Kina och Taiwan.
- Sundakråka *Corvus enca* delas upp i två arter:
 - sundakråka *C. enca*, på Malackahalvön, Sumatra med satellitöar, Borneo, Java och Bali, och;
 - **sulawesikråka** *C. celebensis*, på Sulawesi och Sulaöarna.
- Småkråka *Corvus samarensis* delas upp i två arter:
 - **samarkråka** *C. samarensis*, på Samar och Mindanao, och;
 - **sierramadrekra** *C. sierramadrensis*, på Luzon (Sierra Madre-bergen).
- Stornäbbad kråka *Corvus macrorhynchos* delas upp i två arter:
 - stornäbbad kråka *C. macrorhynchos*, som förekommer från nordöstra Indien och Sri Lanka genom östra Ryssland, Japan, Taiwan, till Små Sundaöarna, och;
 - **filippinkråka** *C. philippinus*, på Filippinerna.
- Afrikansk klippssvala *Ptyonoprogne fuligula* delas upp i två arter:

- **kapklippsvala** *P. fuligula*, som förekommer från sydvästra Angola och Namibia till sydvästra Zimbabwe, södra Moçambique och Sydafrika, och;
- **ockrastrupig klippsvala** *P. rufigula*, från Sierra Leone till Eritrea och Etiopien söderut till Zimbabwe och norra Moçambique.
- Kustsvala *Hirundo tahitica* delas upp i två arter:
 - **tahitisvala** *H. tahitica*, på Moorea och Tahiti, och;
 - kustsvala *H. javanica*, som förekommer från Sydostasien till Nya Guinea och Mikronesien.
- Rostgumpssvala *Cecropis rufula* (f.d. *C. daurica*), delas upp i två arter. Samtidigt flyttas underarterna *daurica*, *japonica* och *nipalensis* till tempelsvala *C. striolata* och västafrikansk svala *C. domicella* införlivas i den nya arten bysvala:
 - rostgumpssvala (*C. rufula*), som förekommer i södra Europa och Nordafrika österut till Iran, Pakistan och nordvästra Indien, och;
 - **bysvala** *C. melanocrissus*, som förekommer från Senegambia till västra Kamerun och östra Sudan, och i Östafrika från Etiopien och Eritrea till Malawi och norra Zambia.
- Långstjärtad cistikola *Cisticola aberrans*, inkl. f.d. klippcistikola *C. emini*, delas upp i två arter:
 - långstjärtad cistikola *C. aberrans*, som förekommer i västra, centrala, sydöstra och östra Afrika;
 - **huambocistikola** *C. bailundensis*, i Angola.
- Karamojaapalis *Apalis karamojae* delas upp i två arter:
 - karamojaapalis *A. karamojae*, i nordöstra Uganda, och;
 - **massajapalis** *A. stronachi*, i norra Tanzania och sydvästra Kenya.
- Etiopienglasögonfågel *Zosterops poliogastrus* delas upp i två arter:
 - **simenglasögonfågel** *Z. poliogastrus*, i sydöstra Sudan, Eritrea och norra, centrala och östra Etiopien, och;
 - **kaffaglasögonfågel** *Z. kaffensis*, i västra och sydvästra Etiopien.
- Gul glasögonfågel *Zosterops senegalensis* delas upp i två arter:
 - **kanariegul glasögonfågel** *Z. senegalensis*, som förekommer från Mauretanien och Senegal till nordvästra Etiopien, i västra Kenya och norra Tanzania och i Sierra Leone, Liberia och Elfenbenskusten, samt i södra Sudan och nordöstra Uganda, och;
 - **angolaglasögonfågel** *Z. kasaicus*, från centrala Kongo-Kinshasa till norra och centrala Angola.
- Rostkindad sabeltimalia *Erythrogonys erythrogonys* delas upp i två arter:
 - rostkindad sabeltimalia *E. erythrogonys*, som förekommer i Himalaya från nordöstra Pakistan till Bhutan, och;
 - **rödögd sabeltimalia** *E. imberbis*, i östra Myanmar och nordvästra Thailand.
- Roststjärtad gärdsmyg *Pheugopedius euophrys* delas upp i två arter:
 - **duettgärdsmyg** *P. euophrys*, som förekommer från sydvästra Colombia till norra Peru, och;

- **coléngärdsmyg** *P. schulenbergi*, i norra Peru, norr om Marañónfloden.
- Husgärdsmyg *Troglodytes aedon* delas upp i sju arter:
 - husgärdsmyg *T. aedon*, som förekommer från södra Kanada och västra, centrala och östra USA till södra Mexiko;
 - **musgärdsmyg** *T. musculus*, som förekommer från södra Mexiko till södra Chile och södra Argentina;
 - **cozumelgärdsmyg** *T. beani*, på Cozumel (utanför Yucatánhalvön);
 - **kalinagogärdsmyg** *T. martinicensis*, på Guadeloupe, Dominica och Martinique (troligen utdöd på Martinique och eventuellt även Guadeloupe);
 - **saintluciagärdsmyg** *T. mesoleucus*, på Saint Lucia;
 - **saintvincentgärdsmyg** *T. musicus*, på Saint Vincent, och;
 - **grenadagärdsmyg** *T. grenadensis*, på Grenada.
- Kastanjebröstad gärdsmyg *Cyphorhinus thoracicus* delas upp i två arter:
 - **drillgärdsmyg** *C. thoracicus*, som förekommer från centrala Peru till västra Bolivia, och;
 - **visselgärdsmyg** *C. dichrous*, som förekommer från centrala Colombia till norra Peru.
- Blygrå myggsnappare *Polioptila plumbea* delas upp i två arter:
 - **tropikmyggsnappare** *P. plumbea*, som förekommer från centrala och östra Colombia till Peru och nordöstra Brasilien, och;
 - **marañónmyggsnappare** *P. maior*, i norra Peru.
- Vitbröstad härmtrast *Ramphocinclus brachyurus* delas upp i två arter:
 - **martiniquehärmtrast** *R. brachyurus*, på Martinique, och;
 - **saintluciahärmtrast** *R. sanctaeluciae*, på Saint Lucia.
- Ötrast *Turdus poliocephalus* delas upp i 17 arter:
 - **mindorotrast** *T. mindorensis*, på Mindoro;
 - **luzontrast** *T. thomassoni*, på Luzon;
 - **mindanaotrast** *T. nigrorum*, på Negros och Mindanao;
 - **wallaceatrast** *T. schlegelii*, på Sulawesi och Timor;
 - **julötrast** *T. erythropleurus*, på Julön;
 - **javatrast** *T. javanicus*, på Java, Borneo och Sumatra;
 - **molucktrast** *T. deningeri*, på Seram och Taliabu;
 - **papuatrast** *T. papuensis*, på Nya Guinea och Goodenough;
 - **bismarcktrast** *T. heinrothi*, på New Ireland och Tolokiwa;
 - **bougainvilletrast** *T. bougainvillei*, på Bougainville;
 - **salomontrast** *T. kulambangrae*, på Kolombangara och Guadalcanal;
 - **vanuatutrast** *T. vanikorensis*, på Rennell, Efate, Nguna, Paama, Lopevi, Epi, Emae, Pentecost, Malekula, Ambrym, Maré (Loyautéöarna, troligen utdöd), Vanua Lava, Ureparapara, Utupua, Vaniloru, Santo, Malo och Gaua;

- **vithuvad trast** *T. pritzbueri*, på Erromango, Tanna (södra Vanuatu) och Lifou (troligen utdöd);
- **nyakaledonientrast** *T. xanthopus*, på Nya Kaledonien med satellitöar (troligen utdöd förutom på Yandé och möjligen Neba);
- **norfolktrast** *T. poliocephalus*, tidigare på Norfolkön och Lord Howe, numera utdöd;
- **samoatrast** *T. samoensis*, på Savaii och Upolu, och;
- **fijitrast** *T. ruficeps*, på Fijiöarna.
- Vitkronad shama *Copsychus stricklandii* delas upp i två arter:
 - vitkronad shama *C. stricklandii*, på norra Borneo och Banggi (nordöst om Borneo, och;
 - **maratuashama** *C. barbouri*, på Maratua (öster om Borneo), utdöd i vilt tillstånd.
- Vitgumpad shama *Copsychus malabaricus* delas upp i fyra arter:
 - vitgumpad shama *C. malabaricus*, som förekommer från Indien och Sri Lanka, till Hainan, Vietnam och Stora Sundaöarna;
 - **javashama** *C. omissus*, på Java;
 - **kangeanshama** *C. nigricauda*, på Kangean (norr om Bali), möjligen utdöd i vilt tillstånd, och;
 - **ceylonshama** *C. leggei*, på Sri Lanka.
- Vitbrynad näktergal *Tarsiger indicus* delas upp i två arter:
 - vitbrynad blåstjärt *T. indicus*, som förekommer från Himalaya till sydcentrala Kina och norra Vietnam, och;
 - **taiwanblåstjärt** *T. formosanus*, på Taiwan.
- Tajgablåstjärt *Tarsiger cyanurus* delas upp i två arter:
 - tajgablåstjärt *T. cyanurus*, i norra Eurasien, och;
 - **qilianblåstjärt** *T. albocoeruleus*, i nordcentrala Kina.
- Blodbröstad blomsterpickare *Dicaeum sanguinolentum* delas upp i fyra arter:
 - **javablomsterpickare** *D. sanguinolentum*, på Java och Bali;
 - **floresblomsterpickare** *D. rhodopygiale*, på Flores;
 - **sumbablomsterpickare** *D. wilhelminae*, på Sumba, och;
 - **timorblomsterpickare** *D. hanieli*, på Timor.
- Smyckesolfågel *Cinnyris pulchellus* delas upp i två arter:
 - smyckesolfågel *C. pulchellus*, som förekommer från Mauretanien och Sierra Leone österut till Eritrea, västra Etiopien och nordvästra Kenya, och;
 - **juvelsolfågel** *C. melanogastrus*, i västra, centrala och södra Kenya, samt Tanzania.
- Steglits *Carduelis carduelis* delas upp i två arter:
 - steglits *C. carduelis*, i tempererade och subtropiska västra och centrala Palearktis, och;

- **grå steglits** *C. caniceps*, från södra och östra Iran genom Centralasien till västra Mongoliet, nordvästra Kina och västra och centrala Himalaya.
- Svartkronad sparv *Arremon abeillei* delas upp i två arter:
 - svartkronad sparv *A. abeillei*, i sydvästra Ecuador och nordvästra Peru, och;
 - **marañónsparv** *A. nigriceps*, i nordcentrala Peru.
- Skiffersnårsparv *Atlapetes schistaceus* delas upp i två arter:
 - skiffersnårsparv *Atlapetes schistaceus*, från Venezuela till Peru, och;
 - **junínsnårsparv** *Atlapetes taczanowskii*, i centrala Peru.

Tre nya arter tillkommer:

- **Marquesaspurpurhöna** *Porphyrio paepae*, på Hiva Oa och Tahuata i Marquesasöarna, i Franska Polynesien, numera utdöd.
- **Timornattskärre** *Caprimulgus ritae*, på Timor, Rote och Wetar i Små Sundaöarna.
- **Vitstjärtad tityra** *Tityra leucura*, från sydcentrala Amazonas i Brasilien, en mycket dåligt känd art med få observationer, vars taxonomiska status varit ifrågasatt.

17 arter stryks från listan:

- Sulawesisalangan *Aerodramus sororum* och seramsalangan *A. ceramensis* slås samman med halmaherasalangan *A. infuscatus*. Den sammanslagna arten får namnet **molucksalangan** *A. infuscatus*.
- Kustsalangan *Aerodramus germani* slås samman med svalbosalangan *A. fuciphagus*. Den sammanslagna arten får namnet **vitbosalangan** *A. fuciphagus*.
- Macquarieparakit *Cyanoramphus erythrotis* slås samman med rödpannad parakit *C. novaezelandiae*. Den sammanslagna arten behåller namnet rödpannad parakit *C. novaezelandiae*.
- Större gråfågel *Coracina macei* slås samman med javagråfågel *C. javensis*. Den sammanslagna arten får namnet **orientgråfågel** *C. javensis*.
- Östlig talgoxe *Parus minor* slås samman med grå talgoxe *P. cinereus*. Den sammanslagna arten behåller namnet grå talgoxe *P. cinereus*.
- Rävlärka *Calendulauda alopex* slås samman med isabellalärka *C. africanoides*. Den sammanslagna arten behåller namnet isabellalärka *C. africanoides*.
- Törellärka *Calendulauda barlowi* slås samman med dynlärka *C. erythrochlamys*. Den sammanslagna arten behåller namnet dynlärka *C. erythrochlamys*.
- Uarsheklärka *Mirafraga ashi* slås samman med somalialärka *Corypha somalica*. Den sammanslagna arten behåller namnet somalialärka *C. somalica*.
- Malawigrönbulbyl *Arizelocichla olivaceiceps* slås samman med strimörad grönbulbyl *A. striifacies*. Den sammanslagna arten behåller namnet strimörad grönbulbyl *A. striifacies*.
- Bougainvillemonark *Monarcha erythrostictus* slås samman med kastanjebukig monark *M. castaneiventris*. Den sammanslagna arten behåller namnet kastanjebukig monark *M. castaneiventris*.

- Gråhuvad sammetsmonark *Myiagra cervinicolor* slås samman med sothuvad sammetsmonark *M. eichhorni*. Den sammanslagna arten behåller namnet sothuvad sammetsmonark *M. eichhorni*.
- Klippcistikola *Cisticola emini* slås samman med långstjärtad cistikola *C. aberrans*. Den sammanslagna arten behåller namnet långstjärtad cistikola *C. aberrans*.
- Miomboeremomela *Eremomela salvadorii* slås samman med gulbukig eremomela *E. icteropygialis*. Den sammanslagna arten behåller namnet gulbukig eremomela *E. icteropygialis*.
- Ockrabröstad timalia *Cyanoderma ambiguum* slås samman med rostpannad timalia *C. rufifrons*. Den sammanslagna arten behåller namnet rostpannad timalia *C. rufifrons*.
- Snösiska *Acanthis hornemanni* och brunsiska *A. cabaret* slås samman med gråsiska *A. flammea*. Den sammanslagna arten behåller namnet gråsiska *A. flammea*. Denna sammanslagning har sedan tidigare genomförts av Tk.

En ny familj

- De två arterna fläckkrypare bryts ut från familjen nötväckor till en egen familj; **fläckkrypare** (Salpornithidae).

Övriga justeringar

Några namn justeras baserat på taxonomiska skäl, exempelvis att nya genetiska studier har påvisat nya släktskapsförhållanden.

- Vitkronad buskgök och blek buskgök justeras till **vitkronad gök** och **blekgök**, då genetiska studier visar att de utgör en systergrupp till de egentliga buskgökarna i släktet *Cacomantis* och flyttas till släktena *Caliechthrus* respektive *Heteroscenes*.
- Blåhuvad vaktelduva justeras till **blåhätteduva**, då den genetiskt inte står nära övriga vaktelduvor.
- Baserat på genetiska studier bröts havslöparen och ytterligare ett antal stormsvalor ut från familjen stormsvalor (Hydrobatidae) till den nya familjen Oceanitidae, som står närmare albatrosserna. De nya familjerna fick namnen nordstormsvalor och sydstormsvalor. För att tydliggöra att familjerna inte står varandra närmast och för att förenkla språkbruket, justeras familjenamnen till **stormsvalor** (Hydrobatidae) för de nordliga arterna, inklusive vår egen stormsvala och **havslöpare** (Oceanitidae) för de sydliga arterna, inklusive havslöparen. I samband med detta justeras namnen på nio sydliga arter från stormsvala till **havslöpare** och oceanlöpare justeras till **oceanstormsvala**.
- Ovambohök justeras till **ovambosparvhök** i samband med justering av släktena bland hökarna.
- Duvhökarna bryts ut från *Accipiter* och flyttas till släktet *Astur*. I samband med detta justeras namnet på fyra arter från hök till duvhök; **trastduvhök** (trasthök), **kubaduvhök** (kubahök), **tvåfärgad duvhök** (tvåfärgad hök) och **chileduvhök** (chilehök).
- Av de sju arterna i familjen kondorer heter idag fem ”gam” trots att de inte är gamar. För att förtydliga släktskapet justeras namnet så samtliga sju arter heter kondor. De nya namnen blir **kungskondor** (kungsgam), **andinsk kondor** (kondor), **korpcondor** (korp-gam), **kalkonkondor** (kalkongam), **savannkondor** (savanngam) och **skogskondor** (skogsgam).

- Orangeryggig hackspett justeras till **orangeryggig sultanspett**, då genetiska studier visat att den tillhör sultanspettarna i släktet *Chrysocolaptes*.
- De små nunnefåglarna i släktet *Nonnula* får namnet **noviser** för att särskilja dem från de stora arterna i släktena *Monasa* och *Hapaloptila*. På engelska heter de nunlet resp. nunbird.
- Genetiska studier av familjen myrfåglar har gett större förståelse för de inbördes släktskapen inom familjen och föranleder några namnjusteringar:
 - Myrsmyg reserveras för arter i kladen "Formicivorini", vilket medför följande justeringar:
 - Fyra arter i släktet *Euchrepomis* justeras från myrsmyg till **eldrygg**.
 - Åtta arter i släktet *Epinecrophylla* justeras från myrsmyg till **strimhake**.
 - Fläckvingad myrsmyg (släktet *Microrhopias*) justeras till **prickvingad myrfågel**.
 - Strimryggig myrsmyg (släktet *Myrmorchilus*) justeras till **strimryggig myrfågel**.
 - Två arter i släktet *Isleria* justeras från myrsmyg till **myrfågel**.
 - Stjärnstrupig myrsmyg (släktet *Rhopias*) justeras till **stjärnstrupig myrfågel**.
 - 17 arter i släktet *Herpsilochmus* justeras från myrsmyg till **myrvireo**;
 - Caatingamyrsmyg (släktet *Radinopsyche*) justeras till **caatingamyrvireo**.
 - Svartvit myrfågel justeras till **ömyrsmyg**.
 - Myrtörnskata reserveras för ett antal släkten inom kladen Thamnophilini, vilket medför följande justeringar:
 - Fläckvingad myrtörnskata (släktet *Pygiptila*) justeras till **stjärnmyrfågel**.
 - Två arter i släktet *Thamnistes* justeras från myrtörnskata till **myrfågel**. Rostbrun myrtörnskata får namnet **perumyrfågel**.
 - Helikoniamyrtörnskata (släktet *Neoctantes*) justeras till **helikoniamyrfågel**.
 - Två arter i släktet *Clytoctantes* justeras från myrtörnskata till **myrfågel**.
- Markkryparna i släktet *Upucerthia* justeras till **cinkloder**, då de genetiskt visat sig utgöra en monofyletisk klad tillsammans med *Cinclodes*. Samtidigt justeras de två markkryparna i släktet *Tarphonomus* till **buskkrypare** för att skilja dem från markkrypare i andra släkten, det avspeglar även deras beteende bättre.
- Fyra arter som tillhör den afrikanska kladen med grönbulbyler förtydligas från endast bulbyl till grönbulbul; **svarthalsad grönbulbul**, **markgrönbulbul**, **brun grönbulbul** och **vattengrönbulbul** (v. 17, svarthalsad bulbul, markbulbul, brunbulbul och vattenbulbul).
- Genetiska studier har visat att de två arterna i släktet *Eurocephalus* står utanför familjen törnskator, de får därför namnet **akaciaskrikor**. De nya artnamnen blir **vitgumpad akaciaskrika** och **brungumpad akaciaskrika** (v. 17 vitgumpad resp. vitkronad törnskata).

- Trasttangaran utgör en egen familj, som inte står närmast tangarorna, den får därför det mer särskiljande namnet **keo**, och familjenamnet ändras till **keor**.
- Fyra arter myrkardinaler flyttas till släktet *Driophlox*. Kvar i släktet *Habia* blir endast röd myrkardinal vars namn justeras till **rödkronad kardinal**.

Ett antal namn justeras då nuvarande namn är bristfälliga, exempelvis ger en felaktig bild av artens utseende eller beteende, eller på annat sätt är opassande. För förklaring av termer som används i artnamnen, se ordlistan med geografiska namn, biotopnamn, folkslag m.m. på Tk:s webbplats.

- **flodhocko** (v. 17 släthuvad hocko), då arten framför allt hittas efter floder eller översvämmad skog och släthuvad inte är en bra beskrivning av utseendet
- **droppfrankolin** (v. 17 droppfläckig frankolin), förenkling av namnet
- **khasiseglare** (v. 17 mörkryggig seglare), efter artens mycket begränsade utbredning kring Khasibergen i nördöstra Indien, mörk rygg inte unikt för arten
- **sågnäbbad eremit** (v. 17 sågnäbbskolibri), för att förtydliga släktskapet, då övriga arter inom kladen kallas eremiter
- **eldstrupe** (v. 17 eldstrupekolibri), förenkling av namnet
- **granatstrupe** (v. 17 granatstrupekolibri), förenkling av namnet
- **solfjädersbuskgök** (v. 17 australisk buskgök), namnet justeras i samband med att vanlig buskgök delas upp i tre arter, bland annat sahubuskgök som även den förekommer i Australien
- **fjällig spegelduva** (v. 17 vanlig spegelduva), ”vanlig” tas bort som förled på ett antal arter, till förmån för mer precisa eller informativa namn
- **söderhavsmarkduva** (v. 17 samoamarkduva), då arten förutom på Samoa även förekommer på Fijiöarna, Tonga samt Wallis och Futuna
- **mexikansk sparvduva** (v. 17 inkaduva), namnet inkaduva är mycket missvisande då arten inte förekommer i Sydamerika
- **bärspov** (v. 17 eskimåspov), namnet justeras då ordet ”eskimå” enligt Diskrimineringsombudsmannen kan uppfattas som kränkande och bör undvikas; namnet bärspov kommer av artens födoval, då den både på häcklokal och under flytt ska ha livnärt sig på olika bär, framför allt kråkbär
- **vitmaskad ibis** (v. 17 maskibis), förtydligande för att särskilja arten från svartmaskad, respektive rödmaskad ibis
- **vitbyxad nashornsfågel** (v. 17 vitlårad nashornsfågel), -lårad ändras till det anatomiskt mer korrekta -byxad, då det hänvisar till färgen på fjäderdräkten
- **chokladkungsfiskare** (v. 17 kakaokungsfiskare), korrigering då namnet avspeglar artens chokladbruna färg, inte någon koppling till kakaoträdet
- **parakitfalk** (v. 17 fläckvingad falk), efter artens vana att häcka i kolonier av munkparakit
- **svavelögd lövletare** (v. 17 kroknäbbad lövletare), bättre karaktär då arten inte har något tydlig krok på näbben
- **vaktelmyrfågel** (v. 17 praktmyrfågel), beskriver artens unika vaktellika utseende
- **bandmyrfågel** (v. 17 bandad myrfågel), förenkling av namnet

- **chusqueatapakul** (v. 17 bambutapakul), justeras för överensstämmelse med det engelska namnet, *Chusquea* är ett bambusläkte
- **gråryggig todityrann** (v. 17 vanlig todityrann), ”vanlig” tas bort som förled på ett antal arter, till förmån för mer precisa eller informativa namn
- **saxstjärtad kungstyrann** (v. 17 saxstjärtstyrann), justeras från tyrann till kungstyrann, för samstämmighet med övriga kungstyranner, släktet *Tyrannus*
- **gaffelstjärtad kungststyrann** (v. 17 gaffelstjärtstyrann), justeras från tyrann till kungstyrann, för samstämmighet med övriga kungstyranner, släktet *Tyrannus*
- **söderhavsdryllfågel** (v. 17 polynesisk dryllfågel), justeras då en stor del av utbredningen, utöver Polynesien, är i Melanesien
- **gulpannad vireo** (v. 17 gulpannad vireo), specificering av färgen som även överensstämmer med det engelska och det vetenskapliga namnet
- **vitspetsad grönskata** (v. 17 vanlig grönskata), ”vanlig” tas bort som förled på ett antal arter, till förmån för mer precisa eller informativa namn
- **taggstjärtsskata** (v. 17 klyvstjärtad skata), bättre beskrivning av stjärtens utseende
- **pipkråka** (v. 17 sulawesikråka), beskriver artens unika läte och överensstämmer med det engelska namnet
- **västlig kragparadisfågel** (v. 17 vogelkopkragparadisfågel), justeras för att undvika onödigt långt namn, överensstämmer även med det engelska namnet
- **parotior** (v. 17 strålparadisfåglar), justeras för att undvika onödigt långa namn
- **arfakparotia** (v. 17 vogelkopstrålparadisfågel), beskriver artens utbredning, då den är i det närmaste endemisk för Arfakbergen
- **tibetansk korttälärka** (v. 17 högländslärka), visar på det nära släktskapet med mongoliskt korttälärka
- **vitbyxad svala** (v. 17 vitlårad svala), -lårad ändras till det anatomiskt mer korrekta -byxad, då det hänvisar till färgen på fjäderdräkten
- **ghatssvala** (v. 17 tamilsvala), namnet kommer av Ghatsbergen i södra Indien, tidigare namnet felvisande då arten knappt förekommer i de områden som domineras av tamiler
- **cettior** (v. 17 cettisångare), familjenamnet förenklas, de flesta arter i familjen heter cettia, inte cettisångare
- **gulahavscettia** (v. 17 manchurisk cettia), beskriver bättre artens utbredning runt Gula havet
- **fjällkronad stubbstjärt** (v. 17 manchurisk stubbstjärt), namnet justeras till att beskriva artens utseende, då den förekommer i ett större område som även omfattar Sachalin, Koreahalvön och Japan
- **bäcksångare** (v. 17 grovnäbbad sångare), justeras då namnet är otydligt eftersom näbben endast är grov i förhållande till andra lövsångare, inte till övriga sångare; det nya namnet syftar på att arten oftast hittas i anslutning till bäckar och floder
- **bajkalsmygsångare** (v. 17 manchurisk smygsångare), anpassning till artens engelska namn
- **guinearävsångare** (v. 17 guinearostsångare), justering för att undvika förväxling med rostsångaren i släktet *Curruca*, vilken den inte är nära släkt med
- **kongorävsångare** (v. 17 kongorostsångare), se ovan

- **näktergalsgärdsmyg** (v. 17 nordlig näktergalsgärdsmyg), förenkling av namnet
- **fjällbröstad gärdsmyg** (v. 17 sydlig näktergalsgärdsmyg), förenkling av namnet i samband med justering av ovanstående art
- **söderhavsstare** (v. 17 polynesisk stare), justeras då en stor del av utbredningen, utöver Polynesien, är i Melanesien
- **gyllengumpad blomsterpickare** (v. 17 floresblomsterpickare), arten förekommer även på Sumbawa; floresblomsterpickare är ett lämpligare namn på *Dicaeum rhodopygiale*, som är endemisk för Flores, vilket överensstämmer med engelska och vetenskapliga namnet
- **zambezisolfågel** (v. 17 malawisolfågel), bättre beskrivning av artens utbredningsområde kring Zambezifloden
- **pampaspiplärka** (v. 17 chacopiplärka), missvisande namn då arten inte förekommer i slättlandet i Gran Chaco utan mer på pampas grässlätter
- **glasögonbusksparv** (v. 17 vanlig busksparv), ”vanlig” tas bort som förled på ett antal arter, till förmån för mer precisa eller informativa namn
- **gulbyxad snårsparv** (v. 17 gullårad snårsparv), -lårad ändras till det anatomiskt mer korrekta -byxad, då det hänvisar till färgen på fjäderdräkten
- **sonorasparv** (v. 17 rostvingad sparv), namnet justeras till att beskriva artens mycket begränsade utbredningsområde i Sonoraöknen; många olika sparvar har rostfärgade vingar
- **rödbröstad ängstrupial** (v. 17 soldatängstrupial), förtydligande av svårbegripligt namn
- **ponderosaskogssångare** (v. 17 gråkindad skogssångare), dålig beskrivning av artens utseende, ingen unik karaktär; ponderosa syftar på artens barrskogshabitat med inslag av ponderosatall
- **svartbyxad kardinal** (v. 17 svartlårad kardinal), -lårad ändras till det anatomiskt mer korrekta -byxad, då det hänvisar till färgen på fjäderdräkten
- **bläckkardinal** (v. 17 svartblå kardinal), beskrivningen av färgen justeras för att undvika förväxlingsrisk med blåsvart kardinal

Ytterligare några arter med eponymer i namnet, justeras till enklare och/eller mer informativa namn:

- **gråryggig albatross** (v. 17 salvinalbatross)
- **whakaupetrell** (v. 17 pycroftpetrell), efter Whakau (eng. Red Mercury Islands) där större delen av världspopulationen häckar
- **malajörn** (v. 17 wallaceörn)
- **sydlig filippindvärguv** (v. 17 everettdvärguv) – samtidigt justeras för konsekvens två systerarter (alla tre räknades tidigare som en art); **nordlig filippindvärguv** (v. 17 filippindvärguv) och **västlig filippindvärguv** (v. 17 negrosdvärguv)
- **fjäderfotad trogon** (v. 17 gouldtrogon)
- **amazontukanett** (v. 17 gouldtukanett)
- **snårspett** (v. 17 velasquezspett)
- **guadamyrsmyg** (v. 17 iheringmyrsmyg), *Guadua* är ett bambusläkte i Sydamerika

- **visselmyrfågel** (v. 17 willismyrfågel), efter artens karakteristiska läte
- **bambutapakul** (v. 17 spillmanntapakul)
- **campinadvärgtyrann** (v. 17 chicodvärgtyrann), efter campina, en ekoregion i Amazonas, med vegetation på näringsfattiga sandjordar med dålig avrinning
- **ockratyrann** (v. 17 eulertyrann)
- **svartmaskad tyrann** (v. 17 bairdtyrann)
- **skogstopptyrann** (v. 17 swainsontopptyrann)
- **epålettbatis** (v. 17 margaretbatis), efter honans epålettliknande vingteckning
- **papuavisslare** (v. 17 sclatervisslare)
- **granskrika** (v. 17 stellerskrika)
- **silverborstad parotia** (v. 17 Lawes strålparadisfågel), efter de silvriga borsten ovanför näbben (eng. supranarial tufts)
- **vitstjärtad grönbulbyl** (v. 17 sjöstedtgrönbulbyl)
- **smågrönbulbyl** (v. 17 ansorgegrönbulbyl)
- **svavelfärgad grönbulbyl** (v. 17 xaviergrönbulbyl)
- **katangagrönbulbyl** (v. 17 cabanisgrönbulbyl), efter provinsen Katanga i Kongo-Kinshasa som omfattar en stor del av utbredningen
- **brunkronad bulbyl** (v. 17 sharpegrönbulbyl)
- **systerbambusångare**. (v. 17 Alströms bambusångare), efter det vetenskapliga namnet *soror* som syftar på artens likhet med andra arter i komplexet
- **huangehesångare** (v. 17 claudiasångare), efter artens utbredning inom floden Huang Hes (Gula floden) avrinningsområde
- **wuyisångare** (v. 17 hartertsångare), efter Wuyibergen i östra Kina, där en betydande del av artens utbredning finns
- **hmongsångare** (v. 17 Kloss sångare), efter hmongfolket som överensstämmer med stora delar av artens utbredningsområde i södra Kina, norra Laos och Vietnam
- **rosthuvad apalis** (v. 17 chapinapalis)
- **sockersångare** (v. 17 jerdonsångare), då arten ofta förekommer i olika sorters *Saccharum*-gräs, sockerrör
- **rostgumpad timalia** (v. 17 Abbotts timalia)
- **sepiatimalia** (v. 17 horsfieldtimalia)
- **guizhoualkippa** (v. 17 davidalkippa), efter provinsen Guizhou i sydcentrala Kina – samtidigt preciseras namnet på en närbesläktad art: **guangdongalkippa** (v. 17 kinesisk alkippa), efter provinsen Guangdong, i sydöstra Kina
- **ljushättad fnittertrast** (v. 17 elliotfnittertrast)
- **sumpskriktrast** (v. 17 hartlaubskriktrast)
- **rostnackad gärdsmyg** (v. 17 sclatergärdsmyg)
- **mopaneglansstare** (v. 17 mevesglansstare), efter mopane, ett träd som är dominerande i södra Afrika på dåliga och framför allt salta jordar
- **kortstjärtad glansstare** (v. 17 wallerglansstare)
- **koboltstare** (v. 17 stuhlmannstare)

- **fläckflugsnappare** (v. 17 sodhifflugsnappare)
- **coelinflugsnappare** (v. 17 zappeyflugsnappare), efter färgen coelin (eng. azure)
- **visirsolfågel** (v. 17 reichenowsolfågel), efter den visirliknande teckningen på pannan och strupen
- **bergsolfågel** (v. 17 preussolfågel)
- **malawisolfågel** (v. 17 füllebornsolfågel)
- **kravattsolfågel** (v. 17 johannasolfågel), efter den lila halsteckningen
- **västlig maskvävare** (v. 17 heuglinvävare)
- **stråpiplärka** (v. 17 hellmayrpiplärka), efter artens preferens för habitat med halvhöga grässtrån, som inte är för höga eller för hårt nedbetande
- **törnsparv** (v. 17 shelleysparv)
- **aprikosparv** (v. 17 jankowskisparv), efter artens habitat – gräsmarker med inslag av aprikosträd
- **anitrupial** (v. 17 forbestrupial), efter dess likhet med göken ani
- **hallonbukig kardinal** (v. 17 rositakardinal)

Utöver ovanstående görs mindre justeringar av namnet på ett antal arter genom att namnet skrivs ihop eller isär för att få ett mer konsekvent språkbruk.

- fläcknäbbad and, fjäderfotad salangan, grågumpad salangan, vitvingad seglare, vitbukig seglare, kroknäbbad eremit, fjällstrupig eremit, nålnäbbad eremit, bronsstjärtad komet, rostgumpad kolibri, glödhakad kolibri, bronsstjärtad kolibri, fläckstrupig kolibri, svalstjärtad kolibri, vithakad safir, kortvingad gök, smalnäbbsglada, vitgumpad vråk, kopparstjärtad trogon, kroknäbbad kungsfiskare, skovelnäbbad kokaburra, eldnäbbad araçari, gulbuksspett, rostbuksspett, bronsvingad hackspett, eldvingad parakit, svarthättad parakit, blåvingad parakit, rostvingad minerare, kilnäbbad trädklättrare, pärlhalsad trädklättrare, svärtnäbbad trädklättrare, sabelnäbbad trädklättrare, vitvingad tapakul, smalfotad dvärgtyrann, svartnäbbad tyrann, citronbukig attila, svalstjärtad kotinga, sabelvingad piha, plommonstrupig kotinga, vitstjärtad kotinga, vitvingad kotinga, svavelbukig manakin, länstjärtad manakin, guldvingad manakin, snöhattad manakin, pärlhattad manakin, bandstjärtad manakin, rostgumpad lärka, tvärstjärtad bulbyl, svarthättad svala, rostbukig timalia, svarthakad timalia, pärlhalsad timalia, fläckhalsad timalia, brunvingad stare, rostvingad stare, svartvingad majna, pärlhalsad munia, vitgumpad munia, nålstjärtad amadin, rosennäbbad amadin, svarthättad astrild, bandstjärtad kasik, rosenstrupig kardinal och kägelnäbbad tangara

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund och Martin Stervander

Taxonomikommittén, 2 september 2024