Namnlistan, version 2025



Övergången från IOC till AviList medför många sammanslagningar av arter, men en ny art på listan är marañónmyrtörnskatan *Thamnophilus shumbae* i Peru. Foto: Markus Lagerqvist.

Version 2025 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av övergången från IOC:s världslista, version 15.1 (februari 2025) till den nya enade världslistan AviList v2025 (https://doi.org/10.2173/avilist.v2025**). Förändringar på släktesnivå, som inte påverkar de svenska namnen, redovisas inte här. Två nya ordningar ser dagens ljus, medan fyra familjer stryks.**

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Ekorrgök (*Piaya cayana*) delas upp i två arter:
    - ekorrgök (*Piaya cayana*), vidspridd i tropiska Amerika, från östra Mexiko söderut till norra Argentina och Uruguay och;
    - **västmexikansk gök** (*Piaya mexicana*), längs Mexikos Stillahavskust, från Sinaloa till Tehuántepecnäset.
- Fetärna (*Gygis alba*) delas upp i tre arter:
    - **atlantfetärna** (*Gygis alba*), i södra Atlanten;
    - **blånäbbad fetärna** (*Gygis candida*), från Indiska Oceanen österut till östra Polynesien, och;
    - **dvärgfetärna** (*Gygis microrhyncha*), på Marquesasöarna, Phoenixöarna och Line Islands.
- Kopparstjärtad trogon (*Trogon elegans*) delas upp i två arter:

    - **hondurastrogon** (*Trogon elegans*), från sydöstra Guatemala till nordvästra Costa Rica, och;
    - kopparstjärtad trogon (*Trogon ambiguus*), i Arizona och New Mexico, söderut till södra Mexiko, samt på Tres Marías-öarna.
- Gulkindad amazon (*Amazona autumnalis*) delas upp i två arter:
    - gulkindad amazon (*Amazona autumnalis*), från östra Mexiko till nordvästra Ecuador och nordvästra Venezuela, och;
    - **ecuadoramazon** (*Amazona lilacina*), i sydvästra Ecuador.
- Guyanaparakit (*Pyrrhura picta*) delas upp i tre arter:
    - guyanaparakit (*Pyrrhura picta*), från sydöstra Venezuela till Guyanaregionen och norra Brasilien;
    - **azueroparakit** (*Pyrrhura subandina*), numera troligen endast på Azuerohalvön i Panama (underarten *eisenmanni*), tidigare även i nordvästra Colombia (underarten *subandina*), troligen utdöd, och;
    - **perijáparakit** (*Pyrrhura caeruleiceps*), på västsluttningen av Östanderna i norra Colombia och i Sierra de Perijá.
- Antillerelenia (*Elaenia fallax*) delas upp i två arter:
    - **större jamaicaelenia** (*Elaenia fallax*), på Jamaica, och;
    - **hispaniolaelenia** (*Elaenia cherriei*), på Hispaniola.
- Svarttofsad myrtörnskata (*Sakesphorus canadensis*) delas upp i två arter:
    - svarttofsad myrtörnskata (*Sakesphorus canadensis*), från östra Colombia österut till Guyanaregionen och söderut till nordöstra Peru, och;
    - **strimpannad myrtörnskata** (*Sakesphorus pulchellus*), längs Karibiska kusten i norra Colombia och nordvästligaste Venezuela.
- Vitnackad myrtörnskata (*Thamnophilus bernardi*) delas upp i två arter:
    - **tumbesmyrtörnskata** (*Thamnophilus bernardi*), i torra områden i sydvästra Ecuador till nordcentrala Peru och Isla Puná, och;
    - **marañónmyrtörnskata** (*Thamnophilus shumbae*), i nordcentrala Peru (Río Marañóns avrinningsområde i Cajamarca och Amazonas).
- Rostpannad vireo (*Tunchiornis ochraceiceps*) delas upp i tre arter:
    - **ockrakronad vireo** (*Tunchiornis ochraceiceps*), från södra Mexiko, söderut till västra Ecuador;
    - **rostpannad vireo** (*Tunchiornis ferrugineifrons*), från sydöstra Colombia österut till nordvästra Brasilien och söderut till norra Bolivia;
    - **guyanavireo** (*Tunchiornis luteifrons*), i östligaste Venezuela, Guyanaregionen och norra Brasilien (öster om Rio Negro), och;
    - **brasilienvireo** (*Tunchiornis rubrifrons*), i norra Brasilien söder om Amazonfloden och nordöstra Brasilien.
- Rödbent trast (*Turdus plumbeus*) delas upp i två arter:
    - **kubatrast** (*Turdus plumbeus*), i norra Bahamas, på Kuba, Isla de la Juventud och Cayman Brac, och;

    - **asktrast** (*Turdus ardosiaceus*), på Dominica, Hispaniola, Gonâve, Turtuga och Puerto Rico.
- Vitkindad snårsparv (*Melozone leucotis*) delas upp i två arter:
    - vitkindad snårsparv (*Melozone leucotis*), från östcentrala Honduras söderut till centrala Costa Rica, och;
    - **gråkronad snårsparv** (*Melozone occipitalis*), från södra Mexiko (Chiapas) till Guatemala och El Salvador.
- Amazontrastkardinal (*Granatellus pelzelni*) delas upp i två arter:
    - amazontrastkardinal (*Granatellus pelzelni*), från sydöstra Venezuela till Guyana, Surinam, centrala Brasilien, och norra Bolivia, och;
    - **tocantinstrastkardinal** (*Granatellus paraensis*), i tropiska norra Brasilien (östra Pará, Maranhão och Tocantins).

137 arter stryks från listan:

- Andinsk kopparand (*Oxyura ferruginea*) slås samman med amerikansk kopparand (*Oxyura jamaicensis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **amerikansk kopparand** (*Oxyura jamaicensis*).
- Amerikansk kricka (*Anas carolinensis*) slås samman med kricka (*Anas crecca*). Den sammanslagna arten behåller namnet **kricka** (*Anas crecca*).
- Indonesisk smådopping (*Tachybaptus tricolor*) slås samman med smådopping (*Tachybaptus ruficollis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **smådopping** (*Tachybaptus ruficollis*).
- Kaisporrgök (*Centropus spilopterus*) slås samman med fasansporrgök (*Centropus phasianinus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **fasansporrgök** (*Centropus phasianinus*).
- Panamaduva (*Leptotila battyi*) slås samman med gråhuvad duva (*Leptotila plumbeiceps*). Den sammanslagna arten behåller namnet **gråhuvad duva** (*Leptotila plumbeiceps*).
- Ryukyugrönduva (*Treron permagnus*) slås samman med taiwangrönduva (*Leptotila plumbeiceps*). Den sammanslagna arten får namnet **visselgrönduva** (*Leptotila plumbeiceps*).
- Sundapurpurhöna (*Porphyrio indicus*), afrikansk purpurhöna (*Porphyrio madagascariensis*), australisk purpurhöna (*Porphyrio melanotus*), gråhuvad purpurhöna (*Porphyrio poliocephalus*) och filippinpurpurhöna (*Porphyrio pulverulentus*) slås samman med västlig purpurhöna (*Porphyrio porphyrio*). Den sammanslagna arten får namnet **purpurhöna** (*Porphyrio porphyrio*).
- Vitkronad styltlöpare (*Himantopus melanurus*) slås samman med amerikansk styltlöpare (*Himantopus mexicanus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **amerikansk styltlöpare** (*Himantopus mexicanus*).
- Cayennetärna (*Thalasseus acuflavidus*) slås samman med kentsk tärna (*Thalasseus sandvicensis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **kentsk tärna** (*Thalasseus sandvicensis*).

- Campbellalbatross (*Thalassarche impavida*) slås samman med svartbrynad albatross (*Thalassarche melanophris*). Den sammanslagna arten behåller namnet **svartbrynad albatross** (*Thalassarche melanophris*).
- Balearisk lira (*Puffinus mauretanicus*) slås samman med medelhavslira (*Puffinus yelkouan*). Den sammanslagna arten behåller namnet **medelhavslira** (*Puffinus yelkouan*).
- Vanuatupetrell (*Pterodroma occulta*) slås samman med vithalsad petrell (*Pterodroma cervicalis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **vithalsad petrell** (*Pterodroma cervicalis*).
- Antarktisskarv (*Leucocarbo bransfieldensis*), sydgeorgisk skarv (*Leucocarbo georgianus*), crozetskarv (*Leucocarbo melanogenis*), heardskarv (*Leucocarbo nivalis*), macquarieskarv (*Leucocarbo purpurascens*) och kerguelenskarv (*Leucocarbo verrucosus*) slås samman med kejsarskarv (*Leucocarbo atriceps*). Den sammanslagna arten behåller namnet **kejsarskarv** (*Leucocarbo atriceps*).
- Kusthäger (*Egretta dimorpha*) slås samman med silkeshäger (*Egretta garzetta*). Den sammanslagna arten behåller namnet **silkeshäger** (*Egretta garzetta*).
- Karstseglare (*Apus cooki*), himalayaseglare (*Apus leuconyx*) och tibetseglare (*Apus salimalii*) slås samman med orientseglare (*Apus pacificus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **orientseglare** (*Apus pacificus*).
- Biokoseglare (*Apus sladeniae*) slås samman med kapseglare (*Apus barbatus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **kapseglare** (*Apus barbatus*).
- Marquesassalangan (*Aerodramus ocistus*) slås samman med tahitisalangan (*Aerodramus leucophaeus*). Den sammanslagna arten får namnet **polynesisk salangan** (*Aerodramus leucophaeus*).
- Gråstjärtad bergsjuvel (*Lampornis cinereicauda*) slås samman med vitstrupig bergsjuvel (*Lampornis castaneoventris*). Den sammanslagna arten behåller namnet **vitstrupig bergsjuvel** (*Lampornis castaneoventris*).
- Yucatánsabelvinge (*Pampa pampa*) slås samman med mexikansk sabelvinge (*Pampa curvipennis*). Den sammanslagna arten får namnet **kilstjärtad sabelvinge** (*Pampa curvipennis*).
- Brunsidig smaragd (*Leucolia wagneri*) slås samman med grönpannad smaragd (*Leucolia viridifrons*). Den sammanslagna arten flyttas till släktet *Ramosomyia* och får namnet **grönpannad smaragd** (*Ramosomyia viridifrons*).
- Mindre sottornuggla (*Tyto multipunctata*) slås samman med större sottornuggla (*Tyto tenebricosa*). Den sammanslagna arten får namnet **sottornuggla** (*Tyto tenebricosa*).
- Manustornuggla (*Tyto manusi*) och molucktornuggla (*Tyto sororcula*) slås samman med masktornuggla (*Tyto novaehollandiae*). Den sammanslagna arten behåller namnet **masktornuggla** (*Tyto novaehollandiae*).
- Trollsparvuggla (*Glaucidium californicum*), guatemalasparvuggla (*Glaucidium cobanense*) och californiasparvuggla (*Glaucidium hoskinsii*) slås samman med mexikansk sparvuggla (*Glaucidium gnoma*). Den sammanslagna arten tar namnet **trollsparvuggla** (*Glaucidium gnoma*).

- Annobóndvärguv (*Otus feae*) slås samman med afrikansk dvärguv (*Otus senegalensis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **afrikansk dvärguv** (*Otus senegalensis*).
- Västlig madagaskardvärguv (*Otus madagascariensis*) slås samman med östlig madagaskardvärguv (*Otus rutilus*). Den sammanslagna arten får namnet **madagaskardvärguv** (*Otus rutilus*).
- Atlaskattuggla (*Strix mauritanica*) slås samman med kattuggla (*Strix aluco*). Den sammanslagna arten behåller namnet **kattuggla** (*Strix aluco*).
- Vitbröstad sparvhök (*Accipiter chionogaster*), rostbyxad sparvhök (*Accipiter erythronemius*) och inkasparvhök (*Accipiter ventralis*) slås samman med amerikansk sparvhök (*Accipiter striatus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **amerikansk sparvhök** (*Accipiter striatus*).
- Gulnäbbad glada (*Milvus aegyptius*) slås samman med brun glada (*Milvus migrans*). Den sammanslagna arten behåller namnet **brun glada** (*Milvus migrans*).
- Kapverdevråk (*Buteo bannermani*) slås samman med ormvråk (*Buteo buteo*). Den sammanslagna arten behåller namnet **ormvråk** (*Buteo buteo*).
- Niaukungsfiskare (*Todiramphus gertrudae*) slås samman med mangarevakungsfiskare (*Todiramphus gambieri*). Den sammanslagna arten får namnet **tuamotukungsfiskare** (*Todiramphus gambieri*).
- Usambirobarbett (*Trachyphonus usambiro*) slås samman med bomabarbett (*Trachyphonus darnaudii*). Den sammanslagna arten behåller namnet **bomabarbett** (*Trachyphonus darnaudii*).
- Maracaibotukan (*Ramphastos citreolaemus*) slås samman med gulbröstad tukan (*Ramphastos vitellinus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **gulbröstad tukan** (*Ramphastos vitellinus*).
- Strimnäbbad arassari (*Pteroglossus sanguineus*) slås samman med bleknäbbad arassari (*Pteroglossus erythropygius*). Den sammanslagna arten tar namnet **strimnäbbad arassari** (*Pteroglossus erythropygius*).
- Blåbandad tukanett (*Aulacorhynchus coeruleicinctis*) och gulpannad tukanett (*Aulacorhynchus wagleri*) slås samman med smaragdtukanett (*Aulacorhynchus prasinus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **smaragdtukanett** (*Aulacorhynchus prasinus*).
- Svartstrupig tukanett (*Aulacorhynchus atrogularis*) slås samman med andinsk tukanett (*Aulacorhynchus albivitta*). Den sammanslagna arten behåller namnet **andinsk tukanett** (*Aulacorhynchus albivitta*).
- Sumatragröngöling (*Picus dedemi*) slås samman med gråspett (*Picus canus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **gråspett** (*Picus canus*).
- Prickspett (*Campethera cailliautii*) slås samman med grönryggig hackspett (*Campethera maculosa*). Den sammanslagna arten behåller namnet **grönryggig hackspett** (*Campethera maculosa*).
- Bronsvingad hackspett (*Colaptes aeruginosus*) slås samman med olivgul hackspett (*Colaptes rubiginosus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **olivgul hackspett** (*Colaptes rubiginosus*).

- Vitpannad papegoja (*Pionus seniloides*) slås samman med plommonhuvad papegoja (*Pionus tumultuosus*). Den sammanslagna arten får namnet **fläckhuvad papegoja** (*Pionus tumultuosus*).
- Mindre antipodparakit (*Cyanoramphus hochstetteri*) slås samman med rödpannad parakit (*Cyanoramphus novaezelandiae*). Den sammanslagna arten behåller namnet **rödpannad parakit** (*Cyanoramphus novaezelandiae*).
- Lordhoweparakit (*Cyanoramphus subflavescens*) slås samman med norfolkparakit (*Cyanoramphus cookii*). Den sammanslagna arten behåller namnet **norfolkparakit** (*Cyanoramphus cookii*).
- Palkachupakotinga (*Phibalura boliviana*) slås samman med svalstjärtad kotinga (*Phibalura flavirostris*). Den sammanslagna arten behåller namnet **svalstjärtad kotinga** (*Phibalura flavirostris*).
- Gulkindad bekard (*Pachyramphus xanthogenys*) slås samman med grönryggig bekard (*Pachyramphus viridis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **grönryggig bekard** (*Pachyramphus viridis*).
- Olivstrimmig tyrann (*Mionectes galbinus*) slås samman med costaricatyrann (*Mionectes olivaceus*). Den sammanslagna arten tar namnet **olivstrimmig tyrann** (*Mionectes olivaceus*).
- Santamartadvärgtyrann (*Zimmerius minimus*) slås samman med gulmaskad dvärgtyrann (*Zimmerius chrysops*). Den sammanslagna arten behåller namnet **gulmaskad dvärgtyrann** (*Zimmerius chrysops*).
- Lojadvärgtyrann (*Zimmerius flavidifrons*) slås samman med perudvärgtyrann (*Zimmerius viridiflavus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **perudvärgtyrann** (*Zimmerius viridiflavus*).
- Chileelenia (*Elaenia chilensis*) slås samman med vittofsad elenia (*Elaenia albiceps*). Den sammanslagna arten behåller namnet **vittofsad elenia** (*Elaenia albiceps*).
- Sancristóbaltyrann (*Pyrocephalus dubius*) slås samman med häxtyrann (*Pyrocephalus nanus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **häxtyrann** (*Pyrocephalus nanus*).
- Cinnobertyrann (*Pyrocephalus obscurus*) slås samman med rubintyrann (*Pyrocephalus rubinus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **rubintyrann** (*Pyrocephalus rubinus*).
- Silversidig myrsmyg (*Myrmotherula luctuosa*) slås samman med vitsidig myrsmyg (*Myrmotherula axillaris*). Den sammanslagna arten behåller namnet **vitsidig myrsmyg** (*Myrmotherula axillaris*).
- Arfakkattfågel (*Ailuroedus arfakianus*), huonkattfågel (*Ailuroedus astigmaticus*), nordlig kattfågel (*Ailuroedus jobiensis*) och svartkronad kattfågel (*Ailuroedus melanocephalus*) slås samman med svartörad kattfågel (*Ailuroedus melanotis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **svartörad kattfågel** (*Ailuroedus melanotis*).
- Huonlövsalsfågel (*Amblyornis germanus*) slås samman med fackellövsalsfågel (*Amblyornis macgregoriae*). Den sammanslagna arten behåller namnet **fackellövsalsfågel** (*Amblyornis macgregoriae*).

- Scharlakansminivett (*Pericrocotus speciosus*) slås samman med eldminivett (*Pericrocotus flammeus*). Den sammanslagna arten tar namnet **scharlakansminivett** (*Pericrocotus flammeus*).
- Manusgråfågel (*Coracina ingens*) slås samman med vitbukig gråfågel (*Coracina papuensis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **vitbukig gråfågel** (*Coracina papuensis*).
- Waigeotörntrast (*Colluricincla affinis*), tagulatörntrast (*Colluricincla discolor*), variabel törntrast (*Colluricincla fortis*), mamberamotörntrast (*Colluricincla obscura*), rosttörntrast (*Colluricincla rufogaster*) och sepiktörntrast (*Colluricincla tappenbecki*) slås samman med arafuratörntrast (*Colluricincla megarhyncha*). Den sammanslagna arten får namnet **mindre törntrast** (*Colluricincla megarhyncha*).
- Västaustralisk visslare (*Pachycephala fuliginosa*) slås samman med guldvisslare (*Pachycephala pectoralis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **guldvisslare** (*Pachycephala pectoralis*).
- Kanelbröstad visslare (*Pachycephala johni*) slås samman med gråbrun visslare (*Pachycephala griseonota*). Den sammanslagna arten behåller namnet **gråbrun visslare** (*Pachycephala griseonota*).
- Biaksolfjäderstjärt (*Rhipidura kordensis*) slås samman med gråbröstad solfjäderstjärt (*Rhipidura rufiventris*). Den sammanslagna arten behåller namnet **gråbröstad solfjäderstjärt** (*Rhipidura rufiventris*).
- Tagulamanukod (*Manucodia alter*) slås samman med svart manukod (*Manucodia ater*). Den sammanslagna arten behåller namnet **svart manukod** (*Manucodia ater*).
- Grönskrika (*Cyanocorax luxuosus*) slås samman med inkaskrika (*Cyanocorax yncas*). Den sammanslagna arten tar namnet **grönskrika** (*Cyanocorax yncas*).
- Gråkråka (*Corvus cornix*) slås samman med svartkråka (*Corvus corone*). Den sammanslagna arten får namnet **kråka** (*Corvus corone*).
- Indisk djungelkråka (*Corvus culminatus*) och östlig djungelkråka (*Corvus levaillantii*) slås samman med stornäbbad kråka (*Corvus macrorhynchos*). Den sammanslagna arten behåller namnet **stornäbbad kråka** (*Corvus macrorhynchos*).
- Benguelalärka (*Certhilauda benguelensis*) slås samman med namaqualärka (*Certhilauda subcoronata*). Den sammanslagna arten behåller namnet **namaqualärka** (*Certhilauda subcoronata*).
- Agulhaslärka (*Certhilauda brevirostris*) slås samman med kaplärka (*Certhilauda curvirostris*). Den sammanslagna arten behåller namnet **kaplärka** (*Certhilauda curvirostris*).
- Maghreblärka (*Galerida macrorhyncha*) slås samman med tofslärka (*Galerida cristata*). Den sammanslagna arten behåller namnet **tofslärka** (*Galerida cristata*).
- Gråryggig kamaroptera (*Camaroptera brevicaudata*) slås samman med grönryggig kamaroptera (*Camaroptera brachyura*). Den sammanslagna arten får namnet **trumpetkamaroptera** (*Camaroptera brachyura*).

- Brunstjärtad apalis (*Apalis flavocincta*) slås samman med gulbröstad apalis (*Apalis flavida*). Den sammanslagna arten behåller namnet **gulbröstad apalis** (*Apalis flavida*).
- Anjouansångare (*Nesillas longicaudata*) slås samman med tsikiritysångare (*Nesillas typica*). Den sammanslagna arten behåller namnet **tsikiritysångare** (*Nesillas typica*).
- Svartbrynad stjärtmes (*Aegithalos bonvaloti*) slås samman med roststjärtmes (*Aegithalos iouschistos*). Den sammanslagna arten tar namnet **svartbrynad stjärtmes** (*Aegithalos iouschistos*).
- Floressångare (*Phylloscopus floresianus*) slås samman med timorsångare (*Phylloscopus presbytes*). Den sammanslagna arten behåller namnet **timorsångare** (*Phylloscopus presbytes*).
- Kakamegagrönbulbyl (*Arizelocichla kakamegae*) slås samman med tanzaniagrönbulbyl (*Arizelocichla masukuensis*). Den sammanslagna arten får namnet **barkgrönbulbyl** (*Arizelocichla masukuensis*).
- Brunkronad grönbulbyl (*Phyllastrephus alfredi*) slås samman med gulstrimmig grönbulbyl (*Phyllastrephus flavostriatus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **gulstrimmig grönbulbyl** (*Phyllastrephus flavostriatus*).
- Mohéliglasögonfågel (*Zosterops comorensis*), aldabraglasögonfågel (*Zosterops aldabrensis*) och anjouanglasögonfågel (*Zosterops anjuanensis*) slås samman med madagaskarglasögonfågel (*Zosterops maderaspatanus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **madagaskarglasögonfågel** (*Zosterops maderaspatanus*).
- Svavelstrupig glasögonfågel (*Zosterops chrysolaemus*) slås samman med grönpannad glasögonfågel (*Zosterops minor*). Den sammanslagna arten tar namnet **svavelstrupig glasögonfågel** (*Zosterops minor*).
- Oyatabuglasögonfågel (*Zosterops crookshanki*) slås samman med svarthuvad glasögonfågel (*Zosterops fuscicapilla*). Den sammanslagna arten får namnet **sothuvad glasögonfågel** (*Zosterops fuscicapilla*).
- Östborneotimalia (*Pellorneum poliogene*) och glissandotimalia (*Pellorneum saturatum*) slås samman med klagotimalia (*Pellorneum malaccense*). Den sammanslagna arten får namnet **kortstjärtad timalia** (*Pellorneum malaccense*).
- Borneoflodtimalia (*Pellorneum macropterum*) slås samman med malajflodtimalia (*Pellorneum rostratum*). Den sammanslagna arten får namnet **flodtimalia** (*Pellorneum rostratum*).
- Inambarimyggsnappare (*Polioptila attenboroughi*) och rionegromyggsnappare (*Polioptila facilis*) slås samman med amazonmyggsnappare (*Polioptila paraensis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **amazonmyggsnappare** (*Polioptila paraensis*).
- Niasbeostare (*Gracula robusta*) slås samman med beostare (*Gracula religiosa*). Den sammanslagna arten behåller namnet **beostare** (*Gracula religiosa*).
- Violetthuvad stare (*Aplonis circumscripta*) slås samman med metallstare (*Aplonis metallica*). Den sammanslagna arten behåller namnet **metallstare** (*Aplonis metallica*).

- Malabarstare (*Sturnia blythii*) slås samman med gråhuvad stare (*Sturnia malabarica*). Den sammanslagna arten behåller namnet **gråhuvad stare** (*Sturnia malabarica*).
- Tyrrensk flugsnappare (*Muscicapa tyrrhenica*) slås samman med grå flugsnappare (*Muscicapa striata*). Den sammanslagna arten behåller namnet **grå flugsnappare** (*Muscicapa striata*).
- Amurbuskskvätta (*Saxicola stejnegeri*) slås samman med vitgumpad buskskvätta (*Saxicola maurus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **vitgumpad buskskvätta** (*Saxicola maurus*).
- Ruahatermitskvätta (*Myrmecocichla collaris*) slås samman med miombotermitskvätta (*Myrmecocichla arnotti*). Den sammanslagna arten behåller namnet **miombotermitskvätta** (*Myrmecocichla arnotti*).
- Maghrebstenskvätta (*Oenanthe halophila*) och basaltstenskvätta (*Oenanthe warriae*) slås samman med sorgstenskvätta (*Oenanthe lugens*). Den sammanslagna arten behåller namnet **sorgstenskvätta** (*Oenanthe lugens*).
- Nyikasolfågel (*Cinnyris whytei*) slås samman med ruwenzorisolfågel (*Cinnyris stuhlmanni*). Den sammanslagna arten behåller namnet **ruwenzorisolfågel** (*Cinnyris stuhlmanni*).
- Australisk zebrafink (*Taeniopygia castanotis*) slås samman med sundazebrafink (*Taeniopygia guttata*). Den sammanslagna arten får namnet **zebrafink** (*Taeniopygia guttata*).
- Vanuatuamadin (*Erythrura regia*) slås samman med papegojamadin (*Erythrura cyaneovirens*). Den sammanslagna arten får namnet **kungsamadin** (*Erythrura cyaneovirens*).
- Elegant rosenfink (*Carpodacus lepidus*) slås samman med långstjärtad rosenfink (*Carpodacus sibiricus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **långstjärtad rosenfink** (*Carpodacus sibiricus*).
- Boningrönfink (*Chloris kittlitzi*) slås samman med orientgrönfink (*Chloris sinica*). Den sammanslagna arten behåller namnet **orientgrönfink** (*Chloris sinica*).
- Tjocknäbbad rävsparv (*Passerella megarhyncha*), skifferrävsparv (*Passerella schistacea*) och brun rävsparv (*Passerella unalaschcensis*) slås samman med rosträvsparv (*Passerella iliaca*). Den sammanslagna arten får namnet **rävsparv** (*Passerella iliaca*).
- Méridasnårsparv (*Atlapetes meridae*) slås samman med mustaschsnårsparv (*Atlapetes albofrenatus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **mustaschsnårsparv** (*Atlapetes albofrenatus*).
- Karmosingumpad kasik (*Cacicus microrhynchus*) slås samman med höglandskasik (*Cacicus uropygialis*). Den sammanslagna arten får namnet **scharlakansgumpad kasik** (*Cacicus uropygialis*).
- Chiriquígulhake (*Geothlypis chiriquensis*) slås samman med olivkronad gulhake (*Geothlypis semiflava*). Den sammanslagna arten behåller namnet **olivkronad gulhake** (*Geothlypis semiflava*).
- Gulhakad skogssångare (*Setophaga auduboni*) och guatemalaskogssångare (*Setophaga goldmani*) slås samman med myrtenskogssångare (*Setophaga*

coronata). Den sammanslagna arten får namnet **gulgumpad skogssångare** (*Setophaga coronata*).

- Tepuískogssångare (*Myiothlypis roraimae*) slås samman med tvåbandad skogssångare (*Myiothlypis bivittata*). Den sammanslagna arten behåller namnet **tvåbandad skogssångare** (*Myiothlypis bivittata*).
- Tegelröd kardinal (*Piranga hepatica*) och tandkardinal (*Piranga lutea*) slås samman med caatingakardinal (*Piranga flava*). Den sammanslagna arten tar namnet **tegelröd kardinal** (*Piranga flava*).
- Gultofsad daknis (*Dacnis egregia*) slås samman med svartmaskad daknis (*Dacnis lineata*). Den sammanslagna arten behåller namnet **svartmaskad daknis** (*Dacnis lineata*).
- Citrongumpad tangara (*Ramphocelus icteronotus*) slås samman med eldgumpad tangara (*Ramphocelus flammigerus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **eldgumpad tangara** (*Ramphocelus flammigerus*).
- Vitbrynad tangara (*Kleinothraupis auricularis*) slås samman med svartkronad tangara (*Kleinothraupis atropileus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **svartkronad tangara** (*Kleinothraupis atropileus*).

Ändringar på högre nivå

- Två nya ordningar bryts ut:
    - **kondorfåglar** (Cathartiformes), omfattande familjen kondorer (*Cathartidae*), bryts ut från hökfåglarna (Accipitriformes), och;
    - **jakamar- och trögfåglar** (Galbuliformes), omfattande familjerna jakamarer (*Galbulidae*) och trögfåglar (*Bucconidae*), bryts ut från hackspettartade fåglar (Piciformes).
- Fyra familjer stryks:
    - Hornkorpar (*Bucorvidae*) införlivas i näshornsfåglar (*Bucerotidae*).
    - Snårsångare (*Scotocercidae*) införlivas i cettior (*Cettiidae*).
    - Alkippor (*Alcippeidae*) införlivas i fnittertrastar (*Leiothrichidae*).
    - Ikterior (*Icteriidae*) införlivas i trupialer (*Icteridae*).

Namnjusteringar

Ytterligare några namn justeras, av taxonomiska skäl eller för att nuvarande namn är bristfälliga. För förklaring av geografiska namn m.m. se ordlistan med geografiska namn, biotopnamn, folkslag m.m. på TK:s webbplats.

- Några eponymer justeras till namn som säger mer om arterna:
    - Wilsonbeckasin justeras till **amerikansk beckasin**.
    - Wilsonsimsnäppa justeras till **präriesimsnäppa** efter artens levnadsmiljö.
    - Rüppelgam justeras till **fläckgam** efter artens utseende.

    - Scopolilira justeras till **diomedeslira** efter det vetenskapliga artepitetet *diomedea*. Namnet ger även associationer till Medelhavet; Diomedes var en kung i den grekiska mytologin. När Diomedes dog blev hans följeslagare så förtvivlade att de förvandlades till havsfåglar som sörjde honom i sång.
    - Boydlira ändras till **mindre kapverdelira** efter häckningsområdet, samtidigt justeras kapverdelira till **större kapverdelira**.
    - Alexanderparakit (*Psittacula eupatria*) – världens största parakit – justeras till **storparakit**. Namnet alexanderparakit kommer av att Alexander den store enligt sägnen exporterade stora antal papegojor till Europa. Att sägnen skulle kunna kopplas till just denna art är högst oklart då det vetenskapliga namnet *Psittacula alexandri* syftar på arten mustaschparakit, vilket spär på förvirringen. De exporterade papegojorna beskrivs också som blåkindade och små, vilket inte stämmer in på arten.
    - Dupontlärka får namnet **skymningslärka**, eftersom arten är känd för att sjunga under dygnets mörka timmar och särskilt i skymning och gryning.
    - Cettisångare justeras till **sumpcettia**. Cettior är inte nära släkt med familjer som rörsångare eller sylvior, men däremot med stjärtmesar! Övriga arter i släktet *Cettia*, liksom merparten av arterna i familjen, kallas cettior. Arten är till skillnad från övriga cettior tätt knuten till olika blöta habitat under häckningstiden.
    - Moltonisångare får namnet **rosensångare**, efter dess laxrosa undersida, vilken särskiljer den från systerarterna rostsångare och rödstrupig sångare.
    - Krüpers nötväcka justeras till **turknötväcka**, då arten är närapå endemisk för Turkiet.
- I samband med att sädgås delas upp i två arter på Sverigelistan justeras namnen på arterna till **skogsgås** (tidigare underarten tajgasädgås) respektive **tundragås** (tidigare underarten tundrasädgås).
- Gråhättad grönduva justeras till **rosahalsad grönduva**, vilket bättre beskriver artens utseende.
- Aztektärna ändras till **californiatärna**, då arten inte förekommer i det område som omfattades av Aztekriket. Arten häckar runt Californiahalvön, med den största kolonin på Isla Raza i Californiaviken i Mexiko.
- Genetiska studier har visat att skogssabelnäbb tillhör skratthärfåglarna, varför den flyttas till släktet *Rhinopomastus* och det svenska namnet justeras till **skogsskratthärfågel**.
- Moluckkakadua får det mer informativa namnet **seramkakadua**, då arten är nära endemisk för ön Seram och det finns flera arter kakaduor i Moluckerna.
- Niamniampapegoja ändras till **azandepapegoja**, då niamniam är en nedsättande beteckning på folkgruppen azande, som finns i ungefär samma område i centrala Afrika som papegojan. Ordet niamniam är ljudhärmande och är menat att beskriva ljudet av kannibalism.
- Större antipodparakit justeras till **antipodparakit** efter att mindre antipodparakit slås samman med rödpannad parakit.

- Jamaicaelenia justeras till **mindre jamaicaelenia** i samband med att större jamaicaelenia får artstatus och ön därmed får två endemiska elenior.
- Östlig sammetshätta är inte en östlig systerart till sammetshättan och får namnet **tamarisksångare** efter förekomsten i torra buskmarker med tamarisker.
- I samband med att gulärlan delas upp i två arter även på Sverigelistan får den östliga arten namnet **beringärla** efter förekomsten på båda sidor av Berings sund, till största delen i den del av nordöstra Asien och Alaska som utgör området Beringia.
- Gulhuvad ängstrupial ändras till **kärrtrupial**, då den endast är avlägset släkt med ängstrupialerna (släktena *Sturnella* och *Leistes*).
- Rödgumpad kasik justeras till det mer rättvist beskrivande **rödryggig kasik**.

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund, Martin Stervander, TK,
7 juni 2025.

Två småfel rättades 28 sept 2025 i listan, som därför bytte namn till NL2025**b**;

De svenska namnen på strutsarna var omkastade och nyzeelandspökuggla rättades till nyazeelandspökuggla.

Namnlistan, version 19



IOC delar upp skogsskvättan i tre arter, på bilden en orangebröstad skogsskvätta *Stiphrornis erythrothorax* från Sierra Leone. Foto: Markus Lagerqvist.

Version 19 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 15.1 (februari 2025). Liksom i IOC:s förra uppdatering görs ett antal ändringar på släktesnivå som inte påverkar de svenska namnen och därför inte redovisas här. Två nya familjer ser dagens ljus.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Klipphopparpingvin (*Eudyptes chrysocome*) delas upp i två arter:
    - **östlig klipphopparpingvin** (*E. filholi*), på Prince Edwardöarna, Crozetöarna, Kerguelen, Heardön, Macquarieön, Antipodöarna, Aucklandöarna och Campbellöarna, och;
    - **västlig klipphopparpingvin** (*E. chrysocome*), på öar i södra Chile inkl. Kap Horn, samt på Falklandsöarna.
- Mangrovehäger (*Butorides striata*) delas upp i två arter:
    - **mangrovehäger** (*B. atricapilla*), i Gamla världen, från Afrika österut till Polynesien, och;
    - **strimhäger** (*B. striata*), i tropiska Amerika.
- Olomao (*Myadestes lanaiensis*) delas upp i två arter:
    - **amaui** (*M. woahensis*), på tidigare på Oahu, numera utdöd, och;
    - olomao (*M. lanaiensis*), på Lanai och Molokai (senast observerad 1980).

- Svartryggig trast (*Zoothera talaseae*) delas upp i två arter:
    - **newbritaintrast** (*Z. talaseae*), på New Britan och den mindre grannön Umboi, och;
    - **svartryggig trast** (*Z. atrigena*), på Bougainville.
- Skogsskvätta (*Stiphrornis erythrothorax*) delas upp i tre arter:
    - **orangebröstad skogsskvätta** (*Stiphrornis erythrothorax*), från Sierra Leone österut till centrala Kamerun och norra Gabon, samt på Bioko;
    - **gulbröstad skogsskvätta** (*S. xanthogaster*), från sydöstra Kamerun och nordöstra Gabon till sydvästra Centralafrikanska Republiken och nordcentrala Kongo-Kingshasa, och;
    - **olivryggig skogsskvätta** (*S. pyrrholaemus*), i västra och nordöstra Gabon och sydvästra Kongo-Brazzaville.
- Aposolfågel (*Aethopyga boltoni*) delas upp i två arter:
    - aposolfågel (*A. boltoni*), i bergområden på västra, östcentrala och östra Mindanao, och;
    - **tbolisolfågel** (*A. tibolii*), i bergområden på södra Mindanao.
- Halsbandssparv (*Arremon taciturnus*) delas upp i två arter:
    - **méridasparv** (*A. axillaris*), i nordöstra Colombia och västra Venezuela, och;
    - halsbandssparv (*A. taciturnus*), i nordvästra Sydamerika och Amazonasområdet.
- Svarthuvad tangara (*Stilpnia cyanoptera*) delas upp i två arter:
    - svarthuvad tangara (*S. cyanoptera*), från Colombia till norra Venezuela, och;
    - **tepuítangara** (*S. whitelyi*), i Venezuela, Guyana och norra Brasilien.

38 arter stryks från listan:

- Udzungwahöna (*Xenoperdix udzungwensis*) slås samman med rubehohöna (*X. obscuratus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **udzungwahöna** (*X. udzungwensis*).
- Thaisånghöna (*Arborophila diversa*) slås samman med kambodjasånghöna (*A. cambodiana*). Den sammanslagna arten får namnet **kardemummasånghöna** (*A. cambodiana*), efter utbredningen i Kardemummabergen på gränsen mellan Thailand och Kambodja.
- Vitbröstad skarv (*Phalacrocorax lucidus*) slås samman med storskarv (*Ph. carbo*). Den sammanslagna arten behåller namnet **storskarv** (*Ph. carbo*).
- Otagoskarv (*Leucocarbo chalconotus*) slås samman med foveauxskarv (*L. stewarti*). Den sammanslagna arten får namnet **stewartskarv** (*L. chalconotus*).
- Bantuhök (*Aerospiza tachiro*) slås samman med rödbröstad hök (*A. toussenelii*). Den sammanslagna arten behåller namnet **bantuhök** (*A. tachiro*).
- Härfågel (*Upupa epops*) slås samman med afrikansk härfågel (*U. africana*). Den sammanslagna arten behåller namnet **härfågel** (*U. epops*).

- Violett skratthärfågel (*Phoeniculus damarensis*) slås samman med kenyaskratthärfågel (*Ph. granti*). Den sammanslagna arten behåller namnet **violett skratthärfågel** (*Ph. damarensis*).
- Caatingatrögfågel (*Nystalus maculatus*) slås samman med chacotrögfågel (*N. striatipectus*). Den sammanslagna arten får namnet **fläckryggig trögfågel** (*N. maculatus*).
- Vitnäbbad araçari (*Pteroglossus azara*) slås samman med brunnäbbad araçari (*P. mariae*). Den sammanslagna arten får namnet **vitnäbbad arassari** (*P. zara*). Se "Övriga justeringar" angående tecknet ç.
- Gulpannad hackspett (*Melanerpes aurifrons*) slås samman med snårspett (*M. santacruzi*). Den sammanslagna arten behåller namnet **gulpannad hackspett** (*M. aurifrons*).
- Grön parakit (*Psittacara holochlorus*) slås samman med rödhakad parakit (*P. rubritorquis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **grön parakit** (*P. holochlorus*).
- Halsbandsmånbröst (*Melanopareia torquata*) slås samman med boliviamånbröst (*M. bitorquata*). Den sammanslagna arten behåller namnet **halsbandsmånbröst** (*M. torquata*).
- Buskdvärgtyrann (*Nesotriccus incomtus*) slås samman med musfärgad dvärgtyrann (*N. murinus*). Den sammanslagna arten behåller namnet **musfärgad dvärgtyrann** (*N. murinus*).
- Hjälmmunkskata (*Philemon buceroides*), papuamunkskata (*Ph. novaeguineae*) och kapyorkmunkskata (*Ph. yorki*) slås samman till en art. Den sammanslagna arten behåller namnet **hjälmmunkskata** (*Ph. buceroides*).
- Större busksmyg (*Sericornis nouhuysi*) slås samman med sepikbusksmyg (*S. virgatus*). Den sammanslagna arten får namnet **umbrabusksmyg** (*S. nouhuysi*).
- Västlig snärtfågel (*Psophodes nigrogularis*) slås samman med malleesnärtfågel (*P. leucogaster*). Den sammanslagna arten behåller namnet **västlig snärtfågel** (*P. nigrogularis*).
- Skogsbatis (*Batis mixta*) slås samman med mikindanibatis (*B. reichenowi*). Den sammanslagna arten behåller namnet **skogsbatis** (*B. mixta*).
- Mangrovevireo (*Vireo pallens*) slås samman med providenciavireo (*V. approximans*). Den sammanslagna arten behåller namnet **mangrovevireo** (*V. pallens*).
- Rostbukig paradismonark (*Terpsiphone rufiventer*) slås samman med annobónparadismonark (*T. smithii*). Den sammanslagna arten behåller namnet **rostbukig paradismonark** (*T. rufiventer*).
- Rostbukig mes (*Melaniparus rufiventris*) slås samman med gräddbukig mes (*M. pallidiventris*). Den sammanslagna arten behåller namnet **rostbukig mes** (*M. rufiventris*).
- Athilärka (*Alaudala athensis*) slås samman med tuvlärka (*A. somalica*). Den sammanslagna arten behåller namnet **tuvlärka** (*A. somalica*).
- Katangagrönbulbyl (*Phyllastrephus cabanisi*) slås samman med ljus grönbulbyl (*Ph. placidus*). Den sammanslagna arten får namnet **blek grönbulbyl** (*Ph. cabanisi*).
- Trädgårdsbulbyl (*Pycnonotus barbatus*), somaliabulbyl (*P. dodsoni*), djiboutibulbyl (*P. somaliensis*) och trefärgad bulbyl (*P. tricolor*) slås samman till en art. Den sammanslagna arten behåller namnet **trädgårdsbulbyl** (*P. barbatus*).

- Svartbrynad stjärtmes (*Aegithalos bonvaloti*) slås samman med burmastjärtmes (*A. sharpei*). Den sammanslagna arten behåller namnet **svartbrynad stjärtmes** (*A. bonvaloti*).
- Zebraprinia (*Prinia bairdii*) slås samman med svartmaskad prinia (*P. melanops*). Den sammanslagna arten behåller namnet **zebraprinia** (*P. bairdii*).
- Ulugurusångare (*Scepomycter winifredae*) slås samman med rubehosångare (*S. rubehoensis*). Den sammanslagna arten får namnet **rosthuvad sångare** (*S. winifredae*).
- Beostare (*Gracula religiosa*) slås samman med engganobeostare (*G. enganensis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **beostare** (*G. religiosa*).
- Mindre glansstare (*Lamprotornis chloropterus*) slås samman med miomboglansstare (*L. elisabeth*). Den sammanslagna arten behåller namnet **mindre glansstare** (*L. chloropterus*).
- Afrikansk buskskvätta (*Saxicola torquatus*) slås samman med madagaskarbuskskvätta (*S. sibilla*). Den sammanslagna arten behåller namnet **afrikansk buskskvätta** (*S. torquatus*).
- Svarthuvad klippskvätta (*Thamnolaea cinnamomeiventris*) slås samman med vitkronad klippskvätta (*T. coronata*). Den sammanslagna arten får namnet **klippskvätta** (*T. cinnamomeiventris*).
- Strimmig blomsterpickare (*Dicaeum aeruginosum*) slås samman med tjocknäbbad blomsterpickare (*D. agilis*). Den sammanslagna arten behåller namnet **tjocknäbbad blomsterpickare** (*Pachyglossa agilis*), och placeras i släktet *Pachyglossa*.
- Zambezisolfågel (*Cinnyris shelleyi*) slås samman med ruvusolfågel (*C. hofmanni*). Den sammanslagna arten behåller namnet **zambezisolfågel** (*C. shelleyi*).
- Asiatisk bergsökenfink (*Rhodopechys sanguineus*) slås samman med afrikansk bergsökenfink (*R. alienus*). Den sammanslagna arten får namnet **bergsökenfink** (*R. sanguineus*).

Två nya familjer

- Två familjer bryts ut från de neotropiska familjen tityror (*Tityridae*);
    - **vassnäbbar** (*Oxyruncidae*), endast innehållande en art, och;
    - **krontyranner** (*Onychorhynchidae*), innehållandes två arter krontyranner (släktet *Onychorhynchus*) och fem myjober (släktena *Myiobius* och *Terenotriccus*).

Övriga justeringar

Ytterligare några namn justeras, av taxonomiska skäl eller för att nuvarande namn är bristfälliga. För förklaring av geografiska namn m.m. se ordlistan med geografiska namn, biotopnamn, folkslag m.m. på Tk:s webbplats.

- Stavning på arter med ”ç” försvenskas till ”ss”, en stavning som tidigare använts parallellt, det påverkar **jassanor** och **arassarier** (tidigare jaçanor, araçarier,). Observera dock ”ç” finns kvar i fem arter vars namn bildats av landet Moçambique.

- Pärlrall, cayennerall, ussurirall och gulrall specificeras till **pärldvärgrall**, **cayennedvärgrall**, **ussuridvärgrall** och **guldvärgrall** för att harmoniera ned övriga dvärgrallar (släktena *Rufirallus, Coturnicops* och *Laterallus*).
- Fläckgluttsnäppa ändras till **trädsnäppa** då arten inte är nära släkt med gluttsnäppan. Arten är den enda i familjen som bygger egna bon i träd.
- I samband med uppdelningen av klipphopparpingvin i två arter justeras namnet på atlantpingvin till **nordlig klipphopparpingvin**, för att visa på de tre arternas nära släktskap.
- I samband med byte av engelska namn justeras även de svenska namnen på två trädklättrare till mer unika namn. Långstjärtad trädklättrare får namnet **visselträdklättrare** och amazonträdklättrare blir **sorgträdklättrare**.
- Gråkindad alkippa får det geografiskt beskrivande namnet **taiwanalkippa**, i linje med flera andra arter i släktet.
- Östlig klippnötväcka får det mer unika namnet **ravinnötväcka**, för att tydligare skilja arten från klippnötväcka.
- Prärielappsparv justeras till **präriesporrsparv**, arten tillhör det monotypiska släktet *Rhynchophanes* i familjen sporrsparvar.
- Vitbrynad sparv justeras till det mer informativa namnet **boliviasparv**, då flertalet arter i släktet är vitbrynade.
- Smalnäbbad tangara justeras till **slytangara**, då det finns många tangaror med smalare näbb än denna art.
- Gulstrimmig tangara justeras till **tatamátangara** efter artens utbredning, då gulstrimmig inte är en bra beskrivning av hur arten ser ut.

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund, Martin Stervander, TK,
28 februari 2025

Namnlistan, version 18

Version 18 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 14.2 (augusti 2024). Liksom i IOC:s förra uppdatering görs ett antal ändringar på släktesnivå som inte påverkar de svenska namnen och därför inte redovisas här. Bland övriga justeringar får ytterligare några arter med eponymer i namnet enklare och/eller mer informativa namn.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

- Dalripa *Lagopus lagopus* delas upp i två arter:
    - dalripa *L. lagopus*, i norra Nordamerika och norra Palearktis från Norge till Sachalin, och;
    - **moripa** *L. scotica*, på Brittiska öarna.
- Grå uggleskärra *Aegotheles bennetti* delas upp i två arter:
    - grå uggleskärra *A. bennetti*, från centrala till sydöstra Nya Guinea, och;

- **karimuiuggleskärra** *A. terborghi*, endast känd från typexemplaret och en observation i Karimui, Chimbuprovinsen, Papua Nya Guinea.
- Rödhättad koua *Coua ruficeps* delas upp i två arter:
    - rödhättad koua *C. ruficeps*, från nordvästra Madagaskar, och;
    - **spikskogskoua** *C. olivaceiceps*, från sydvästra Madagaskar.
- Rödbröstad malkoha *Phaenicophaeus curvirostris* delas upp i två arter:
    - rödbröstad malkoha *P. curvirostris*, från Malackahalvön, Stora Sundaöarna och sydvästra Filippinerna, och;
    - **mentawaimalkoha** *P. oeneicaudus*, på Mentawai, väster om Sumatra.
- Mindre glansgök *Chalcites minutillus* delas upp i två arter:
    - mindre glansgök *C. minutillus*, från Sydöstasien till Filippinerna, Små Sundaöarna och norra och östra Australien, och;
    - **tanimbarglansgök** *C. crassirostris*, på Tayandu, Kai och Tanimbaröarna i Moluckerna.
- Indonesisk buskgök *Cacomantis sepulcralis* delas upp i två arter:
    - **sundabuskgök** *C. sepulcralis*, från Malackahalvön till Stora och Små Sundaöarna och sydvästra Filippinerna, och;
    - **sulawesibuskgök** *C. virescens*, från Sulawesi, Banggai- och Sulaöarna, Butung och Tukangbesiöarna.
- Vanlig buskgök *Cacomantis variolosus* delas upp i tre arter:
    - **sahulbuskgök** *C. variolosus*, i östra Wallacea, Nya Guinea, norra och östra Australien och Bismarkarkipelagen;
    - **manusbuskgök** *C. blandus*, på Ninigo och Amiralitetsöarna, och;
    - **salomonbuskgök** *C. addendus*, på Salomonöarna (förutom Rennell).
- Vegatrut *Larus vegae* delas upp i två arter (denna uppdelning har sedan tidigare genomförts av Tk):
    - vegatrut *L. vegae*, i centrala och östra Sibirien, från Tajmyr till Tjuktjien, Nysibiriska öarna och Saint Lawrence Island, och;
    - **mongoltrut** *L. mongolicus*, från Altaj till Bajkalsjön och Mongoliet, Chankasjön (nordöstra Kina) och Gula havet.
- Brunsula *Sula leucogaster* delas upp i två arter:
    - brunsula *S. leucogaster*, vidspridd på öar i tropiska och subtropiska vatten, och;
    - **cocossula** *S. brewsteri*, på öar utanför södra Kalifornien (Channel Islands), västra Mexiko – från centrala Baja California och Californiaviken (nordvästra Mexiko) till Revillagigedoöarna (väster om centrala Mexiko) – och Clippertonön (sydväst om Mexiko).
- Gulnäbbad barbett *Trachyphonus purpuratus* delas upp i två arter:
    - **gulmaskad barbett** *T. purpuratus*, från Sierra Leone till sydvästra Nigeria, och;
    - **guineabarbett** *T. goffinii*, från sydöstra Nigeria till västra Kenya.
- Rödpannad dvärgbarbett *Pogoniulus pusillus* delas upp i två arter:

    - **nataldvärgbarbett** *P. pusillus*, i södra Moçambique och östra Sydafrika, och;
    - **rödpannad dvärgbarbett** *P. uropygialis*, som förekommer från Eritrea, Etiopien och Somalia till sydöstra Sudan, Uganda och sydöstra Tanzania.
- Guldspett *Colaptes auratus* delas upp i två arter:
    - guldspett *C. auratus*, vidspridd i Nordamerika, och;
    - **guatemalaspett** *C. mexicanoides*, från sydligaste Mexiko till Nicaragua.
- Brunbukig uppnäbb *Xenops genibarbis* delas upp i två arter:
    - **amazonuppnäbb** *X. genibarbis*, från östra Colombia och Venezuela genom Amazonas och Guyanaregionen till norra Bolivia, samt nordöstra Brasilien, och;
    - **nordlig uppnäbb** *X. mexicanus*, från södra Mexiko genom Panama till norra Colombia och nordvästra Venezuela söderut genom västra Colombia, västra Ecuador och nordvästra Peru.
- Rostgrässmyg *Amytornis whitei* delas upp i två arter:
    - **pilbaragrässmyg** *A. whitei*, i steniga områden i västra Western Australia, och;
    - **sandgrässmyg** *A. oweni*, i sandöknar och mallee i centrala Western Australia till centrala Queensland och nordvästra och södra Southern Australia.
- Vitögd gråfågel *Coracina striata* delas upp i fyra arter:
    - vitögd gråfågel *C. striata*, från Sydöstasien till norra Filippinerna, Sumatra och Borneo;
    - **visayagråfågel** *C. panayensis*, på västra Visayaöarna;
    - **sulugråfågel** *C. guillemardi*, på Suluöarna, och;
    - **boholgråfågel** *C. kochii*, i östcentrala och södra Filippinerna.
- Större gråfågel *Coracina javensis* (f.d. *C. macei*) delas upp i tre arter:
    - **orientgråfågel** *C. javensis*, som förekommer från Himalaya genom Sydöstasien till östra Kina och Taiwan, även Java och Bali;
    - **indisk gråfågel** *C. macei*, i centrala och södra Indien, på Sri Lanka, och;
    - **malackagråfågel** *C. larutensis*, på Malackahalvön.
- Gråhättad gråfågel *Edolisoma remotum* delas upp i två arter:
    - **bismarckgråfågel** *E. remotum*, i Bismarckarkipelagen (på Lavongai, New Ireland, Dyaul, Feni, Mussau, Emirau, Umboi, New Britain och Lolobau), och;
    - **bukidagråfågel** *E. erythropygium*, på Tabar, Lihir och Tangaöarna i Bismarckarkipelagen österut till Malaita i Salomonöarna.
- Cikadagråfågel *Edolisoma tenuirostre* delas upp i åtta arter:
    - **sahulgråfågel** *E. tenuirostre*, på Nya Guinea, i norra och östra Australien, samt Bismarckarkipelagen;
    - **rosselgråfågel** *E. rostratum*, på Rossel, sydöst om Nya Guinea;
    - **banggaigråfågel** *E. pelingi*, på Banggai, öster om Sulawesi;
    - **obigråfågel** *E. obiense*, på Obi och Bisa, i Moluckerna;
    - **sultangråfågel** *E. grayi*, på Tukangbesiöarna, sydöst om Sulawesi, samt från Morotai till Bacan, i norra Moluckerna;

    - **seramgråfågel** *E. amboinense*, på Buru, Ambon, Seram och Seram Laut, i centrala Moluckerna;
    - **geelvinkgråfågel** *E. meyerii*, på Numfor och Biak, nordväst om Nya Guinea, och;
    - **timorgråfågel** *E. timoriense*, på Kalaotoa (sydöst om Sulawesi), Lembata, Alor och Timor (i Små Sundaöarna).
- Salomongråfågel *Edolisoma holopolium* delas upp i två arter:
    - salomongråfågel *E. holopolium*, i norra, sydcentrala och västra Salomonöarna, och;
    - **malaitagråfågel** *E. tricolor*, på Malaita, sydöstra Salomonöarna.
- Sulawesigråfågel *Edolisoma morio* delas upp i två arter:
    - sulawesigråfågel *E. morio*, på Sulawesi och omgivande satellitöar, och;
    - **sangihegråfågel** *E. salvadorii*, på Sangihe och Talaud (norr om Sulawesi).
- Orangebröstad visslare *Pachycephala fulvotincta* delas upp i två arter:
    - **tenggaravisslare** *P. calliope* (f.d. *P. fulvotincta*), från Java och Bali till centrala, östra Små Sundaöarna, och;
    - **selayarvisslare** *P. teysmanni*, på Selayar, söder om sydvästra Sulawesi.
- Fijivisslare *Pachycephala vitiensis* delas upp i två arter:
    - **vitstrupig fijivisslare** *P. vitiensis*, på södra Fijiöarna, och;
    - **gulstrupig fijivisslare** *P. graeffii*, på östra, västra och centrala Fijiöarna.
- Temotuvisslare *Pachycephala vanikorensis* delas upp i tre arter:
    - **vanikolovisslare** *P. vanikorensis*, på Vanikolo (sydöstra Salomonöarna);
    - **utupuavisslare** *P. utupuae*, på Utupua (sydöstra Salomonöarna), och;
    - **nendovisslare** *P. ornata*, på Nendo samt Reef- och Dufföarna (sydöstra Salomonöarna).
- Bandavisslare *Pachycephala macrorhyncha* delas upp i två arter:
    - bandavisslare *P. macrorhyncha*, på Banggai- och Sulaöarna (öster om Sulawesi), centrala, södra Moluckerna och östra Små Sundaöarna, och;
    - **babarvisslare** *P. sharpei*, på Babar (östra Små Sundaöarna).
- Rödvingad lärka *Corypha hypermetra* delas upp i två arter:
    - **storlärka** *C. hypermetra*, i Etiopien och södra Somalia till nordöstra Tanzania, och;
    - **kidepolärka** *C. kidepoensis*, i sydöstra, södra Sudan och nordöstra Uganda.
- Rödnackad lärka *Corypha africana* delas upp i fem arter:
    - **savannlärka** *C. africana*, vidspridd i östra och södra Afrika, från Uganda i norr till Sydafrika i söder;
    - **höglandslärka** *C. kurrae*, som förekommer från Guinea västerut till västra Sudan;
    - **vaktlärka** *C. athi*, som förekommer från centrala Kenya till nordöstra Tanzania;

    - **slättlärka** *C. kabalii*, från Gabon till södra Kongo-Kinshasa, östra Angola och nordvästra Zambia, och;
    - **platålärka** *C. nigrescens*, från östra Zambia, norra Malawi och södra Tanzania.
- Vitstrupig grönbulbyl *Phyllastrephus albigularis* delas upp i två arter:
    - vitstrupig grönbulbyl *P. albigularis*, som förekommer från Senegambia till södra Sudan, västra Uganda och östra Kongo-Kinshasa, och;
    - **angolagrönbulbyl** *P. viridiceps*, i nordvästra Angola.
- Gulstrupig grönbulbyl *Atimastillas flavicollis* delas upp i två arter:
    - gulstrupig grönbulbyl *A. flavicollis*, som förekommer från Senegambia till norra Kamerun och nordvästra Centralafrikanska republiken, och;
    - **blekstrupig grönbulbyl** *A. flavigula*, från Kamerun till västcentrala Etiopien, Östafrika, Angola och Kongo-Kinshasa.
- Salomonmonark *Symposiachrus barbatus* delas upp i två arter:
    - salomonmonark *S. barbatus*, som förekommer från Buka till Guadalcanal (förutom New Georgia-öarna), och;
    - **malaitamonark** *S. malaitae*, på Malaita.
- Kolombangaramonark *Symposiachrus browni* delas upp i två arter:
    - kolombangaramonark *S. browni*, i östra och södra New Georgia-öarna (Kolombangara, New Georgia, Vangunu, Rendova, Tetepare) och;
    - **vellalavellamonark** *S. nigrotectus*, i nordvästra och norra New Georgia-öarna (Vella Lavella, Ranongga).
- Nötkråka *Nucifraga caryocatactes* delas upp i två arter (denna uppdelning har sedan tidigare genomförts av Tk):
    - nötkråka *N. caryocatactes*, som förekommer från Europa till nordöstra Japan, och;
    - **kinesisk nötkråka** *N. hemispila*, från nordvästra Himalaya österut till Kina och Taiwan.
- Sundakråka *Corvus enca* delas upp i två arter:
    - sundakråka *C. enca*, på Malackahalvön, Sumatra med satellitöar, Borneo, Java och Bali, och;
    - **sulawesikråka** *C. celebensis*, på Sulawesi och Sulaöarna.
- Småkråka *Corvus samarensis* delas upp i två arter:
    - **samarkråka** *C. samarensis*, på Samar och Mindanao, och;
    - **sierramadrekråka** *C. sierramadrensis*, på Luzon (Sierra Madre-bergen).
- Stornäbbad kråka *Corvus macrorhynchos* delas upp i två arter:
    - stornäbbad kråka *C. macrorhynchos*, som förekommer från nordöstra Indien och Sri Lanka genom östra Ryssland, Japan, Taiwan, till Små Sundaöarna, och;
    - **filippinkråka** *C. philippinus*, på Filippinerna.
- Afrikansk klippsvala *Ptyonoprogne fuligula* delas upp i två arter:

    - **kapklippsvala** *P. fuligula*, som förekommer från sydvästra Angola och Namibia till sydvästra Zimbabwe, södra Moçambique och Sydafrika, och;
    - **ockrastrupig klippsvala** *P. rufigula*, från Sierra Leone till Eritrea och Etiopien söderut till Zimbabwe och norra Moçambique.
- Kustsvala *Hirundo tahitica* delas upp i två arter:
    - **tahitisvala** *H. tahitica*, på Moorea och Tahiti, och;
    - kustsvala *H. javanica*, som förekommer från Sydöstasien till Nya Guinea och Mikronesien.
- Rostgumpsvala *Cecropis rufula* (f.d. *C. daurica*), delas upp i två arter. Samtidigt flyttas underarterna *daurica, japonica* och *nipalensis* till tempelsvala *C. striolata* och västafrikansk svala *C. domicella* införlivas i den nya arten bysvala:
    - rostgumpsvala (*C. rufula*), som förekommer i södra Europa och Nordafrika österut till Iran, Pakistan och nordvästra Indien, och;
    - **bysvala** *C. melanocrissus*, som förekommer från Senegambia till västra Kamerun och östra Sudan, och i Östafrika från Etiopien och Eritrea till Malawi och norra Zambia.
- Långstjärtad cistikola *Cisticola aberrans*, inkl. f.d. klippcistikola *C. emini*, delas upp i två arter:
    - långstjärtad cistikola *C. aberrans*, som förekommer i västra, centrala, sydöstra och östra Afrika;
    - **huambocistikola** *C. bailunduensis*, i Angola.
- Karamojaapalis *Apalis karamojae* delas upp i två arter:
    - karamojaapalis *A. karamojae*, i nordöstra Uganda, och;
    - **massajapalis** *A. stronachi*, i norra Tanzania och sydvästra Kenya.
- Etiopienglasögonfågel *Zosterops poliogastrus* delas upp i två arter:
    - **simenglasögonfågel** *Z. poliogastrus*, i sydöstra Sudan, Eritrea och norra, centrala och östra Etiopien, och;
    - **kaffaglasögonfågel** *Z. kaffensis*, i västra och sydvästra Etiopien.
- Gul glasögonfågel *Zosterops senegalensis* delas upp i två arter:
    - **kanariegul glasögonfågel** *Z. senegalensis*, som förekommer från Mauretanien och Senegal till nordvästra Etiopien, i västra Kenya och norra Tanzania och i Sierra Leone, Liberia och Elfenbenskusten, samt i södra Sudan och nordöstra Uganda, och;
    - **angolaglasögonfågel** *Z. kasaicus*, från centrala Kongo-Kinshasa till norra och centrala Angola.
- Rostkindad sabeltimalia *Erythrogenys erythrogenys* delas upp i två arter:
    - rostkindad sabeltimalia *E. erythrogenys*, som förekommer i Himalaya från nordöstra Pakistan till Bhutan, och;
    - **rödögd sabeltimalia** *E. imberbis*, i östra Myanmar och nordvästra Thailand.
- Roststjärtad gärdsmyg *Pheugopedius euophrys* delas upp i två arter:
    - **duettgärdsmyg** *P. euophrys*, som förekommer från sydvästra Colombia till norra Peru, och;

    - **coléngärdmyg** *P. schulenbergi*, i norra Peru, norr om Marañónfloden.
- Husgärdsmyg *Troglodytes aedon* delas upp i sju arter:
    - husgärdsmyg *T. aedon*, som förekommer från södra Kanada och västra, centrala och östra USA till södra Mexiko;
    - **musgärdsmyg** *T. musculus*, som förekommer från södra Mexiko till södra Chile och södra Argentina;
    - **cozumelgärdsmyg** *T. beani*, på Cozumel (utanför Yucatánhalvön);
    - **kalinagogärdsmyg** *T. martinicensis*, på Guadeloupe, Dominca och Martinique (troligen utdöd på Martinique och eventuellt även Guadeloupe);
    - **saintluciagärdsmyg** *T. mesoleucus*, på Saint Lucia;
    - **saintvincentgärdsmyg** *T. musicus*, på Saint Vincent, och;
    - **grenadagärdsmyg** *T. grenadensis*, på Grenada.
- Kastanjebröstad gärdsmyg *Cyphorhinus thoracicus* delas upp i två arter:
    - **drillgärdsmyg** *C. thoracicus*, som förekommer från centrala Peru till västra Bolivia, och;
    - **visselgärdsmyg** *C. dichrous*, som förekommer från centrala Colombia till norra Peru.
- Blygrå myggsnappare *Polioptila plumbea* delas upp i två arter:
    - **tropikmyggsnapppare** *P. plumbea*, som förekommer från centrala och östra Colombia till Peru och nordöstra Brasilien, och;
    - **marañónmyggsnappare** *P. maior*, i norra Peru.
- Vitbröstad härmtrast *Ramphocinclus brachyurus* delas upp i två arter:
    - **martiniquehärmtrast** *R. brachyurus*, på Martinique, och;
    - **saintluciahärmtrast** *R. sanctaeluciae*, på Saint Lucia.
- Ötrast *Turdus poliocephalus* delas upp i 17 arter:
    - **mindorotrast** *T. mindorensis*, på Mindoro;
    - **luzontrast** *T. thomassoni*, på Luzon;
    - **mindanaotrast** *T. nigrorum*, på Negros och Mindanao;
    - **wallaceatrast** *T. schlegelii*, på Sulawesi och Timor;
    - **julötrast** *T. erythropleurus*, på Julön;
    - **javatrast** *T. javanicus*, på Java, Borneo och Sumatra;
    - **molucktrast** *T. deningeri*, på Seram och Taliabu;
    - **papuatrast** *T. papuensis*, på Nya Guinea och Goodenough;
    - **bismarcktrast** *T. heinrothi*, på New Ireland och Tolokiwa;
    - **bougainvilletrast** *T. bougainvillei*, på Bougainville;
    - **salomontrast** *T. kulambangrae*, på Kolombangara och Guadalcanal;
    - **vanuatutrast** *T. vanikorensis*, på Rennell, Efate, Nguna, Paama, Lopevi, Epi, Emae, Pentecost, Malekula, Ambrym, Maré (Loyautéöarna, troligen utdöd), Vanua Lava, Ureparapara, Utupua, Vaniloro, Santo, Malo och Gaua;

    - **vithuvad trast** *T. pritzbueri*, på Erromango, Tanna (södra Vanuatu) och Lifou (troligen utdöd);
    - **nyakaledonientrast** *T. xanthopus*, på Nya Kaledonien med satellitöar (troligen utdöd förutom på Yandé och möjligen Neba);
    - **norfolktrast** *T. poliocephalus*, tidigare på Norfolkön och Lord Howe, numera utdöd;
    - **samoatrast** *T. samoensis*, på Savaii och Upolu, och;
    - **fijitrast** *T. ruficeps*, på Fijiöarna.
- Vitkronad shama *Copsychus stricklandii* delas upp i två arter:
    - vitkronad shama *C. stricklandii*, på norra Borneo och Banggi (nordöst om Borneo, och;
    - **maratuashama** *C. barbouri*, på Maratua (öster om Borneo), utdöd i vilt tillstånd.
- Vitgumpad shama *Copsychus malabaricus* delas upp i fyra arter:
    - vitgumpad shama *C. malabaricus*, som förekommer från Indien och Sri Lanka, till Hainan, Vietnam och Stora Sundaöarna;
    - **javashama** *C. omissus*, på Java;
    - **kangeanshama** *C. nigricauda*, på Kangean (norr om Bali), möjligen utdöd i vilt tillstånd, och;
    - **ceylonshama** *C. leggei*, på Sri Lanka.
- Vitbrynad näktergal *Tarsiger indicus* delas upp i två arter:
    - vitbrynad blåstjärt *T. indicus*, som förekommer från Himalaya till sydcentrala Kina och norra Vietnam, och;
    - **taiwanblåstjärt** *T. formosanus*, på Taiwan.
- Tajgablåstjärt *Tarsiger cyanurus* delas upp i två arter:
    - tajgablåstjärt *T. cyanurus*, i norra Eurasien, och;
    - **qilianblåstjärt** *T. albocoeruleus*, i nordcentrala Kina.
- Blodbröstad blomsterpickare *Dicaeum sanguinolentum* delas upp i fyra arter:
    - **javablomsterpickare** *D. sanguinolentum*, på Java och Bali;
    - **floresblomsterpickare** *D. rhodopygiale*, på Flores;
    - **sumbablomsterpickare** *D. wilhelminae*, på Sumba, och;
    - **timorblomsterpickare** *D. hanieli*, på Timor.
- Smyckesolfågel *Cinnyris pulchellus* delas upp i två arter:
    - smyckesolfågel *C. pulchellus*, som förekommer från Mauretanien och Sierra Leone österut till Eritrea, västra Etiopien och nordvästra Kenya, och;
    - **juvelsolfågel** *C. melanogastrus*, i västra, centrala och södra Kenya, samt Tanzania.
- Steglits *Carduelis carduelis* delas upp i två arter:
    - steglits *C. carduelis*, i tempererade och subtropiska västra och centrala Palearktis, och;

    - **grå steglits** *C. caniceps*, från södra och östra Iran genom Centralasien till västra Mongoliet, nordvästra Kina och västra och centrala Himalaya.
- Svartkronad sparv *Arremon abeillei* delas upp i två arter:
    - svartkronad sparv *A. abeillei*, i sydvästra Ecuador och nordvästra Peru, och;
    - **marañónsparv** *A. nigriceps*, i nordcentrala Peru.
- Skiffersnårsparv *Atlapetes schistaceus* delas upp i två arter:
    - skiffersnårsparv *Atlapetes schistaceus*, från Venezuela till Peru, och;
    - **junínsnårsparv** *Atlapetes taczanowskii*, i centrala Peru.

Tre nya arter tillkommer:

- **Marquesaspurpurhöna** *Porphyrio paepae*, på Hiva Oa och Tahuata i Marquesasöarna, i Franska Polynesien, numera utdöd.
- **Timornattskärra** *Caprimulgus ritae*, på Timor, Rote och Wetar i Små Sundaöarna.
- **Vitstjärtad tityra** *Tityra leucura*, från sydcentrala Amazonas i Brasilien, en mycket dåligt känd art med få observationer, vars taxonomiska status varit ifrågasatt.

17 arter stryks från listan:

- Sulawesisalangan *Aerodramus sororum* och seramsalangan *A. ceramensis* slås samman med halmaherasalangan *A. infuscatus*. Den sammanslagna arten får namnet **molucksalangan** *A. infuscatus*.
- Kustsalangan *Aerodramus germani* slås samman med svalbosalangan *A. fuciphagus*. Den sammanslagna arten får namnet **vitbosalangan** *A. fuciphagus*.
- Macquarieparakit *Cyanoramphus erythrotis* slås samman med rödpannad parakit *C. novaezelandiae*. Den sammanslagna arten behåller namnet rödpannad parakit *C. novaezelandiae*.
- Större gråfågel *Coracina macei* slås samman med javagråfågel *C. javensis*. Den sammanslagna arten får namnet **orientgråfågel** *C. javensis*.
- Östlig talgoxe *Parus minor* slås samman med grå talgoxe *P. cinereus*. Den sammanslagna arten behåller namnet grå talgoxe *P. cinereus*.
- Rävlärka *Calendulauda alopex* slås samman med isabellalärka *C. africanoides*. Den sammanslagna arten behåller namnet isabellalärka *C. africanoides*.
- Törellärka *Calendulauda barlowi* slås samman med dynlärka *C. erythrochlamys*. Den sammanslagna arten behåller namnet dynlärka *C. erythrochlamys*.
- Uarsheklärka *Mirafra ashi* slås samman med somalialärka *Corypha somalica*. Den sammanslagna arten behåller namnet somalialärka *C. somalica*.
- Malawigrönbulbyl *Arizelocichla olivaceiceps* slås samman med strimörad grönbulbyl *A. striifacies*. Den sammanslagna arten behåller namnet strimörad grönbulbyl *A. striifacies*.
- Bougainvillemonark *Monarcha erythrostictus* slås samman med kastanjebukig monark *M. castaneiventris*. Den sammanslagna arten behåller namnet kastanjebukig monark *M. castaneiventris*.

- Gråhuvad sammetsmonark *Myiagra cervinicolor* slås samman med sothuvad sammetsmonark *M. eichhorni*. Den sammanslagna arten behåller namnet sothuvad sammetsmonark *M. eichhorni*.
- Klippcistikola *Cisticola emini* slås samman med långstjärtad cistikola *C. aberrans*. Den sammanslagna arten behåller namnet långstjärtad cistikola *C. aberrans*.
- Miomboeremomela *Eremomela salvadorii* slås samman med gulbukig eremomela *E. icteropygialis*. Den sammanslagna arten behåller namnet gulbukig eremomela *E. icteropygialis*.
- Ockrabröstad timalia *Cyanoderma ambiguum* slås samman med rostpannad timalia *C. rufifrons*. Den sammanslagna arten behåller namnet rostpannad timalia *C. rufifrons*.
- Snösiska *Acanthis hornemanni* och brunsiska *A. cabaret* slås samman med gråsiska *A. flammea*. Den sammanslagna arten behåller namnet gråsiska *A. flammea*. Denna sammanslagning har sedan tidigare genomförts av Tk.

En ny familj

- De två arterna fläckkrypare bryts ut från familjen nötväckor till en egen familj; **fläckkrypare** (Salpornithidae).

Övriga justeringar

Några namn justeras baserat på taxonomiska skäl, exempelvis att nya genetiska studier har påvisat nya släktskapsförhållanden.

- Vitkronad buskgök och blek buskgök justeras till **vitkronad gök** och **blekgök**, då genetiska studier visar att de utgör en systergrupp till de egentliga buskgökarna i släktet *Cacomantis* och flyttas till släktena *Caliechthrus* respektive *Heteroscenes*.
- Blåhuvad vaktelduva justeras till **blåhätteduva**, då den genetiskt inte står nära övriga vaktelduvor.
- Baserat på genetiska studier bröts havslöparen och ytterligare ett antal stormsvalor ut från familjen stormsvalor (Hydrobatidae) till den nya familjen Oceanitidae, som står närmare albatrosserna. De nya familjerna fick namnen nordstormsvalor och sydstormsvalor. För att tydliggöra att familjerna inte står varandra närmast och för att förenkla språkbruket, justeras familjenamnen till **stormsvalor** (Hydrobatidae) för de nordliga arterna, inklusive vår egen stormsvala och **havslöpare** (Oceanitidae) för de sydliga arterna, inklusive havslöparen. I samband med detta justeras namnen på nio sydliga arter från stormsvala till **havslöpare** och oceanlöpare justeras till **oceanstormsvala**.
- Ovambohök justeras till **ovambosparvhök** i samband med justering av släktena bland hökarna.
- Duvhökarna bryts ut från *Accipiter* och flyttas till släktet *Astur*. I samband med detta justeras namnet på fyra arter från hök till duvhök; **trastduvhök** (trasthök), **kubaduvhök** (kubahök), **tvåfärgad duvhök** (tvåfärgad hök) och **chileduvhök** (chilehök).
- Av de sju arterna i familjen kondorer heter idag fem ”gam” trots att de inte är gamar. För att förtydliga släktskapet justeras namnet så samtliga sju arter heter kondor. De nya namnen blir **kungskondor** (kungsgam), **andinsk kondor** (kondor), **korpkondor** (korpgam), **kalkonkondor** (kalkongam), **savannkondor** (savanngam) och **skogskondor** (skogsgam).

- Orangeryggig hackspett justeras till **orangeryggig sultanspett**, då genetiska studier visat att den tillhör sultanspettarna i släktet *Chrysocolaptes*.
- De små nunnefåglarna i släktet *Nonnula* får namnet **noviser** för att särskilja dem från de stora arterna i släktena *Monasa* och *Hapaloptila*. På engelska heter de nunlet resp. nunbird.
- Genetiska studier av familjen myrfåglar har gett större förståelse för de inbördes släktskapen inom familjen och föranleder några namnjusteringar:
    - Myrsmyg reserveras för arter i kladen ”Formicivorini”, vilket medför följande justeringar:
        - Fyra arter i släktet *Euchrepomis* justeras från myrsmyg till **eldrygg**.
        - Åtta arter i släktet *Epinecrophylla* justeras från myrsmyg till **strimhake**.
        - Fläckvingad myrsmyg (släktet *Microrhopias*) justeras till **prickvingad myrfågel**.
        - Strimryggig myrsmyg (släktet *Myrmorchilus*) justeras till **strimryggig myrfågel**.
        - Två arter i släktet *Isleria* justeras från myrsmyg till **myrfågel**.
        - Stjärnstrupig myrsmyg (släktet *Rhopias*) justeras till **stjärnstrupig myrfågel**.
        - 17 arter i släktet *Herpsilochmus* justeras från myrsmyg till **myrvireo**;
        - Caatingamyrsmyg (släktet *Radinopsyche*) justeras till **caatingamyrvireo**.
        - Svartvit myrfågel justeras till **ömyrsmyg**.
    - Myrtörnskata reserveras för ett antal släkten inom kladen Thamnophilini, vilket medför följande justeringar:
        - Fläckvingad myrtörnskata (släktet *Pygiptila*) justeras till **stjärnmyrfågel**.
        - Två arter i släktet *Thamnistes* justeras från myrtörnskata till **myrfågel**. Rostbrun myrtörnskata får namnet **perumyrfågel**.
        - Helikoniamyrtörnskata (släktet *Neoctantes*) justeras till **helikoniamyrfågel**.
        - Två arter i släktet *Clytoctantes* justeras från myrtörnskata till **myrfågel**.
- Markkryparna i släktet *Upucerthia* justeras till **cinkloder**, då de genetiskt visat sig utgöra en monofyletisk klad tillsammans med *Cinclodes*. Samtidigt justeras de två markkryparna i släktet *Tarphonomus* till **buskkrypare** för att skilja dem från markkrypare i andra släkten, det avspeglar även deras beteende bättre.
- Fyra arter som tillhör den afrikanska kladen med grönbulbyler förtydligas från endast bulbyl till grönbulbul; **svarthalsad grönbulbyl, markgrönbulbyl, brun grönbulbyl** och **vattengrönbulbyl** (v. 17, svarthalsad bulbyl, markbulbyl, brunbulbyl och vattenbulbyl).
- Genetiska studier har visat att de två arterna i släktet *Eurocephalus* står utanför familjen törnskator, de får därför namnet **akaciaskrikor**. De nya artnamnen blir **vitgumpad akaciaskrika** och **brungumpad akaciaskrika** (v. 17 vitgumpad resp. vitkronad törnskata).

- Trasttangaran utgör en egen familj, som inte står närmast tangarorna, den får därför det mer särskiljande namnet **keo**, och familjenamnet ändras till **keor**.
- Fyra arter myrkardinaler flyttas till släktet *Driophlox*. Kvar i släktet *Habia* blir endast röd myrkardinal vars namn justeras till **rödkronad kardinal**.

Ett antal namn justeras då nuvarande namn är bristfälliga, exempelvis ger en felaktig bild av artens utseende eller beteende, eller på annat sätt är opassande. För förklaring av termer som används i artnamnen, se ordlistan med geografiska namn, biotopnamn, folkslag m.m. på Tk:s webbplats.

- **flodhocko** (v. 17 släthuvad hocko), då arten framför allt hittas efter floder eller översvämmad skog och släthuvad inte är en bra beskrivning av utseendet
- **droppfrankolin** (v. 17 droppfläckig frankolin), förenkling av namnet
- **khasiseglare** (v. 17 mörkryggig seglare), efter artens mycket begränsade utbredning kring Khasibergen i nördöstra Indien, mörk rygg inte unikt för arten
- **sågnäbbad eremit** (v. 17 sågnäbbskolibri), för att förtydliga släktskapet, då övriga arter inom kladen kallas eremiter
- **eldstrupe** (v. 17 eldstrupekolibri), förenkling av namnet
- **granatstrupe** (v. 17 granatstrupekolibri), förenkling av namnet
- **solfjädersbuskgök** (v. 17 australisk buskgök), namnet justeras i samband med att vanlig buskgök delas upp i tre arter, bland annat sahulbuskgök som även den förekommer i Australien
- **fjällig spegelduva** (v. 17 vanlig spegelduva), ”vanlig” tas bort som förled på ett antal arter, till förmån för mer precisa eller informativa namn
- **söderhavsmarkduva** (v. 17 samoamarkduva), då arten förutom på Samoa även förekommer på Fijiöarna, Tonga samt Wallis och Futuna
- **mexikansk sparvduva** (v. 17 inkaduva), namnet inkaduva är mycket missvisande då arten inte förekommer i Sydamerika
- **bärspov** (v. 17 eskimåspov), namnet justeras då ordet ”eskimå” enligt Diskrimineringsombudsmannen kan uppfattas som kränkande och bör undvikas; namnet bärspov kommer av artens födoval, då den både på häcklokal och under flytt ska ha livnärt sig på olika bär, framför allt kråkbär
- **vitmaskad ibis** (v. 17 maskibis), förtydligande för att särskilja arten från svartmaskad, respektive rödmaskad ibis
- **vitbyxad näshornsfågel** (v. 17 vitlårad näshornsfågel), -lårad ändras till det anatomiskt mer korrekta -byxad, då det hänvisar till färgen på fjäderdräkten
- **chokladkungsfiskare** (v. 17 kakaokungsfiskare), korrigering då namnet avspeglar artens chokladbruna färg, inte någon koppling till kakaoträdet
- **parakitfalk** (v. 17 fläckvingad falk), efter artens vana att häcka i kolonier av munkparakit
- **svavelögd lövletare** (v. 17 kroknäbbad lövletare), bättre karaktär då arten inte har något tydlig krok på näbben
- **vaktelmyrfågel** (v. 17 praktmyrfågel), beskriver artens unika vaktellika utseende
- **bandmyrfågel** (v. 17 bandad myrfågel), förenkling av namnet

- **chusqueatapakul** (v. 17 bambutapakul), justeras för överrensstämmelse med det engelska namnet, *Chusquea* är ett bambusläkte
- **gråryggig todityrann** (v. 17 vanlig todityrann), ”vanlig” tas bort som förled på ett antal arter, till förmån för mer precisa eller informativa namn
- **saxstjärtad kungstyrann** (v. 17 saxstjärtstyrann), justeras från tyrann till kungstyrann, för samstämmighet med övriga kungstyranner, släktet *Tyrannus*
- **gaffelstjärtad kungststyrann** (v. 17 gaffelstjärtstyrann), justeras från tyrann till kungstyrann, för samstämmighet med övriga kungstyranner, släktet *Tyrannus*
- **söderhavsdrillfågel** (v. 17 polynesisk drillfågel), justeras då en stor del av utbredningen, utöver Polynesien, är i Melanesien
- **guldpannad vireo** (v. 17 gulpannad vireo), specificering av färgen som även överensstämmer med det engelska och det vetenskapliga namnet
- **vitspetsad grönskata** (v. 17 vanlig grönskata), ”vanlig” tas bort som förled på ett antal arter, till förmån för mer precisa eller informativa namn
- **taggstjärtsskata** (v. 17 klyvstjärtad skata), bättre beskrivning av stjärtens utseende
- **pipkråka** (v. 17 sulawesikråka), beskriver artens unika läte och överensstämmer med det engelska namnet
- **västlig kragparadisfågel** (v. 17 vogelkopkragparadisfågel), justeras för att undvika onödigt långt namn, överensstämmer även med det engelska namnet
- **parotior** (v. 17 strålparadisfåglar), justeras för att undvika onödigt långa namn
- **arfakparotia** (v. 17 vogelkopstrålparadisfågel), beskriver artens utbredning, då den är i det närmaste endemisk för Arfakbergen
- **tibetansk korttålärka** (v. 17 höglandslärka), visar på det nära släktskapet med mongoliskt korttålärka
- **vitbyxad svala** (v. 17 vitlårad svala), -lårad ändras till det anatomiskt mer korrekta -byxad, då det hänvisar till färgen på fjäderdräkten
- **ghatssvala** (v. 17 tamilsvala), namnet kommer av Ghatsbergen i södra Indien, tidigare namnet felvisande då arten knappt förekommer i de områden som domineras av tamiler
- **cettior** (v. 17 cettisångare), familjenamnet förenklas, de flesta arter i familjen heter cettia, inte cettisångare
- **gulahavscettia** (v. 17 manchurisk cettia), beskriver bättre artens utbredning runt Gula havet
- **fjällkronad stubbstjärt** (v. 17 manchurisk stubbstjärt), namnet justeras till att beskriva artens utseende, då den förekommer i ett större område som även omfattar Sachalin, Koreahalvön och Japan
- **bäcksångare** (v. 17 grovnäbbad sångare), justeras då namnet är otydligt eftersom näbben endast är grov i förhållande till andra lövsångare, inte till övriga sångare; det nya namnet syftar på att arten oftast hittas i anslutning till bäckar och floder
- **bajkalsmygsångare** (v. 17 manchurisk smygsångare), anpassning till artens engelska namn
- **guinearävsångare** (v. 17 guinearostsångare), justering för att undvika förväxling med rostsångaren i släktet *Curruca*, vilken den inte är nära släkt med
- **kongorävsångare** (v. 17 kongorostsångare), se ovan

- **näktergalsgärdsmyg** (v. 17 nordlig näktergalsgärdsmyg), förenkling av namnet
- **fjällbröstad gärdsmyg** (v. 17 sydlig näktergalsgärdsmyg), förenkling av namnet i samband med justering av ovanstående art
- **söderhavsstare** (v. 17 polynesisk stare), justeras då en stor del av utbredningen, utöver Polynesien, är i Melanesien
- **gyllengumpad blomsterpickare** (v. 17 floresblomsterpickare), arten förekommer även på Sumbawa; floresblomsterpickare är ett lämpligare namn på *Dicaeum rhodopygiale*, som är endemisk för Flores, vilket överensstämmer med engelska och vetenskapliga namnet
- **zambezisolfågel** (v. 17 malawisolfågel), bättre beskrivning av artens utbredningsområde kring Zambezifloden
- **pampaspiplärka** (v. 17 chacopiplärka), missvisande namn då arten inte förekommer i slättlandet i Gran Chaco utan mer på pampas grässlätter
- **glasögonbusksparv** (v. 17 vanlig busksparv), ”vanlig” tas bort som förled på ett antal arter, till förmån för mer precisa eller informativa namn
- **gulbyxad snårsparv** (v. 17 gullårad snårsparv), -lårad ändras till det anatomiskt mer korrekta -byxad, då det hänvisar till färgen på fjäderdräkten
- **sonorasparv** (v. 17 rostvingad sparv), namnet justeras till att beskriva artens mycket begränsade utbredningsområde i Sonoraöknen; många olika sparvar har rostfärgade vingar
- **rödbröstad ängstrupial** (v. 17 soldatängstrupial), förtydligande av svårbegripligt namn
- **ponderosaskogssångare** (v. 17 gråkindad skogssångare), dålig beskrivning av artens utseende, ingen unik karaktär; ponderosa syftar på artens barrskogshabitat med inslag av ponderosatall
- **svartbyxad kardinal** (v. 17 svartlårad kardinal), -lårad ändras till det anatomiskt mer korrekta -byxad, då det hänvisar till färgen på fjäderdräkten
- **bläckkardinal** (v. 17 svartblå kardinal), beskrivningen av färgen justeras för att undvika förväxlingsrisk med blåsvart kardinal

Ytterligare några arter med eponymer i namnet, justeras till enklare och/eller mer informativa namn:

- **gråryggig albatross** (v. 17 salvinalbatross)
- **whakaupetrell** (v. 17 pycroftpetrell), efter Whakau (eng. Red Mercury Islands) där större delen av världspopulationen häckar
- **malajörn** (v. 17 wallaceörn)
- **sydlig filippindvärguv** (v. 17 everettdvärguv) – samtidigt justeras för konsekvens två systerarter (alla tre räknades tidigare som en art); **nordlig filippindvärguv** (v. 17 filippindvärguv) och **västlig filippindvärguv** (v. 17 negrosdvärguv)
- **fjäderfotad trogon** (v. 17 gouldtrogon)
- **amazontukanett** (v. 17 gouldtukanett)
- **snårspett** (v. 17 velasquezspett)
- **guaduamyrsmyg** (v. 17 iheringmyrsmyg), *Guadua* är ett bambusläkte i Sydamerika

- **visselmyrfågel** (v. 17 willismyrfågel), efter artens karakteristiska läte
- **bambutapakul** (v. 17 spillmanntapakul)
- **campinadvärgtyrann** (v. 17 chicodvärgtyrann), efter campina, en ekoregion i Amazonas, med vegetation på näringsfattiga sandjordar med dålig avrinning
- **ockratyrann** (v. 17 eulertyrann)
- **svartmaskad tyrann** (v. 17 bairdtyrann)
- **skogstopptyrann** (v. 17 swainsontopptyrann)
- **epålettbatis** (v. 17 margaretbatis), efter honans epålettliknande vingteckning
- **papuavisslare** (v. 17 sclatervisslare)
- **granskrika** (v. 17 stellerskrika)
- **silverborstad parotia** (v. 17 Lawes strålparadisfågel), efter de silvriga borsten ovanför näbben (eng. supranarial tufts)
- **vitstjärtad grönbulbyl** (v. 17 sjöstedtgrönbulbyl)
- **smågrönbulbyl** (v. 17 ansorgegrönbulbyl)
- **svavelfärgad grönbulbyl** (v. 17 xaviergrönbulbyl)
- **katangagrönbulbyl** (v. 17 cabanisgrönbulbyl), efter provinsen Katanga i Kongo-Kinshasa som omfattar en stor del av utbredningen
- **brunkronad bulbyl** (v. 17 sharpegrönbulbyl)
- **systerbambusångare.** (v. 17 Alströms bambusångare), efter det vetenskapliga namnet *soror* som syftar på artens likhet med andra arter i komplexet
- **huangehesångare** (v. 17 claudiasångare), efter artens utbredning inom floden Huang Hes (Gula floden) avrinningsområde
- **wuyisångare** (v. 17 hartertsångare), efter Wuyibergen i östra Kina, där en betydande del av artens utbredning finns
- **hmongsångare** (v. 17 Kloss sångare), efter hmongfolket som överensstämmer med stora delar av artens utbredningsområde i södra Kina, norra Laos och Vietnam
- **rosthuvad apalis** (v. 17 chapinapalis)
- **sockersångare** (v. 17 jerdonsångare), då arten ofta förekommer i olika sorters *Saccharum*-gräs, sockerrör
- **rostgumpad timalia** (v. 17 Abbotts timalia)
- **sepiatimalia** (v. 17 horsfieldtimalia)
- **guizhoualkippa** (v. 17 davidalkippa), efter provinsen Guizhou i sydcentrala Kina – samtidigt preciseras namnet på en närbesläktad art: **guangdongalkippa** (v. 17 kinesisk alkippa), efter provinsen Guangdong, i sydöstra Kina
- **ljushättad fnittertrast** (v. 17 elliotfnittertrast)
- **sumpskriktrast** (v. 17 hartlaubskriktrast)
- **rostnackad gärdsmyg** (v. 17 sclatergärdsmyg)
- **mopaneglansstare** (v. 17 mevesglansstare), efter mopane, ett träd som är dominerande i södra Afrika på dåliga och framför allt salta jordar
- **kortstjärtad glansstare** (v. 17 wallerglansstare)
- **koboltstare** (v. 17 stuhlmannstare)

- **fläckflugsnappare** (v. 17 sodhiflugsnappare)
- **coelinflugsnappare** (v. 17 zappeyflugsnappare), efter färgen coelin (eng. azure)
- **visirsolfågel** (v. 17 reichenowsolfågel), efter den visirliknande teckningen på pannan och strupen
- **bergsolfågel** (v. 17 preussolfågel)
- **malawisolfågel** (v. 17 füllebornsolfågel)
- **kravattsolfågel** (v. 17 johannasolfågel), efter den lila halsteckningen
- **västlig maskvävare** (v. 17 heuglinvävare)
- **stråpiplärka** (v. 17 hellmayrpiplärka), efter artens preferens för habitat med halvhöga grässtrån, som inte är för höga eller för hårt nedbetande
- **törnsparv** (v. 17 shelleysparv)
- **aprikossparv** (v. 17 jankowskisparv), efter artens habitat – gräsmarker med inslag av aprikosträd
- **anitrupial** (v. 17 forbestrupial), efter dess likhet med göken ani
- **hallonbukig kardinal** (v. 17 rositakardinal)

Utöver ovanstående görs mindre justeringar av namnet på ett antal arter genom att namnet skrivs ihop eller isär för att få ett mer konsekvent språkbruk.

- fläcknäbbad and, fjäderfotad salangan, grågumpad salangan, vitvingad seglare, vitbukig seglare, kroknäbbad eremit, fjällstrupig eremit, nålnäbbad eremit, bronsstjärtad komet, rostgumpad kolibri, glödhakad kolibri, bronsstjärad kolibri, fläckstrupig kolibri, svalstjärtad kolibri, vithakad safir, kortvingad gök, smalnäbbsglada, vitgumpad vråk, kopparstjärtad trogon, kroknäbbad kungsfiskare, skovelnäbbad kokaburra, eldnäbbad araçari, gulbuksspett, rostbuksspett, bronsvingad hackspett, eldvingad parakit, svarthättad parakit, blåvingad parakit, rostvingad minerare, kilnäbbad trädklättrare, pärlhalsad trädklättrare, svärdnäbbad trädklättrare, sabelnäbbad trädklättrare, vitvingad tapakul, smalfotad dvärgtyrann, svartnäbbad tyrann, citronbukig attila, svalstjärtad kotinga, sabelvingad piha, plommonstrupig kotinga, vitstjärtad kotinga, vitvingad kotinga, svavelbukig manakin, lansstjärtad manakin, guldvingad manakin, snöhättad manakin, pärlhättad manakin, bandstjärtad manakin, rostgumpad lärka, tvärstjärtad bulbyl, svarthättad svala, rostbukig timalia, svarthakad timalia, pärlhalsad timalia, fläckhalsad timalia, brunvingad stare, rostvingad stare, svartvingad majna, pärlhalsad munia, vitgumpad munia, nålstjärtad amadin, rosennäbbad amadin, svarthättad astrild, bandstjärtad kasik, rosenstrupig kardinal och kägelnäbbad tangara

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund och Martin Stervander

Taxonomikommittén, 2 september 2024

.